

URDHËR
Nr. 454, datë 2.8.2023

**PËR LISTËN E AGJENTËVE TË KONTROLLIT BIOLOGJIK NË TERRITORIN E
REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË**

Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë; të nenit 14, të pikës 7, të ligjit nr. 105/2016, “Për mbrojtjen e bimëve”, të ndryshuar,

URDHËROJ:

1. Miratimin e listës së agjentëve të kontrollit biologjik që lejohen të importohen, eksportohen dhe përdoren në territorin e Republikës së Shqipërisë, me qëllim kontrollin e dëmtuesve, sipas aneksit bashkëlidhur këtij urdhri.

2. Ngarkohen për zbatimin e këtij urdhri Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë dhe Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve.

Ky urdhër botohet në Fletoren Zyrtare dhe hyn në fuqi më 1 janar 2024.

MINISTËR I BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL
Frida Krifca

ANEKSI

LISTA E AGJENTËVE TË KONTROLLIT BIOLOGJIK QË LEJOHEN TË IMPORTOHEN, EKSPORTOHEN DHE PËRDOREN NË TERRITORIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

KLASIFIKIMI, DËMTUESI I SYNUAR, PËRHAPJA DHE PËRDORIMI

I. INSEKTET

1. Coleoptera

<i>Adalia bipunctata</i>	
Familja	Coccinellidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Aphididae
Burimi i parë i përhapjes	Palaearktiki (?)
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	?
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Danimarkë, Gjermani, Itali, Holandë, Portugali, Zvicër
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Aleochara bilineata</i>	
Familja	Staphylinidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Delia antiqua</i> , <i>Delia radicum</i> (= <i>Delia brassicae</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Evropa Veriore dhe e Mesme, Kanada dhe SHBA
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1997 (Në Holandë)
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Holandë, disa vende të tjera evropiane
Përdorimi	Në ambiente të hapura
<i>Atheta coriaria</i>	
Sinonimet	<i>Atheta brachelytra</i> , <i>Dalotia coriaria</i> , <i>Homalota coriaria</i>
Familja	Staphylinidae
Burimi i parë i përhapjes	Europë, Azia Veriore, Amerika e Veriut, Oqeania, e shpërndarë gjerësisht në rajonin e EPPO-s
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Thripidae (thrips), Sciaridae (fungus gnats), Ephydriidae (shore flies)
Data e përdorimit të parë	2002 (Biobest)
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Francë, Gjermani, Holandë, Poloni, Spanjë, Zvicër, Mbretëri i Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Chilocorus baileyi</i>	
Familja	Coccinellidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Diaspididae
Burimi i parë i përhapjes	Australi
Përhapja në EPPO	Jo i përhapur

Data e përdorimit të parë	1985
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Francë, Holandë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Chilocorus bipustulatus</i>	
Familja	Coccinellidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Diaspididae, Coccidae (<i>Saissetia oleae</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Palaeartik i jugut
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur (Jug dhe Qendër)
Data e përdorimit të parë	1959
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Francë, Greqi, Izrael, Itali, Holandë, Turqi
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Chilocorus circumdatus</i>	
Familja	Coccinellidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Diaspididae
Burimi i parë i përhapjes	Azia Juglindore
Përhapja në EPPO	Jo i përhapur
Data e përdorimit të parë	1985
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Francë, Holandë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Chilocorus nigrita</i>	
Familja	Coccinellidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Diaspididae, Asterolecaniidae
Burimi i parë i përhapjes	Azia Jugore
Përhapja në EPPO	Jo i përhapur
Data e përdorimit të parë	1985
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Danimarkë, Francë, Gjermani, Holandë, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Coccinella septempunctata</i>	
Familja	Coccinellidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Aphididae
Burimi i parë i përhapjes	Palaeartik
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1980
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Francë, Gjermani, Portugali
Përdorimi	Në ambiente të hapura
<i>Cryptolaemus montrouzier</i>	
Familja	Coccinellidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Planococcus citri</i>
Burimi i parë i përhapjes	Australi
Përhapja në EPPO	Zona mesdhetare
Data e përdorimit të parë	1985

Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Guernsej, Irlandë, Itali, Xhersi, Holandë, Norvegji, Poloni, Portugali, Rusi, Sllovaki, Spanjë, Suedi, Zvicër, Tunizi, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Delphastus catalinae</i>	
Sinonim	<i>Delphastus pusillae</i>
Familja	Coccinellidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Aleyrodidae (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Neartik/Neotropik
Përhapja në EPPO	Jo i përhapur
Data e përdorimit të parë	1993
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finland, Francë, Gjermani, Greqi, Jordani, Holandë, Poloni, Rusi, Spanjë, Tunizi, Mbretëria e Bashkuar (i kufizuar me licencë)
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Propylea quatuordecimpunctata</i>	
Sinonim	Propylaea 14-punctata, Calvia
Familja	Coccinellidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Shumëllojshmëri e madhe e afideve që i përkasin superfamiljes së Aphidoidea
Burimi i parë i përhapjes	Vendas në rajonin Palearktik dhe i shpërndarë gjerësisht në Evropë, i vendosur në rajonin e Neartik.
Përhapja në EPPO	Shqipëri, Austri, Bjellorusi, Belgjikë, Bosnjë dhe Hercegovinë, Bullgari, Kroaci, Qipro, Republika Çeke, Danimarkë, Estoni, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Hungari, Itali, Latvia, Luksemburg, Maqedoni, Malta, Moldavi, Norvegji, Poloni, Portugali, Rumani, Rusi, Sllovaki, Slloveni, Spanjë, Suedi, Zvicër, Holandë, Turqi, Ukrainë.
Data e përdorimit të parë	2018
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Itali, Luksemburg, Holandë, Spanjë, Mbretëri e Bashkuar dhe vendet e Beneluksit
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Rhizophagus grandis</i>	
Familja	Rhizophagidae
Dëmtuesit e synuar	<i>Dendroctonus micans</i>
Data e përdorimit të parë	1963
Vendet EPPO ku është hedhur	ish-BRSS (Gjeorgji) [S], MB [E], Francë [E] (Ndoshta i përhapur gjerësisht në Evropën Qendrore dhe Lindore)
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë, shumë herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Belgjikë
<i>Rhyzobius forestieri</i>	
Familja	Coccinellidae

Dëmtuesit e synuar	<i>Saissetia oleae</i>
Data e përdorimit të parë	1980
Vendet EPPO ku është hedhur	Itali [S], Francë [S], Greqi [E], Qipro [N], Izrael [E]
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Australi
<i>Rhyzobius lophanthae</i>	
Sinonim	<i>Lindorus lophanthae</i>
Familja	Coccinellidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Diaspididae (<i>Pseudolacaspis pentagona</i>), <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> , <i>Chrysomphalus dictyospermi</i> , <i>Parlatoria blanchardi</i>
Burimi i parë i përhapjes	Australi
Përhapja në EPPO	Mesdhe, Rusi
Data e përdorimit të parë	1980
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Danimarkë, Gjermani, Greqi, Izrael, Itali, Holandë, Portugali, Zvicër, Turqi
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Rodolia cardinalis</i>	
Familja	Coccinellidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Icerya purchasi</i>
Burimi i parë i përhapjes	Australi
Përhapja në EPPO	Mesdhe, CIS (Komonuelthi i Shteteve të Pavarura)
Data e përdorimit të parë	?1980
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Holandë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Scymnus impexus</i>	
Familja	Coccinellidae
Dëmtuesit e synuar	<i>Adelges</i> spp.
Data e përdorimit të parë	1968
Vendet EPPO ku është hedhur	Suedi [S], MB [N] (vendas në Evropë)
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Gjermani
<i>Scymnus reunioni</i>	
Sinonim	<i>Nephus reunioni</i>
Familja	Coccinellidae
Dëmtuesit e synuar	<i>Planococcus citri</i>
Data e përdorimit të parë	1967
Vendet EPPO ku është hedhur	Izrael [N], Itali (Sardenja) [P], ish-BRSS (Gjeorgji) [F?]
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë

Origjina e materialit të grumbulluar	Indi
<i>Scymnus rubromaculatus</i>	
Familja	Coccinellidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Aphididae
Burimi i parë i përhapjes	Evropa Qendrore
Përhapja në EPPO	Finland, Estonia, Lituania
Data e përdorimit të parë	1990
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Francë, Holandë, Portugali
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Serangium parcesetosum</i>	
Familja	Coccinellidae
Dëmtuesit e synuar	<i>Dialeurodes citri</i>
Data e përdorimit të parë	1973
Vendet EPPO ku është hedhur	Ish-BRSS [Gjeorgji, C*; Azerbajxhan, C*; Uzbekistan, F], Francë (Corse) [E], Izrael, Turqi [S?]
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Indi, ish-BRSS
<i>Stethorus punctillum</i>	
Familja	Coccinellidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Panonychus ulmi</i>
Burimi i parë i përhapjes	Palaearkti
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1995
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Francë, Gjermani, Holandë, Portugali, Spanjë, Suedi
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura

2. Dipteret

<i>Aphidoletes aphidimyza</i>	
Familja	Cecidomyiidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Aphididae (<i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Macrosiphum sp.</i> , <i>Aulacorthum sp.</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Evropa Qendrore, Palaearktik
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1985
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Guernsej, Hungari, Irlandë, Itali, Xhersi, Jordani, Lituani, Maltë, Marok, Holandë, Norvegji, Poloni, Portugali, Spanjë, Sllovaki, Suedi, Zvicër, Tunizi, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura

<i>Cryptochetum iceryae</i>	
Familja	Cryptochetidae
Dëmtuesit e synuar	<i>Icerya purchasi</i>
Data e përdorimit të parë	1987
Vendet EPPO ku është hedhur	Izrael [S]
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Australi
<i>Episyrphus balteatus</i>	
Familja	Syrphidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Aphididae
Burimi i parë i përhapjes	Evrope
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1995
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Danimarkë, Gjermani, Itali, Holandë, Portugali
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Eupeodes corollae</i>	
Sinonimet	<i>Metasyrphus corollae</i> , <i>Syrphus corollae</i>
Familja	Syrphidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Aphididae
Burimi i parë i përhapjes	Rajonet Palaearktik dhe Afrotropikal jugore
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	2020
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Latvia, Holandë, Spanjë, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Feltiella acarisuga</i>	
Sinonimet	<i>Feltiella tetranychii</i> , <i>Therodiplosis persicae</i>
Familja	Cecidomyiidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Tetranychus urticae</i> , <i>T. cinnabarinus</i>
Burimi i parë i përhapjes	Evropa Perëndimore, Mesdhe
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1995
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Guernsej, Irlandë, Itali, Lituani, Holandë, Norvegji, Poloni, Spanjë, Suedi, Zvicër, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Sphaerophoria rueppellii</i>	
Sinonimet	<i>Sphaerophoria flavicauda</i> , <i>Sphaerophoria nitidicollis</i>
Familja	Syrphidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Kryesisht Aphididae por edhe miza të bardha, tripset dhe marimangat

Burimi i parë i përhapjes	Gjerësisht i përhapur në rajonet Palaearktik dhe Afrotropikal jugore
Përhapja në EPPO	Rajoni i Mesdheut
Data e përdorimit të parë	2012
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Spanjë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura

3. Hemiptera/Heteroptera

<i>Anthocoris nemoralis</i>	
Familja	Anthocoridae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Psyllidae (orchards)
Burimi i parë i përhapjes	Palaearktik
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	?
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Danimarkë, Gjermani, Holandë
Përdorimi	Në ambiente të hapura
<i>Anthocoris nemorum</i>	
Familja	Anthocoridae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Cacopsylla pyri</i> , thrips
Burimi i parë i përhapjes	Palaearktik
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1992
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Danimarkë, Francë, Itali, Xhersi, Holandë, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të hapura
<i>Macrolophus pygmaeus</i>	
Familja	Miridae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Aleyrodidae
Burimi i parë i përhapjes	Palaearktik
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1990
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Guernsej, Hungari, Irlandë, Itali, Jordani, Lituani, Maltë, Holandë, Norvegji, Poloni, Portugali, Sllovaki, Spanjë, Suedi, Zvicër, Tunizi, Turqi, Mbretëri e Bashkuar (i kufizuar me licencë)
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
Shënim shtesë	<i>Macrolophus pygmaeus</i> ishte përfshirë më parë në listën pozitive me emrin <i>Macrolophus melanotoma</i> (sinonim: <i>Macrolophus caliginosus</i>), ky gabim u gjet dhe u korrigjua në vitin 2009; <i>Macrolophus pygmaeus</i> është raportuar si i dëmshëm në domatet qershi dhe në Gerbera. Prandaj nuk rekomandohet të përdoret në këto kultura. Këshillohet kujdes kur përdoret <i>M. pygmaeus</i> në

	çdo kulturë të re, veçanërisht në bimë zbukuruese me një prag të ulët për dëmtimin pamor.
<i>Orius albidipennis</i>	
Familja	Anthocoridae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Thrips
Burimi i parë i përhapjes	Mesdhe, Palaeartik
Përhapja në EPPO	Mesdheu
Data e përdorimit të parë	1991
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Francë, Izrael, Itali, Holandë, Spanjë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Orius laevigatus</i>	
Familja	Anthocoridae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Thripidae (<i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Thrips tabaci</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Palaeartik (përveç veriut)
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur (përveç veriut)
Data e përdorimit të parë	1991
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Guernsej, Hungari, Irlandë, Itali, Xhersi, Jordani, Lituani, Maltë, Marok, Holandë, Norvegji, Poloni, Portugali, Sllovaki, Spanjë, Zvicër, Tunizi, Mbretëria e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Orius majusculus</i>	
Familja	Anthocoridae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Thripidae (<i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Thrips tabaci</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Palaeartik
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1991
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Guernsej, Itali, Xhersi, Lituani, Holandë, Norvegji, Poloni, Portugali, Spanjë, Suedi, Zvicër, Mbretëria e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Picromerus bidens</i>	
Familja	Pentatomidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Lepidoptera
Burimi i parë i përhapjes	Palaeartik (gjithashtu në Neartik)
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1990
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	CLS countries, Gjermani, Poloni, Rusi
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Podisus maculiventris</i>	
Familja	Pentatomidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Lepidoptera, <i>Leptinotarsa decemlineata</i>
Burimi i parë i përhapjes	Amerika Veriore dhe Jugore
Përhapja në EPPO	Jo e përhapur
Data e përdorimit të parë	1996

Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Bullgari, Danimarkë, Finlandë, Francë, Greqi, Itali, Holandë, Rusi, Spanjë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura

4. Hymenoptera

<i>Acerophagus maculipennis</i>	
Sinonimi	<i>Pseudaphycus maculipennis</i>
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Pseudococcidae
Burimi i parë i përhapjes	Palaeartik
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur (në jug)
Data e përdorimit të parë	1980
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Francë, Gjermani, Holandë, Spanjë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Ageniaspis citricola</i>	
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit e synuar	<i>Phyllocnistis citrella</i>
Data e përdorimit të parë	1994-
Vendet EPPO ku është hedhur	Izrael, Marok, Algjeri, Tunizi, Francë, Greqi, Qipro, Spanjë [C], Itali (Sicilia); themeluar Një herë në Ishujt Kanarie ku siguron kontroll të plotë të dëmtuesit të synuar
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë, shumë herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Tajlandë, Florida (SHBA)
<i>Allotropa burrelli</i>	
Familja	Platygasteridae
Dëmtuesit e synuar	<i>Pseudococcus comstocki</i>
Data e përdorimit të parë	1945
Vendet EPPO ku është hedhur	ish-BRSS [P*]
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Japoni
<i>Allotropa convexifrons</i>	
Familja	Platygasteridae
Dëmtuesit e synuar	<i>Pseudococcus comstocki</i>
Data e përdorimit të parë	1945
Vendet EPPO ku është hedhur	ish-BRSS [P*]
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Kore
<i>Amitus spiniferus</i>	

Familja	Platygasteridae
Dëmtuesit e synuar	<i>Aleurothrixus floccosus</i>
Data e përdorimit të parë	1971-
Vendet EPPO ku është hedhur	Francë [C*], Itali [S*]
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Amerika Qendrore
<i>Anagrus atomus</i>	
Familja	Mymaridae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Cicadellidae
Burimi i parë i përhapjes	Palaearktiki
Përhapja në EPPO	?
Data e përdorimit të parë	1994
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Francë, Gjermani, Guernsej, Xhersi, Holandë, Spanjë, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Anagrus agraeus</i>	
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit e synuar	<i>Nipaecoccus viridis</i>
Data e përdorimit të parë	1984-
Vendet EPPO ku është hedhur	Jordani [S?], Izrael [S?]
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Guana
<i>Anagrus fusciventris</i>	
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Pseudococcidae
Burimi i parë i përhapjes	Australi
Përhapja në EPPO	Jo e pranishme
Data e përdorimit të parë	1990
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Danimarkë, Francë, Gjermani, Holandë, Spanjë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Anagrus vladimiri</i>	
Sinonimi	<i>Anagrus pseudococci</i>
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Pseudococcidae
Burimi i parë i përhapjes	Mesdhe
Përhapja në EPPO	Mesdhe
Data e përdorimit të parë	1995
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Francë, Çeki, Greqi, Itali, Holandë, Portugali, Spanjë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Anaphes nitens</i>	

Familja	Mymaridae
Dëmtuesit e synuar	<i>Gonipterus scutellatus</i>
Data e përdorimit të parë	1978
Vendet EPPO ku është hedhur	Itali [C], Francë [P], Spanjë [S]
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Australi
<i>Anastatus bifasciatus</i>	
Familja	Eupelmidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Heteroptera (<i>Halyomorpha halys</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Evropë
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	2019
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Itali
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Aphelinus abdominalis</i>	
Familja	Aphelinidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Aphididae (<i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Aulacorthum solani</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Evropë
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1992
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Bullgari, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Guernsej, Irlandë, Itali, Xhersi, Jordani, Holandë, Poloni, Spanjë, Suedi, Zvicër, Tunizi, Mbretëria e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Aphelinus mali</i>	
Familja	Aphelinidae
Dëmtuesit e synuar	<i>Eriosoma lanigerum</i>
Data e përdorimit të parë	1920-
Vendet EPPO ku është hedhur	Francë [P], Hungari [S], Izrael [P], Itali [S], Zvicër [S], ish-BRSS (Azerbajxhan) [C], Portugali [N], Belgjikë [C], Gjermani [P], MB [P], Slloveni, Maltë, Holandë [P], Spanjë [P], Poloni [P], Suedi [P], Qipro [C], Danimarkë [P] (gjerësisht i përhapur në rajonin EPPO)
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	SHBA
<i>Aphidius colemani</i>	
Familja	Braconidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Aphididae (<i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>M. nicotianae</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Afrika e Veriut, Lindja e Mesme, India
Përhapja në EPPO	Zona e Mesdheut

Data e përdorimit të parë	1992
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Guernsej, Hungari, Irlandë, Itali, Xheri, Jordani, Lituani, Maltë, Marok, Holandë, Norvegji, Poloni, Portugali, Sllovaki, Spanjë, Suedi, Zvicër, Tunizi, Turqi, Mbretëri e Bashkuar.
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Aphidius ervi</i>	
Familja	Braconidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Aulacorthum solani</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i>
Burimi i parë i përhapjes	Palacarktik
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1995
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Guernsej, Hungari, Irlandë, Itali, Xheri, Lituani, Holandë, Norvegji, Poloni, Portugali, Sllovaki, Spanjë, Suedi, Zvicër, Mbretëri e Bashkuar.
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Aphidius matricariae</i>	
Familja	Braconidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Myzus persicae</i>
Burimi i parë i përhapjes	Holarktik
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur në rajone me klimë të butë
Data e përdorimit të parë	1990
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Gjermani, Guernsej, Xheri, Holandë, Poloni, Portugali, Sllovaki, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Aphytis diaspidis</i>	
Familja	Aphelinidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Diaspididae, <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> , <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>
Burimi i parë i përhapjes	Kaliforni
Përhapja në EPPO	Mesdhe
Data e përdorimit të parë	?
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Holandë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Aphytis holoxanthus</i>	
Familja	Aphelinidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Diaspididae
Burimi i parë i përhapjes	Azi
Përhapja në EPPO	Mesdhe
Data e përdorimit të parë	1996
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Çeki, Francë, Holandë, Spanjë dhe Izrael
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Aphytis lepidosaphes</i>	
Familja	Aphelinidae

Dëmtuesit e synuar	<i>Cornuaspis beckii</i>
Data e përdorimit të parë	1956-
Vendet EPPO ku është hedhur	Izrael [C], Qipro [N], Francë [N], Greqi [S], Spanjë [S], Itali (Sicili) [P]
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Kinë
<i>Aphytis lingnanensis</i>	
Familja	Aphelinidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Aonidiella aurantii</i> , <i>Chrysomphalus dictyospermi</i>
Burimi i parë i përhapjes	Ndoshta Azia Lindore (vendosur gjerësisht diku tjetër)
Përhapja në EPPO	Mesdhe
Data e përdorimit të parë	?
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Greqi , Itali, Spanjë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Aphytis melinus</i>	
Familja	Aphelinidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Aonidiella aurantii</i>
Burimi i parë i përhapjes	Indi/Pakistan
Përhapja në EPPO	Mesdhe
Data e përdorimit të parë	1995
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Çeki, Danimark, Francë, Greqi, Itali, Portugali, Spanjë.
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Aphytis proclia</i>	
Familja	Aphelinidae
Dëmtuesit e synuar	<i>Pseudaaulacaspis pentagona</i>
Data e përdorimit të parë	1924
Vendet EPPO ku është hedhur	Itali [S] (<i>Gjerësisht i përhapur në rajonin EPPO</i>)
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Azia Lindore
<i>Aprostocetus hagenowii</i>	
Sinonimet	<i>Tetrastichus hagenowii</i> , <i>Tetrastichodes hagenowii</i>
Familja	Eulophidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Blattidae (<i>Periplaneta spp.</i>)
Burimi i parë i përhapjes	?
Përhapja në EPPO	Rumani
Data e përdorimit të parë	1993
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Francë, Gjermani, Holandë, Spanjë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Bracon hebetor</i>	
Sinonimet	<i>Habrobracon hebetor</i>
Familja	Braconidae

Dëmtuesit kryesorë të synuar	Lepidoptera (në produktet e ruajtura)
Burimi i parë i përhapjes	Indi, Anglia
Përhapja në EPPO	Zona Mesdheut (kryesisht lindore)
Data e përdorimit të parë	1980
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Shumë shtete (përfshirë Gjermani, Portugali)
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Clausenia purpurea</i>	
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Pseudococcus citriculus</i>
Data e përdorimit të parë	1940
Vendet EPPO ku është hedhur	Izrael [C]
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Japoni
<i>Coccophagus lycimnia</i>	
Familja	Aphelinidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Coccidae
Burimi i parë i përhapjes	Kosmopolitan
Përhapja në EPPO	Mesdhe
Data e përdorimit të parë	1988
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Danimarkë, Francë, Gjermani, Holandë, Portugali, Spanjë, Suedi.
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Coccophagus rusti</i>	
Familja	Aphelinidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Coccidae
Burimi i parë i përhapjes	Kosmopolitan
Përhapja në EPPO	Mesdhe
Data e përdorimit të parë	1988
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Francë, Holandë, Spanjë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Coccophagus scutellaris</i>	
Familja	Aphelinidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Coccidae
Burimi i parë i përhapjes	Kosmopolitan
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1986
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Francë, Holandë, Portugali, Spanjë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Comperiella bifasciata</i>	
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Diaspididae (<i>Chrysomphalus aonidum</i> , <i>Aonidiella aurantii</i>)
Burimi i parë i përhapjes	? Kaliforni/Kina Jugore
Përhapja në EPPO	Mesdhe

Data e përdorimit të parë	1985
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Greqi, Holandë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Cotesia marginiventris</i>	
Sinonimet	<i>Apanteles marginiventris</i>
Familja	Braconidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Lepidoptera (Noctuidae)
Burimi i parë i përhapjes	Amerika
Përhapja në EPPO	?
Data e përdorimit të parë	1993
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Francë, Holandë, Spanjë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Dacnusa sibirica</i>	
Familja	Braconidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Agromyzidae (<i>Liriomyza spp.</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Palearktik, Evropë
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur në rajone me klimë të butë
Data e përdorimit të parë	1981
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Bullgari, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Guernsej, Itali, Xhersi, Jordani, Maltë, Marok, Holandë, Norvegji, Poloni, Portugali, Sllovaki, Spanjë, Suedi, Zvicër, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura (selino, marule)
<i>Diglyphus isaea</i>	
Familja	Eulophidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Agromyzidae (<i>Liriomyza spp.</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Palaearktik
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1984
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Hungari, Itali, Jordani, Maltë, Marok, Holandë, Norvegji, Poloni, Portugali, Sllovaki, Spanjë, Suedi, Zvicër, Tunizi, Turqi, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Encarsia berlesei</i>	
Familja	Aphelinidae
Dëmtuesit e synuar	Pseudaulacaspis pentagona
Data e përdorimit të parë	1906-
Vendet EPPO ku është hedhur	Itali [C], Bullgari [C], Zvicër [C], Spanjë [C], Austri [C], ish-BRSS [C], Francë [P], Hungari, Slloveni
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Japonia, Azia Lindore
<i>Encarsia citrina</i>	

Familja	Aphelinidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Diaspididae
Burimi i parë i përhapjes	Kosmopolitan
Përhapja në EPPO	Mesdhe
Data e përdorimit të parë	1984
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Francë, Gjermani, Holandë, Spanjë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Encarsia formosa</i>	
Familja	Aphelinidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Aleyrodidae (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Nearktik jugore
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1930
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri Belgjikë, Bullgari, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Hungari, Irlandë, Itali, Jordani, Lituani, Maltë, Marok, Holandë, Norvegji, Poloni, Portugali, Sllovaki, Spanjë, Suedi, Zvicër, Tunizi, Turqia, Britani e Madhe
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Encarsia herndonii</i>	
Sinonimi	Encarsia elongata
Familja	Aphelinidae
Dëmtuesit e synuar	Lepidosaphes gloverii
Data e përdorimit të parë	1979
Vendet EPPO ku është hedhur	Spanjë [S]
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Azia Lindore
<i>Encarsia lahorensis</i>	
Familja	Aphelinidae
Dëmtuesit e synuar	Dialeurodes citri
Data e përdorimit të parë	1973-
Vendet EPPO ku është hedhur	Itali [S; Sardenja, P; Sicili, C], ish-BRSS (Gjeorgji) [C*], Francë [E], Turqi, Greqi [S, E], Izrael [C*]
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë, shumë herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Indi, Pakistan
<i>Encarsia perniciosi</i>	
Familja	Aphelinidae
Dëmtuesit e synuar	Quadraspidotus perniciosus
Data e përdorimit të parë	1932-

Vendet EPPO ku është hedhur	Itali [P], ish-BRSS [E], Gjermani [P], Francë [P], Bullgari [C], ish Çekosllovakia [E, N], Zvicër [P], ish-Jugosllavi [N], Austri [E], Greqi [E], Spanjë [P] (Gjerësisht i përhapur në rajonin EPPO)
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë, shumë herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Kinë, Kore
<i>Encyrtus aurantii</i>	
Sinonimet	<i>Encyrtus lecaniorum</i>
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Coccidae
Burimi i parë i përhapjes	Palaeartik
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur (Jug)
Data e përdorimit të parë	1980
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Francë, Gjermani, Holandë, Spanjë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Encyrtus infelix</i>	
Sinonimet	<i>Eucomys tananarivensis</i>
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Coccidae
Burimi i parë i përhapjes	Rajoni Afrotropikal
Përhapja në EPPO	Izrael
Data e përdorimit të parë	1992
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Danimarkë, Francë, Holandë, Spanjë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Ephedrus cerasicola</i>	
Familja	Braconidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Aphis frangulae</i> , <i>A. gossypii</i> , <i>Aulacorthum circumflexum</i> , <i>Aulacorthum solani</i> , <i>Brachycaudus helichrysi</i> , <i>Capitophorus inulae</i> , <i>Cavariella aegopodii</i> , <i>Chaetosiphon fragaefolii</i> , <i>Cryptomyzus galeopsidis</i> , <i>Dysaphis apiifolia</i> , <i>Dysaphis sp.</i> , <i>Hyadaphis foeniculi</i> , <i>Hyperomyzus lactucae</i> , <i>Hyperomyzus sp.</i> , <i>Myzus ascalonicus</i> , <i>M. cerasi</i> , <i>M. ligustri</i> , <i>M. nicotinae</i> , <i>M. ornatus</i> , <i>M. persicae</i> , <i>Nasonovia ribisnigri</i> , <i>Nasonovia sp.</i> , <i>Ovatus crataegarius</i> , <i>Phorodon humili</i> , <i>Rhodobium porosum</i>
Burimi i parë i përhapjes	Në mënyrë natyrale në të gjithë Evropën
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1999
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Danimarkë, Finland, Francë, Gjermani, Holandë, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Eretmocerus debachi</i>	
Familja	Aphelinidae
Dëmtuesit e synuar	Parabemisia myricae

Data e përdorimit të parë	1982-
Vendet EPPO ku është hedhur	Izrael [C], Turqi [C], Itali [S] (Shpërndarja mesdhetare?)
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Japoni, Amerika e Veriut
<i>Eretmocerus eremicus</i>	
Familja	Aphelinidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Bemisia tabaci</i>
Burimi i parë i përhapjes	Neartik jugor
Përhapja në EPPO	Mesdhe
Data e përdorimit të parë	1994
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Guernsej, Hungari, Itali, Lituani, Maltë, Marok, Holandë, Norvegji, Poloni, Portugali, Sllovaki, Spanjë, Zvicër, Tunizi, Turqi
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Eretmocerus mundus</i>	
Familja	Aphelinidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Bemisia tabaci</i>
Burimi i parë i përhapjes	Evropa Jugore
Përhapja në EPPO	Mesdhe
Data e përdorimit të parë	1996
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Danimarkë, Gjermani, Itali, Holandë, Portugali, Spanjë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Gyranusoidea litura</i>	
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Pseudococcus longispinus</i>
Burimi i parë i përhapjes	Afrikë
Përhapja në EPPO	Francë, Spanjë
Data e përdorimit të parë	1990
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Francë, Holandë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Leptomastidea abnormis</i>	
Sinonimi	<i>Leptomastix abnormis</i>
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Pseudococcidae
Burimi i parë i përhapjes	Palaeartik
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1984
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Danimarkë, Gjermani, Guernsej, Izrael, Itali, Xhersi, Holandë, Spanjë, Zvicër, Turqi, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Leptomastix dactylopii</i>	
Familja	Encyrtidae

Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Planococcus citri</i>
Burimi i parë i përhapjes	Neotropik
Përhapja në EPPO	Rajoni Mesdheut
Data e përdorimit të parë	1992
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Guernsej, Irlandë, Itali, Xheri, Holandë, Norvegji, Poloni, Portugali, Spanjë, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Leptomastix epona</i>	
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Pseudococcidae, especially Pseudococcus viburni</i>
Burimi i parë i përhapjes	Palaeartik
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur (jug)
Data e përdorimit të parë	1992
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Danimarkë, Francë, Gjermani, Gjermani, Xheri, Holandë, Spanjë, Mbretëria e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Metaphycus annekei</i>	
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit e synuar	<i>Saissetia oleae</i>
Data e përdorimit të parë	?
Vendet EPPO ku është hedhur	Greqi [C], Izrael [E], Francë [E], Itali [F]
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Afrika e Jugut
<i>Metaphycus flavus</i>	
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Coccidae, <i>Saissetia oleae</i> , <i>Coccus hesperidum</i>
Burimi i parë i përhapjes	Neartik
Vendosur në EPPO	Po
Përhapja në EPPO	Mesdhe
Data e përdorimit të parë	1999
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Gjermani, Holandë, Zvicër
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Metaphycus helvolus</i>	
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Coccidae (<i>Saissetia oleae</i> <i>Coccus hesperidum</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Afrika e jugut (gjithashtu krijuar në Neartik)
Përhapja në EPPO	Greqi, Itali
Data e përdorimit të parë	1992
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Danimarkë, Francë, Gjermani, Greqi, Izrael, Itali, Holandë, Spanjë, Suedi, Zvicër
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Metaphycus lounsburyi</i>	

Sinonimet	<i>M. bartletti</i> , <i>M. anneckeii</i> dhe <i>M. hagenowii</i> , gjithashtu vendosur në disa vende të Mesdheut, nuk është identifikuar në <i>M. lounsburyi</i>
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Coccidae (<i>Saissetia oleae</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Kaliforni, Australi, Hawaii, Afrika e Jugut
Përhapja në EPPO	Mesdheu
Data e përdorimit të parë	1997
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Danimarkë, Francë, Itali, Holandë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Metaphycus swirskii</i>	
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Coccidae
Burimi i parë i përhapjes	Afrika lindore?
Përhapja në EPPO	Francë, Greqi (Kretë), Izrael, Itali (ndoshta shumë i përhapur në Rajonin e Mesdheut)
Data e përdorimit të parë	1992
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Francë, Holandë, Spanjë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Microterys nietneri</i>	
Sinonimet	<i>Microterys flavus</i>
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Coccidae (<i>Saissetia oleae</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Kaliforni, Pakistan
Përhapja në EPPO	Itali
Data e përdorimit të parë	1987
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Danimarkë, Francë, Gjermani, Greqi, Izrael, Holandë, Spanjë, ish-Jugosllavi
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Neodryinus typhlocybae</i>	
Familja	Dryinidae
Dëmtuesit e synuar	<i>Metcalfa pruinosa</i>
Data e përdorimit të parë	1989-
Vendet EPPO ku është hedhur	Itali, Francë, Slloveni, Zvicër
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	SHBA
<i>Neodusmetia sangwani</i>	
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit e synuar	<i>Antonina graminis</i>
Data e përdorimit të parë	1971
Vendet EPPO ku është hedhur	Izrael [S]
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë

Origjina e materialit të grumbulluar	India e Jugut
<i>Ooencyrtus kuvanae</i>	
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit e synuar	Lymantria dispar
Data e përdorimit të parë	1922
Vendet EPPO ku është hedhur	ish Çekosllovakia [E], Spanja [P], Maroku [E], Algjeria [E], Portugalia [E], ish-BRSS (Kazakistani, Moldavia, Rusia, Ukraina, Uzbekistani) [P]
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Japoni
<i>Opius pallipes</i>	
Familja	Braconidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Liriomyza bryoniae</i>
Burimi i parë i përhapjes	Palaearktiki (?)
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1980
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Francë, Gjermani, Greqi, Guernsej, Xhersi, Lituani, Holandë, Poloni, Spanjë, Mbretëria e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Praon volucre</i>	
Sinonimi	Aphidius volucre
Familja	Braconidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Aphididae
Burimi i parë i përhapjes	Palaearktiki
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	?
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Guernsej, Xhersi, Hollandë, Mbretëria e Bashkuar
Përdorimi	Indoors
<i>Pseudaphycus malinus</i>	
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit e synuar	Pseudococcus comstocki
Data e përdorimit të parë	1945
Vendet EPPO ku është hedhur	ish-BRSS [C]
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Kore
<i>Psyllaephagus pilosus</i>	
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit e synuar	Ctenarytaina eucalypti
Data e përdorimit të parë	1994

Vendet EPPO ku është hedhur	Irlandë [S], Francë [S]
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Australi
<i>Psytalia concolor</i>	
Sinonim	Opius concolor
Familja	Braconidae
Dëmtuesit e synuar	Bactrocera oleae
Data e përdorimit të parë	1914-
Vendet EPPO ku është hedhur	Itali [S], Greqi [P], Francë [P], Spanjë [P], Portugali, ish-Jugosllavi [N]
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Libi, Tunizi
<i>Pteroptrix orientalis</i>	
Sinonim	Archenomus orientalis
Familja	Aphelinidae
Dëmtuesit e synuar	Pseudaulacaspis pentagona
Data e përdorimit të parë	1909
Vendet EPPO ku është hedhur	Itali [S]
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Japoni
<i>Pteroptrix smithi</i>	
Familja	Aphelinidae
Dëmtuesit e synuar	Chrysomphalus aonidum
Data e përdorimit të parë	1956
Vendet EPPO ku është hedhur	Izrael [C*]
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Hong Kong
<i>Scutellista caerulea</i>	
Sinonimi	<i>Scutellista cyanea</i>
Familja	Pteromalidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Coccidae (<i>Saissetia oleae</i> , <i>S. coffeae</i> , <i>Ceroplastes rusci</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Afrikë
Përhapja në EPPO	Mesdhe, CIS
Data e përdorimit të parë	1990
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Danimarkë, Francë, Holandë, Zvicër
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Tetracnemoidea brevicornis</i>	

Sinonimi	<i>Hungariella pretiosa</i>
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Pseudococcidae
Burimi i parë i përhapjes	?
Përhapja në EPPO	Itali
Data e përdorimit të parë	1992
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Francë, Holandë, Spanjë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Tetracnemoidea peregrina</i>	
Sinonimi	<i>Hungariella peregrina</i>
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Pseudococcidae
Burimi i parë i përhapjes	Amerika e Veriut
Përhapja në EPPO	Izrael
Data e përdorimit të parë	1992
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Francë, Izrael, Holandë, Spanjë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Thripobius javae</i>	
Sinonimi	<i>Thripobius semiluteus</i>
Familja	Eulophidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Thysanoptera (<i>Heliothrips</i> spp.)
Burimi i parë i përhapjes	Zonat tropikale dhe subtropikale të Afrikës, Azisë dhe Australisë
Përhapja në EPPO	Izrael
Data e përdorimit të parë	1995
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Danimarkë, Francë, Gjermani, Holandë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Torymus sinensis</i>	
Familja	Torymidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Dryocosmus Kuriphilus</i>
Burimi i parë i përhapjes	Japoni dhe SHBA
Përhapja në EPPO	Nga vitin 2005
Data e përdorimit të parë	1982?
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Itali
Përdorimi	Në ambiente të hapura
<i>Trichogramma brassicae</i>	
Sinonimi	<i>Trichogramma maidis</i>
Familja	Trichogrammatidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Lepidoptera (<i>Ostrinia nubilalis</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Europë
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1980
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Itali, Xhersi, Jordani, Holandë, Sllovaki, Spanjë, Zvicër, Mbretëri e Bashkuar

Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Trichogramma cacoeciae</i>	
Familja	Trichogrammatidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Lepidoptera
Burimi i parë i përhapjes	Europë
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1980
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Danimarkë, Francë, Gjermani, Hungari
Përdorimi	Në ambiente të hapura
<i>Trichogramma cordubensis</i>	
Viti i shtimit në listën positive të EPPO	2020
Familja	Trichogrammatidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Lepidoptera (e.g. <i>Cydalima perspectalis</i> , <i>Lobesia botrana</i> & <i>Eupoecilia ambiguella</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Mesdhe (Algjeri, Egjipt, Francë, Iran, Marok, Portugali, Spanjë)
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1980
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Francë
Përdorimi	Në ambiente të hapura
<i>Trichogramma dendrolimi</i>	
Familja	Trichogrammatidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Lepidoptera
Burimi i parë i përhapjes	Europë
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1985
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Gjermani, Sllovaki
Përdorimi	Në ambiente të hapura
<i>Trichogramma evanescens</i>	
Familja	Trichogrammatidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Lepidoptera (duke përfshirë në produktet e ruajtura)
Burimi i parë i përhapjes	Europë
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1993
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Itali, Xhersi, Jordani, Holandë, Portugali, Sllovaki, Spanjë, Tunizi, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Trichogramma pintoi</i>	
Sinonimi	<i>Trichogramma euproctidis</i>
Familja	Trichogrammatidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Kryesisht speciet Lepidoptera: <i>Ostrinia nubilalis</i> , <i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Cydia nigricana</i> , <i>Cydia pomonella</i> , <i>Cydia funebrana</i> , <i>Plutella xylostella</i> , <i>Mamestra brassicae</i> , <i>Lacanobia oleracea</i>

Burimi i parë i përhapjes	Palearktik, Lindja e Afërt, Nearktik, rajoni Neotropik; Rajoni Oriental, gjerësisht i përhapur në rajonin EPPO
Data e përdorimit të parë	2002 (Hungari)
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Bjellorusi, Republika Çeke, Hungari, Moldavi, Poloni, Rusi, Sllovaki, Ukrainë, Uzbekistan
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Trichopria drosophilae</i>	
Familja	Diapriidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Parazitoid i pupave të <i>Drosophila suzukii</i> , parazitoid relativisht specifik krahasuar me parazitoidët e tjerë të Dipterës.
Burimi i parë i përhapjes	Gjerësisht i përhapur, kryesisht në zonat me klimë tropikale/mesdhetare/të ngrohtë. Indigjene në rajonin EPPO
Përhapja në EPPO	France, Gjermani, Greqi, Israel, Itali, Marok dhe Holandë, Spanjë
Data e përdorimit të parë	2015 (Itali)
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Itali (nga 2015), Spanjë (2017) dhe Zvicër (2017)
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura

5. Neuroptera

<i>Chrysoperla carnea</i>	
Sinonimi	<i>Chrysopa carnea</i>
Familja	Chrysopidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Aphididae etc.
Burimi i parë i përhapjes	Kosmopolitan
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1987
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Guernsej, Irlandë, Itali, Holandë, Portugali, Spanjë, Suedi, Zvicër, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura

6. Thysanoptera

<i>Frankliniopsis megalops</i>	
Sinonimi	<i>Frankliniopsis myrmicaeformis</i>
Familja	Aeolothripidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Thysanoptera
Burimi i parë i përhapjes	Afrika, Izraeli, India
Përhapja në EPPO	Izrael, Tunizi
Data e përdorimit të parë	1992
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Francë, Holandë, Spanjë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Frankliniopsis vespiformis</i>	
Familja	Aeolothripidae

Dëmtuesit kryesorë të synuar	Thysanoptera
Burimi i parë i përhapjes	Azi
Përhapja në EPPO	Izrael, Portugali
Data e përdorimit të parë	1990
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Danimarkë, Francë, Gjermani, Izrael, Holandë, Portugali, Suedi, Zvicër
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Karnyothrips melaleucus</i>	
Familja	Phlaeothripidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Coccidae, Diaspididae (<i>Howardia biclavis</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Pantropikal
Përhapja në EPPO	Portugali (Madeira)
Data e përdorimit të parë	1994
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Danimarkë, Francë, Holandë, Spanjë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura

II. ARACHNIDA, Acarina

<i>Amblydromalus limonicus</i>	
Sinonimet	<i>Amblyseius limonicus</i> , <i>Typhlodromus (Amblyseius) limonicus</i> , <i>Amblyseius (Typhlodromalus) limonicus</i> , <i>Typhlodromus limonicus</i> , <i>Amblyseius (Amblyseius) limonicus</i> , <i>Typhlodromalus limonicus</i> , <i>Typhlodromalus lailae</i>
Familja	Phytoseiidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Tripset dhe krahëbardhat (kryesisht <i>Bemisia tabaci</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Amerika Veriore, Qendrore dhe Jugore, Hawaii, Zelanda e Re dhe Australia
Përhapja në EPPO	E vendosur në veri-lindje të Spanjës
Data e përdorimit të parë	2010
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Danimarkë, Angli, Finlandë, Francë, Gjermani, Irlandë, Holandë, Poloni, Rusi, Suedi dhe Ukrainë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Amblyseius andersoni</i>	
Sinonimi	<i>Typhlodromus andersoni</i>
Familja	Phytoseiidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Tetranychus urticae</i> , <i>T. cinnabarinus</i> , <i>Panonychus ulmi</i> , <i>Aculops lycopersicae</i> , <i>Polyphagotarsonemus latus</i> , <i>Phytonemus pallidus</i>
Burimi i parë i përhapjes	Paleartik dhe Nearktik
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	2006 (nga Syngenta)
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Francë, Gjermani, Itali, Holandë, Poloni, Spanjë, Mbretëria e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Amblyseius barkeri</i>	
Sinonimet	<i>Amblyseius mckenziei</i> , <i>Neoseiulus barkeri</i>

Familja	Phytoseiidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Thysanoptera (<i>Thrips tabaci</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>), Tarsonemidae
Burimi i parë i përhapjes	Europë
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1981
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Danimarkë, Francë, Gjermani, Itali, Holandë, Sllovaki, Zvicër
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Amblyseius degenerans</i>	
Sinonimi	<i>Iphiseius degenerans</i>
Familja	Phytoseiidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Thysanoptera
Burimi i parë i përhapjes	Afrikë/Mesdhe
Përhapja në EPPO	Mesdhe
Data e përdorimit të parë	1993
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Hungari, Itali, Xhersi, Holandë, Norvegji, Poloni, Spanjë, Zvicër, Tunizi, Turqi, Britani e Madhe
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Amblyseius swirskii</i>	
Sinonimi	<i>Typhlodromips swirskii</i>
Familja	Phytoseiidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>
Burimi i parë i përhapjes	Në lindje të rajonit të Mesdheut, natyralisht ndodhet në Izrael, Itali, Qipro, Greqi dhe Egjipt, të gjetura në kultura të ndryshme si mollë, kajsia, agrume, perime dhe pambuk
Data e përdorimit të parë	2005 (Austri, Belgjikë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Hungari, Itali, Marok, Holandë, Poloni dhe Turqi)
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Bjellorusi, Belgjikë, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Guernsej, Hungari, Itali, Xhersi, Marok, Holandë, Norvegji, Poloni, Spanjë, Turqi, Mbretëria e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Cheyletus eruditus</i>	
Familja	Cheyletidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Marimangat e ruatjes, marimangat (gjethore).
Burimi i parë i përhapjes	Indigjen
Përhapja në EPPO	Belgjikë, Holandë
Data e përdorimit të parë	1985
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Çeki, Francë, Gjermani, Holandë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
Shënime shtesë	Janë raportuar raste të reaksioneve alergjike tek fermerët
<i>Euseius gallicus</i>	
Familja	Phytoseiidae

Dëmtuesit kryesorë të synuar	Flutra e bardhë (Aleyrodidae) dhe tripsi (Thysanoptera)
Burimi i parë i përhapjes	Europa, zonat detare dhe mesdhetare
Përhapja në EPPO	Belgjikë, Francë, Holandë, Tunizi dhe Turqi
Data e përdorimit të parë	Hollandë, 2010
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Francë, Gjermani, Holandë, Poloni dhe Ukrainë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Hypoaspis aculeifer</i>	
Sinonimet	<i>Geolaelaps aculeifer</i>
Familja	Laelapidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Sciaridae, <i>Rhizoglyphus echinopus</i>
Burimi i parë i përhapjes	Europë
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1995
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Guernsej, Irlandë, Itali, Holandë, Norvegji, Poloni, Portugali, Spanjë, Zvicër, Mbretëria e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Macrocheles robustulus</i>	
Sinonimet	<i>Holostaspis subbadius</i> , <i>Macrocheles coprophila</i>
Familja	Macrochelidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Dëmtuesit që jetojnë në tokë si tripset (pupa) dhe sciarids (larvat)
Burimi i parë i përhapjes	Kosmopolitan
Përhapja në EPPO	Austri, Bullgari, Republika Çeke, Gjeorgji, Gjermani, Greqi, Hungari, Itali, Poloni, Rusi, Sllovaka, Suedi dhe Mbretëria e Bashkuar
Data e përdorimit të parë	2010
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Itali, Holandë, Poloni, Rusi, Spanjë, Suedi, Mbretëri e Bashkuar dhe Ukrainë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Metaseiulus occidentalis</i>	
Sinonimet	<i>Galendromus occidentalis</i> , <i>Typhlodromus occidentalis</i>
Familja	Phytoseiidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Tetranychidae
Burimi i parë i përhapjes	Neartik
Përhapja në EPPO	?
Data e përdorimit të parë	1991
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Danimarkë, Francë, Greqi, Guernsej, Xhersi, Holandë, Poloni, Spanjë, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Neoseiulus californicus</i> (vetëm shtami jo diapauzuese)	
Sinonimet	<i>Amblyseius californicus</i> , <i>Typhlodromus californicus</i> , <i>Amblyseius mungeri</i> , <i>Typhlodromus mungeri</i> , <i>Amblyseius chilensis</i> , <i>Typhlodromus marinus</i>

Familja	Phytoseiidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Tetranychidae
Burimi i parë i përhapjes	Amerika Veriore Jugore/Kaliforni, Mesdhe
Përhapja në EPPO	?
Data e përdorimit të parë	1985
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Guernsej, Irlandë, Itali, Xhersi, Maltë, Holandë, Poloni, Portugali, Spanjë, Zvicër, Tunizi, Mbretëria e Bashkuar (i kufizuar me licencë)
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Neoseiulus cucumeris</i>	
Sinonimet	<i>Amblyseius cucumeris</i>
Familja	Phytoseiidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Thysanoptera (<i>T. tabaci</i> , <i>F. occidentalis</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Kosmopolitan
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur (jo i pranishëm në Suedi, Finlandë, Norvegji)
Data e përdorimit të parë	1985
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Guernsej, Hungari, Irlandë, Itali, Xhersi, Jordani, Lituani, Maltë, Holandë, Norvegji, Poloni, Portugali, Sllovaki, Spanjë, Suedi, Zvicër, Tunizi, Turqi, Mbretëria e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Phytoseiulus persimilis</i>	
Sinonimet	<i>Phytoseiulus riegeli</i> , <i>Phytoseiulus tardi</i>
Familja	Phytoseiidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Tetranychidae (<i>Tetranychus urticae</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Mesdhe
Përhapja në EPPO	Europa Jugore
Data e përdorimit të parë	1968
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Guernsej, Hungari, Irlandë, Itali, Xhersi, Jordani, Lituani, Maltë, Marok, Holandë, Norvegji, Poloni, Portugali, Sllovaki, Spanjë, Suedi, Zvicër, Tunizi, Turqi, Mbretëria e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Stratiolaelaps scimitus</i>	
Sinonimet	<i>Hypoaspis scimitus</i>
Shënimi taksonomik	Speciet janë përdorur më parë me emrin e gabuar <i>Stratiolaelaps miles</i> (= <i>Hypoaspis miles</i> = <i>Geolaelaps miles</i>)
Familja	Laelapidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Sciaridae, <i>Rhizoglyphus echinopus</i>
Burimi i parë i përhapjes	Palaeartik
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1994

Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Irlandë, Itali, Xhersi, Holandë, Norvegji, Poloni, Portugali, Spanjë, Suedi, Zvicër, MB
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Transeius montdorensis</i>	
Sinonimet	<i>Amblyseius montdorensis</i> , <i>Typhlodromips montdorensis</i>
Familja	Phytoseiidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Aleyrodidae (Trialeurodes spp. dhe Bemisia spp.), thrips (<i>Frankinella occidentalis</i> dhe <i>Thrips tabaci</i>) dhe Eriophyidae (<i>Aculops lycopersici</i>), edhe pse do të përdoret kryesisht kundër <i>Frankiniella occidentalis</i>
Burimi i parë i përhapjes	Ishujt e Paqësorit dhe zonat perëndimore të kontinentit Australian
Data e përdorimit të parë	2004
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Holandë, Poloni, Rumani, Spanjë dhe Britani e Madhe
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Typhlodromus pyri</i>	
Familja	Phytoseiidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Panonychus ulmi</i> , <i>Tetranychus urticae</i> , <i>Eriophyes vitis</i> , <i>Epirimerus vitis</i>
Burimi i parë i përhapjes	Europë/Neartik
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1985
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Francë, Gjermani, Hungari, Portugali, Sllovaki
Përdorimi	Në ambiente të hapura

6. Nematoda

<i>Heterorhabditis bacteriophora</i>	
Sinonimet	<i>Heterorhabditis heliothidis</i>
Familja	Heterorhabditidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Vine weevils (<i>Otiorhynchus</i> spp.)
Burimi i parë i përhapjes	Evropa Jugore dhe Qendrore /Amerika e Veriut
Përhapja në EPPO	Evropa Jugore dhe Qendrore
Data e përdorimit të parë	1984
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Francë, Gjermani, Itali, Holandë, Slloveni, Zvicër
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Heterorhabditis downesi</i>	
Sinonimi	Tipi Irlandez i <i>Heterorhabditis</i>
Familja	Heterorhabditidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Vine weevils (<i>Otiorhynchus</i> spp.), <i>Phyllopertha horticola</i> , <i>Hoplia philanthus</i> , <i>Melolontha melolontha</i> , <i>Hylobius abietis</i>

Burimi i parë i përhapjes	Evropë
Përhapja në EPPO	Danimarkë, Gjermani, Hungari, Irlandë, Itali, Mbretëri e Bashkuar
Data e përdorimit të parë	2001
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Irlandë, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/?të hapura
<i>Heterorhabditis megidis</i>	
Familja	Heterorhabditidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Vine weevils (<i>Otiorhynchus</i> spp.)
Burimi i parë i përhapjes	Europë
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1984
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Guernsej, Irlandë, Itali, Xhersi, Holandë, Norvegji, Poloni, Sllovaki, Spanjë, Suedi, Zvicër, Tunizi, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Phasmarhabditis hermaphrodita</i>	
Familja	Phasmarhabditidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Kërmijtë pa guaskë (Slug)
Burimi i parë i përhapjes	Europa Qëndrore
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur (përveç vendeve në veri)
Data e përdorimit të parë	1984
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Danimarkë, Francë, Gjermani, Guernsej, Itali, Xhersi, Holandë, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Steinernema carpocapsae</i>	
Sinonimet	<i>Neoaplectana carpocapsae</i> , <i>N. feltiae</i>
Familja	Steinernematidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Vine weevils (<i>Otiorhynchus</i> spp.), Sciaridae, insektet që vijnë nga toka
Burimi i parë i përhapjes	Evropë (Holarktik)
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1984
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Danimarkë, Francë, Gjermani, Guernsej, Itali, Xhersi, Holandë, Portugali, Slloveni, Suedi, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Steinernema feltiae</i>	
Sinonimet	<i>Neoaplectana feltiae</i> , <i>N. bibionis</i> , <i>Steinernema bibionis</i> , <i>N. leucaniae</i>
Familja	Steinernematidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Melolonthidae, Sciaridae etj.
Burimi i parë i përhapjes	Evropë (Holarktik)
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1984

Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Guernsej, Irlandë, Itali, Xhersi, Holandë, Norvegji, Poloni, Sllovaki, Slloveni, Spanjë, Suedi, Zvicër, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Steinernema glaseri</i>	
Sinonimet	<i>Neoaplectana glaseri</i>
Familja	Steinernematidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Insektet e tokës, veçanërisht Coleoptera duke përfshirë Chrysomelidae, Curculionidae, Elateridae, Scarabaeidae, disa Lepidoptera, Orthoptera etj.
Burimi i parë i përhapjes	Argjentinë, Brazil, Kinë, Republika Çeke, Palestinë, Portugali, Republika e Koresë, Republika Sllovake, Spanjë, Zvicër, SHBA
Përhapja në EPPO	Republika Çeke, Portugali, Republika Sllovake, Spanjë, Zvicër
Data e përdorimit të parë	2004
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Holandë, Belgjikë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Steinernema kraussei</i>	
Familja	Steinernematidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Otiorhynchus sulcatus</i>
Burimi i parë i përhapjes	Në të gjithë Evropën dhe Amerikën e Veriut
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	2001 (në Irlandë)
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Irlandë, Norvegji, shumica e vendeve të tjera evropiane
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura