

VENDIM
Nr. 616, datë 29.10.2025

PËR PËRCAKTIMIN E ELEMENTEVE TË CILËSISË PËR KLASIFIKIMIN E STATUSIT EKOLOGJIK TË LUMENJVE, LIQENEVE, UJËRAVE TRANZITORE, UJËRAVE BREGDETARE DHE TRUPAVE UJORË SIPËRFAQËSORË ARTIFICIALE DHE TEPËR TË MODIFIKUAR, KLASIFIKIMIN E STATUSIT EKOLOGJIK TË TYRE, SI DHE KËRKESAVE PËR KRYERJEN E ANALIZËS SË KARAKTERISTIKAVE DHE VLERËSIMIN E NDIKIMIT TË AKTIVITETIT NJERËZOR NË STATUSIN E UJËRAVE SIPËRFAQËSORE PËR ÇDO BASEN LUMOR OSE LIQENOR¹

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 20, pika 2, e 27, pika 3, të ligjit nr. 29/2024, “Për burimet ujore”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e kërkesave për kryerjen e analizës së karakteristikave dhe vlerësimin e ndikimit të aktivitetit njerëzor në statusin e ujërave sipërfaqësore, përcaktimin e elementeve të cilësisë dhe klasifikimit të statusit ekologjik të trupave ujorë sipërfaqësorë, përcaktimin e cilësisë ekologjike shumë të mirë, të mirë dhe mesatare të ujërave sipërfaqësore, përcaktimin e kriterëve të potencialit ekologjik shumë të mirë, të mirë dhe mesatar të një trupi ujqor tepër të modifikuar ose artificial, si dhe miratimin e procedurës për përcaktimin e standardeve të cilësisë kimike, sipas parashikimeve të këtij vendimi.

2. Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujqore (në vijim “AMBU”) kryen analizën e karakteristikave (në vijim “karakterizimin”) fillestare të trupave ujorë sipërfaqësorë për çdo basen apo rajon baseni lumor, sipas rastit, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në shtojcën I, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

3. AMBU-ja kryen vlerësimin e ndikimit të aktivitetit njerëzor në statusin e trupave ujorë sipërfaqësorë, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në shtojcën II, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

4. Elementet e cilësisë për klasifikimin e statusit ekologjik të lumenjve të liqeneve, ujërave tranzitore dhe ujërave bregdetare përcaktohen në shtojcën III, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

5. Elementet e cilësisë, të përcaktuara në shtojcën III, të këtij vendimi, do të aplikohen njësoj edhe në rastin e trupave ujorë artificiale ose tepër të modifikuar, vetëm në rastet kur këta të fundit përngjajnë me trupat ujorë natyrorë, të specifikuar në pikën 4 të këtij vendimi.

6. Parashikimet e përgjithshme lidhur me klasifikimin e statusit ekologjik të lumenjve, liqeneve, ujërave tranzitore dhe ujërave bregdetare përcaktohen në shtojcën IV, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

7. Parashikimet specifike të statusit ekologjik shumë të mirë, të mirë dhe mesatar të lumenjve, liqeneve, ujërave tranzitore dhe ujërave bregdetare lidhur me elementet biologjike, hidromorfologjike dhe fiziko-kimike të cilësisë përcaktohen në shtojcën V, që është pjesë përbërëse e këtij vendimi.

¹ Ky vendim është përafshuar pjesërisht me:

- direktivën 2000/60/KE të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, datë 23 tetor 2000, “Për krijimin e një kuadri për veprimin e komunitetit në fushën e politikës së ujërave”, të ndryshuar. Numri CELEX 32000L0060, Fletorja Zyrtare e Bashkimit Evropian, seria L, nr. 327, datë 22.12.2000, faqe 1–73.

8. Parashikimet specifike të statusit ekologjik shumë të mirë, të mirë dhe mesatar të trupave ujqorë tepër të modifikuar ose artificiale lidhur me elementet biologjike, hidromorfologjike dhe fiziko-kimike të cilësisë përcaktohen në shtojcën VI, që është pjesë përbërëse e këtij vendimi.

9. Standardet kimike të cilësisë së trupave ujqorë sipërfaqësorë përcaktohen sipas procedurës të parashikuar në shtojcën VII, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

10. Për efekt të zbatimit të këtij vendimi lidhur me karakterizimin e trupave ujqorë do të përdoret sistemi A, sipas shtojcës I, deri në momentin kur të sigurohen të dhënat e nevojshme dhe të mjaftueshme për të përdorur sistemin B.

11. Në vendimin nr. 1015, datë 16.12.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përmbajtjen, zhvillimin dhe zbatimin e Strategjisë Kombëtare të Menaxhimit të Burimeve Ujqore, të planeve të menaxhimit të baseneve ujqore dhe të planeve të menaxhimit të rrezikut nga përmbajtjet”, bëhen këto ndryshime:

a) Në shkronjën “b”, të pikës 1, të kreut 1, të shtojcës II, fjalët “... e ujërave sipërfaqësore ...” hiqen;

b) Pikat 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dhe 1.5, të aneksit I; pikat 1.1 dhe 1.2 në përmbledhjen e aneksit 5, dhe nën-pikat 1.1 dhe 1.2, të pikës 1, “Statusi i ujërave sipërfaqësore”, të aneksit 5, pjesë e shtojcës III, shfuqizohen.

12. Ngarkohen Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujqore dhe Agjencia Kombëtare e Mjedisit për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR
Belinda Balluku

SHTOJCA I KËRKESAT PËR KARAKTERIZIMIN E TRUPAVE UJQORË SIPËRFAQËSORË TË BASENEVE LUMORE

1. KARAKTERIZIMI I TRUPAVE UJQORË SIPËRFAQËSORË

1.1. AMBU-ja identifikon vendndodhjen dhe kufijtë e trupave ujqorë sipërfaqësorë dhe kryen karakterizimin fillestar të tyre, në përputhje me metodologjinë në vijim. AMBU-ja mund të grupojë disa trupa ujqorë sipërfaqësorë, me qëllim karakterizimin fillestar.

1.2. Trupat ujqorë sipërfaqësorë, brenda një baseni lumor, klasifikohen në një rënd prej kategorive të trupave ujqorë sipërfaqësorë të mëposhtëm:

- Lumenj;
- Liqene;
- Ujqëra tranzitore;
- Ujqëra bregdetare;
- Trupa ujqorë sipërfaqësorë artificiale;
- Trupa ujqorë sipërfaqësorë tepër të modifikuar.

1.3. Për secilën prej kategorive të ujërave sipërfaqësore përcaktohen tipat e trupave ujqorë sipërfaqësorë, brenda basenit lumor. Këta tipa përcaktohen duke përdorur sistemin A ose sistemin B, siç përcaktohet në tabelat 1–8.

1.4. Nëse përdoret sistemi A, trupat ujqorë sipërfaqësorë, brenda basenit lumor (lumenj, liqene, trupa ujqorë artificiale dhe tepër të modifikuar), klasifikohen fillimisht në rajonin ekologjik Dinarik të Ballkanit Perëndimor ose (ujërat bregdetare dhe kalimtare) në rajonin ekologjik të detit Mesdhe. Trupat ujqorë, brenda këtyre rajoneve ekologjike (paraqitur në figurën 1 më poshtë), përcaktohen sipas tipit të trupit ujqor, në përputhje me parashikimet e përshkruara në tabelat 1, 3, 5 dhe 7.

1.5. Nëse përdoret sistemi B (me faktorë të detyrueshëm dhe jo të detyrueshëm), i parashtruar në tabelat 2, 4, 6 dhe 8, duhet të arrihet të paktën i njëjti nivel diferencimi, si në rastin kur do të përdorej sistemi A. Trupat ujqorë sipërfaqësorë, brenda basenit lumor, diferencohen në bazë të

vlerave të përshkruesve të detyrueshëm. Këta përshkrues të detyrueshëm apo kombinimi i tyre mundësojnë përcaktimin e saktë të kushteve biologjike, reference specifike për çdo tip trupi ujqor.

1.6. Për trupat ujqorë artificialë dhe tepër të modifikuar, diferencimi bëhet në përputhje me përshkruesit e kategorisë së trupit ujqor, me të cilin këta trupa ujqorë ngjasojnë më shumë.

1.7. AMBU-ja publikon hartën ose hartat (në format GIS) të vendndodhjeve gjeografike të këtyre tipave, sipas shkallës së diferencimit që kërkohet nga sistemi A, si pjesë përbërëse e planeve të menaxhimit të baseneve lumore përkatëse.

2. TIPAT E TRUPAVE UJQORË SIPËRFAQËSORË

2.1. Lumenjtë

Tabela 1. SISTEMI A

Tipologjia	Përshkruesit	
	Tipologjia e lartësisë (TL)	
<i>Tipi</i>	<i>Përshkrimi</i>	<i>Lartësia</i>
	e ulët	<200 m
	mesatare	200–800 m
	e lartë	> 800 m
	Tipologjia e madhësisë bazuar në zonën ujëmbajtëse (TZU)	
	<i>Përshkrimi</i>	<i>Madhësia</i>
	e vogël	10-100 km ²
	mesatare	101–1.000 km ²
	e madhe	1.001–10.000 km ²
	shumë e madhe	> 10.000 km ²
	Tipologjia e bazuar në gjeologji (TGj)	
	<i>Përshkrimi</i>	
	gëlqeror	
	silicor	
	organik	

Tabela 2. SISTEMI B

Karakterizimi alternativ	Faktorët fizikë dhe kimikë që mund të përcaktojnë karakteristikat e lumit apo pjesëve të lumit dhe, për rrjedhojë, strukturën dhe përbërjen biologjike të popullatës
<i>Faktorët e detyrueshëm</i>	lartësia gjerësia gjatësia gjeologjia madhësia
<i>Faktorët jo të detyrueshëm</i>	largësia nga burimi energji e rrjedhës (funksion i prurjes dhe i pjerrësisë) gjerësia mesatare e ujit thellësia mesatare e ujit pjerrësia mesatare e ujit forma dhe trajta e shtratit kryesor të lumit

Karakterizimi alternativ	Faktorët fizikë dhe kimikë që mund të përcaktojnë karakteristikat e lumit apo pjesëve të lumit dhe, për rrjedhojë, strukturën dhe përbërjen biologjike të popullatës
<i>Faktorët e detyrueshëm</i>	lartësia gjerësia gjatësia gjeologjia madhësia
	kategoria e prurjes së lumit forma e luginës transporti i mbetjeve të ngurta aftësia për të neutralizuar acidin përbërja mesatare e substratit klorur diapazoni i temperaturës së ajrit temperatura mesatare e ajrit reshjet

2.2. Liqenet

Tabela 3. SISTEMI A

Tipologjia	Përshkruesit	
<i>Tipi</i>	<i>Tipologjia e lartësisë (TL)</i>	
	<i>Përshkrimi</i>	<i>Lartësia</i>
	e ulët	<200 m
	mesatare	200—800 m
	e lartë	> 800 m
	<i>Tipologjia e thellësisë bazuar në thellësinë mesatare</i>	
	<i>Përshkrimi</i>	<i>Thellësia</i>
	e cekët	<3 m
	mesatare	3—15 m
	e thellë	> 15 m
	<i>Tipologjia e madhësisë bazuar në sipërfaqe</i>	
	<i>Përshkrimi</i>	<i>Sipërfaqja</i>

	e vogël	0,5–1 km ²
	mesatare	1–10 km ²
	e madhe	10–100 km ²
	shumë e madhe	> 100 km ²
	<i>Tipologjia e bazuar në gjeologji</i>	
	<i>Përshkrimi</i>	
	gëlqeror	
	silicor	
	organik	

Tabela 4. SISTEMI B

Karakterizimi alternativ	Faktorët fizikë dhe kimikë që mund të përcaktojnë karakteristikat e liqenit dhe, për rrjedhojë, strukturën dhe përbërjen biologjike të popullatës
<i>Faktorët e detyrueshëm</i>	lartësia gjerësia gjatësia thellësia gjeologjia madhësia
<i>Faktorët jo të detyrueshëm</i>	thellësia mesatare e trupit ujqor forma e liqenit koha e qëndrimit temperatura mesatare e ajrit diapazoni i temperaturës së ajrit karakteristikat e përziera (për shembull monomike, dimike, polimike) kapaciteti acid-neutralizues përmbajtja e lëndëve ushqyese përbërja mesatare e substratit luhatja e nivelit të ujit

2.3. Ujërat tranzitore

Tabela 5. SISTEMI A

Tipologjia	Përshkruesit	
<i>Tipi</i>	<i>Bazuar në kripësinë mesatare vjetore</i>	
	<i>Përshkrimi</i>	<i>Vlera</i>
	ujërat e ëmbla	< 0,5 ‰
	oligohaline	0,5 deri në < 5 ‰
	mezohaline	5 deri në 18‰
	polihaline	18 deri në 30‰
	euhaline	30 deri në 40‰
	<i>Bazuar në diapazonin baticor mesatar</i>	
	<i>Përshkrimi</i>	<i>Diapazoni</i>
	mikrobaticor	<2 m
	mezobaticor	2–4 m
	makrobaticor	> 4 m

Tabela 6. SISTEMI B

Karakterizimi alternativ	Faktorët fizikë dhe kimikë që mund të përcaktojnë karakteristikat e liqenit dhe, për rrjedhojë, strukturën dhe përbërjen biologjike të popullatës
<i>Faktorët e detyrueshëm</i>	gjerësia gjatësia diapazoni baticor kripësia

Karakterizimi alternativ	Faktorët fizikë dhe kimikë që mund të përcaktojnë karakteristikat e liqenit dhe, për rrjedhojë, strukturën dhe përbërjen biologjike të popullatës
<i>Faktorët e detyrueshëm</i>	gjerësia gjatësia diapazoni baticor kripësia
<i>Faktorët jo të detyrueshëm</i>	thellësia shpejtësia e rrymës ekspozimi i valëve koha e qëndrimit temperatura mesatare e ujit karakteristikat e përziera turbullira përbërja mesatare e substratit forma diapazoni i temperaturës së ujit

2.4. Ujërat bregdetare

Tabela 7. SISTEMI A

Tipologjia	Përshkruesit	
<i>Tipi</i>	<i>Bazuar në kripësinë mesatare vjetore</i>	
	<i>Përshkrimi</i>	<i>Vlera</i>
	ujëra të ëmbla	< 0.5 ‰
	oligohaline	0.5 deri në < 5 ‰
	mezohaline	5 deri në < 18 ‰
	det polihalin	18 deri në < 35 ‰
	det euhalin	35 deri në < 40 ‰
	<i>Bazuar në thellësinë mesatare</i>	
	<i>Përshkrimi</i>	<i>Thellësia</i>
	ujëra të cekëta	<30 m
	ujëra mesatare	30–200 m
	ujëra të thella	> 200 m

Tabela 8. SISTEMI B

Karakterizimi alternativ	Faktorët fizikë dhe kimike që mund të përcaktojnë karakteristikat e liqenit dhe, për rrjedhojë, strukturën dhe përbërjen biologjike të popullatës
<i>Faktorët e detyrueshëm</i>	gjerësia gjatësia amplituda e baticës kripësia
<i>Faktorët jo të detyrueshëm</i>	shpejtësia e rrymës ekspozimi i valëve temperatura mesatare e ujit karakteristikat e përziera turbullira koha e qëndrimit (e gjireve të mbyllura) përbërja mesatare e substratit diapazoni i temperaturës së ujit

3. PËRCAKTIMI I KUSHTEVE REFERENCE SPECIFIKE PËR TIPAT E TRUPAVE UJORË SIPËRFAQËSORË

3.1. Për çdo trup uhor të karakterizuar në përputhje me pikën 1, të kësaj shtojce përcaktohen:

a) kushtet hidromorfologjike dhe fiziko-kimike specifike për tipin, që përfaqësojnë vlerat e elementeve hidromorfologjike dhe fiziko-kimike të cilësisë, të përshkruara në pikën 2, të kësaj shtojce, vetëm për ata trupa uhorë, të klasifikuar me status ekologjik shumë të mirë, të përcaktuar në përputhje me elementet e cilësisë dhe përkufizimet normative në shtojcave III, IV dhe V, të këtij vendimi;

b) kushtet biologjike reference specifike për tipin e trupit uhor, duke pasur parasysh vlerat e elementeve biologjike të cilësisë, të specifikuara për atë tip trupi uhor sipërfaqësor, të klasifikuar me status ekologjik shumë të mirë, të përcaktuar në përputhje me elementet e cilësisë dhe përkufizimet normative në shtojcat III, IV dhe V, të këtij vendimi.

3.2. Në rastin e trupave uhorë sipërfaqësorë artificiale ose tepër të modifikuara, si referencë për statusin ekologjik shumë të mirë, do të përdoret potenciali ekologjik maksimal, i klasifikuar në përputhje me parashikimet e shtojcës VI, të këtij vendimi. Vlera e potencialit ekologjik maksimal, për çdo trup uhor, do të rishikohet çdo 6 vjet.

3.3. Përcaktimi i kushteve specifike, për çdo tip trupi uhor, për qëllim të nënplikave 3.1 dhe 3.2, të kësaj pike, mund të kryhet me metodën hapësinore apo me modelim ose përmes kombinimit të tyre. Kur përdorimi i këtyre metodave nuk është i mundur, AMBU-ja mund të mbështetet në gjykimin profesional të ekspertëve të fushës. Në përcaktimin e statusit ekologjik shumë të mirë, lidhur me përqendrimet e ndotësve të veçantë, kufijtë e diktimit do të jenë ato që mund të arrihen në përputhje me teknikat e disponueshme, në kohën kur këto kushte reference specifike për tipin janë përcaktuar dhe që bazohen në të dhënat e niveleve për një komponim të caktuar (pra nga monitorimet/analizat që janë bërë sa arrin vlera mesatare e diktimit të këtij parametri), përveç përputhjes me teknikat.

3.4. AMBU-ja, për kushtet biologjike reference specifike për tipat e trupave ujorë, të përcaktuara me metodën hapësinore, krijon një rrjet reference për çdo tip trupi ujor sipërfaqësor. Rrjeti duhet të përmbajë një sërë vendndodhjesh me status shumë të mirë për të siguruar nivelin e duhur të besueshmërisë së vlerave të kushteve reference, duke pasur parasysh ndryshueshmërinë e vlerave të elementeve të cilësisë, që përkojnë me statusin ekologjik shumë të mirë, për atë tip trupi ujor sipërfaqësor, si dhe teknikat e modelimit që do të përdoren sipas përcaktimeve të nënpikës 3.5.

3.5. Kushtet biologjike reference, specifike për tipin e trupit ujor, të përcaktuara nëpërmjet modelimit, mund të identifikohen duke përdorur modelet parashikuese ose modele që rikrijojnë të shkuarën, bazuar në të dhëna historike. Modelet mbështeten në të dhënat historike, paleologjike dhe të dhëna të tjera dhe duhet të paraqesin një nivel besueshmërie të mjaftueshëm rreth vlerave për kushtet reference, duke siguruar se kushtet e përcaktuara janë në përputhje dhe të vlefshme për çdo tip trupi ujor sipërfaqësor.

3.6. Në rastet kur nuk është i mundur përcaktimi i kushteve reference të besueshme, specifike për tipin e trupit ujor, për një element të cilësisë, për shkak të shkallës së lartë të ndryshueshmërisë natyrore të atij elementi, që vjen jo vetëm si rezultat i ndryshimeve stinore, atëherë ky element mund të përjashtohet nga vlerësimi i statusit ekologjik. Në çdo rast, në vlerësimin e cilësisë duhet të merret në konsideratë lloji i elementit dhe pesha e tij, si dhe fakti nëse ka ose jo parametra të tjerë që luajnë rol të ngjashëm apo japin informacion për këtë vlerësim. AMBU-ja parashtron arsyet për këtë përjashtim në planin e menaxhimit të basenit lumor përkatës.

SHTOJCA II

IDENTIFIKIMI I PRESIONEVE DHE VLERËSIMI I NDIKIMIT TË AKTIVITETIT NJERËZOR

1. IDENTIFIKIMI I PRESIONEVE

AMBU-ja mbledh dhe ruan informacionet për llojet dhe magnitudën e presioneve antropogjene domethënëse, të cilat mund të prekin trupat ujorë sipërfaqësorë të çdo baseni lumor, veçanërisht për:

1.1. Vlerësimin dhe identifikimin e ndotjes pikësore të konsiderueshme, veçanërisht të shkaktuar nga ato substanca që do të përcaktohen në përputhje me parashikimet e pikës 2, të nenit 67, të pikës 3, të nenit 75, dhe të pikës 3, të nenit 80, të ligjit nr. 29/2024, “Për burimet ujore”, të ndryshuar, të cilat gjenerohen nga veprimtaria urbane, industriale, bujqësore dhe instalime apo veprimtari të tjera, të identifikuara, në kuadër të legjislacionit për burimet ujore dhe mbrojtjen mjedisore;

1.2. Vlerësimin dhe identifikimin e ndotjeve jopikësore të konsiderueshme, veçanërisht të shkaktuara nga ato substanca, që përcaktohen në përputhje me parashikimet e pikës 2, të nenit 67, të pikës 3, të nenit 75, dhe të pikës 3, të nenit 80, të ligjit nr. 29/2024, “Për burimet ujore”, të ndryshuar, të cilat gjenerohen nga veprimtaria urbane, industriale, bujqësore dhe instalime apo veprimtari të tjera, të identifikuara në kuadër të legjislacionit për burimet ujore dhe mbrojtjen mjedisore;

1.3. Vlerësimin dhe identifikimin e vendndodhjeve të nxjerrjes së ujit nga veprimtari urbane, industriale, bujqësore dhe përdorimet e tjera, duke përfshirë edhe luhatjet stinore, kërkesën e përgjithshme vjetore dhe humbjet e ujit në sistemet e shpërndarjes;

1.4. Vlerësimin dhe identifikimin e ndikimit të rregullave të rëndësishme të rrjedhjes së ujit, duke përfshirë dhe transferimin e ujit dhe ndryshimin e tij për karakteristikat e përgjithshme të rrjedhjes dhe për balancat ujore;

1.5. Identifikimin e ndryshimeve morfologjike të konsiderueshme të trupave ujorë, përfshirë edhe vlerësimin e ndikimeve antropogjene, të cilat mund të shkaktojnë dëmtimin e shtratit të lumit të tilla, si nxjerrja e inerteve lumore, prita ujore, diga etj.;

1.6. Vlerësimin dhe identifikimin e ndikimeve të tjera antropogjene në statusin e ujërave sipërfaqësore;

1.7. Vlerësimin e veçorive të përdorimit të tokës, duke përfshirë identifikimin e zonave urbane, industriale, bujqësore e, kur shihet e përshtatshme, edhe të zonave të peshkimit e të atyre pyjore.

2. VLERËSIMI I NDIKIMIT

2.1. AMBU-ja kryen një vlerësim lidhur me aftësinë e trupit ujqor për të përballuar presionet e identifikuar, në përputhje me pikën 1, të kësaj shtojce, në raport me statusin e trupit ujqor sipërfaqësor përkatës.

2.2. Për vlerësimin e mundësive që ka trupi ujqor sipërfaqësor, brenda basenit lumor, për të mos arritur objektivat e cilësisë mjedisore, të përcaktuara për atë tip trupi ujqor, përdoret informacioni i grumbulluar sipas pikës 1, të kësaj shtojce, apo çdo informacion tjetër, përfshirë edhe të dhënat e monitorimit mjedisor. Për të plotësuar këtë vlerësim mund të përdoren edhe teknikat e modelimit.

2.3. Për trupat ujorë të identifikuar në rrezik për mospërmbyshje të objektivave të cilësisë mjedisore, AMBU-ja kryen karakterizimin e mëtejshëm, kur shihet e përshtatshme për të përmirësuar, si programin e monitorimit të ujërave, ashtu edhe programet e masave të planeve të menaxhimit të baseneve lumore.

SHTOJCA III

ELEMENTET E CILËSISË PËR KLASIFIKIMIN E STATUSIT EKOLOGJIK

1. ELEMENTET E CILËSISË PËR KLASIFIKIMIN E STATUSIT EKOLOGJIK TË LUMENJVE

1.1 . Elementet e cilësisë për klasifikimin e statusit ekologjik të lumenjve përbëhen nga:

1.1.1. Elementet biologjike:

- a) përbërja dhe larmia e florës ujore;
- b) përbërja dhe larmia e faunës bentike jovertebrore;
- c) përbërja, larmia dhe struktura moshore e faunës së peshqve.

1.1.2. Elementet hidromorfologjike, që mbështesin elementet biologjike:

- a) regjimi hidrologjik:
 - i. sasia dhe dinamika e rrjedhës ujore;
 - ii. lidhja me trupat ujorë nëntokësorë.
- b) vijimësia e lumit;
- c) kushtet morfologjike;
- ç) thellësia dhe variacioni i lumit;
- d) struktura dhe nënshtresa e shtratit të lumit;
- dh) struktura e zonës së bregut.

1.1.3. Elementet kimike dhe fiziko-kimike, që mbështesin elementet biologjike:

- a) të përgjithshme:
 - i. kushtet termale;
 - ii. kushtet e oksigjenimit;

- iii. kripësia;
- iv. statusi i acidifikimit;
- v. gjendja e lëndëve ushqyese.

b) ndotës të veçantë:

- i. ndotja nga të gjitha substancat prioritare, që janë identifikuar se shkarkohen në trupin ujor;
- ii. ndotja nga substanca të tjera që janë identifikuar se shkarkohen në trupin ujor në sasi të konsiderueshme.

2. ELEMENTET E CILËSISË PËR KLASIFIKIMIN E STATUSIT EKOLOGJIK TË LIQENEVE

2.1. Elementet e cilësisë për klasifikimin e statusit ekologjik të liqeneve përbëhen nga:

2.1.1. Elementet biologjike:

- a) përbërja, larmia dhe biomasa e fitoplanktonit;
- b) përbërja dhe larmia e florës tjetër ujore;
- c) përbërja dhe larmia e faunës bentike jovertevrore;
- ç) përbërja, larmia dhe struktura moshore e faunës së peshqve.

2.1.2. Elementet hidromorfologjike, që mbështesin elementet biologjike:

a) regjimi hidrologjik:

- i. sasia dhe dinamika e rrjedhës ujore;
- ii. koha e qëndrimit;
- iii. lidhja me trupat ujorë nëntokësorë.

b) kushtet morfologjike:

- i. variacioni i thellësisë së liqenit;
- ii. sasia, struktura dhe nënshtresa e shtratit të liqenit;
- iii. struktura e bregut të liqenit.

2.1.3. Elementet kimike dhe fiziko-kimike, që mbështesin elementet biologjike:

a) të përgjithshme:

- i. transparencia;
- ii. kushtet termale;
- iii. kushtet e oksigjenimit;
- iv. kripësia;
- v. statusi i acidifikimit;
- vi. gjendja e lëndëve ushqyese.

b) ndotës të veçantë:

- i. ndotja nga të gjitha substancat prioritare, që janë identifikuar se shkarkohen në trupin ujor;
- ii. ndotja nga substanca të tjera, që janë identifikuar se shkarkohen në trupin ujor në sasi të konsiderueshme.

3. ELEMENTET E CILËSISË PËR KLASIFIKIMIN E STATUSIT EKOLOGJIK TË UJËRAVE TRANZITORE

3.1. Elementet e cilësisë për klasifikimin e statusit ekologjik të ujërave tranzitore përbëhen nga:

3.1.1. Elementet biologjike:

- a) përbërja, larmia dhe biomasa e fitoplanktonit;
- b) përbërja dhe larmia e florave të tjera ujore;
- c) përbërja dhe larmia e faunës bentike jovertevrore;
- ç) përbërja, larmia dhe struktura moshore e faunës së peshqve.

3.1.2. Elementet hidromorfologjike, që mbështesin elementet biologjike:

a) kushtet morfologjike:

- i. variacionet e thellësisë;
- ii. sasia, struktura dhe nënshtresa e shtratit;
- iii. struktura e zonës ndëraticore;

b) regjimi baticor:

- i. rrjedha e ujërave të ëmbla;

- ii. ekspozimi i valëve.
- 3.1.3. Elementet kimike dhe fiziko-kimike, që mbështesin elementet biologjike:
 - a) të përgjithshme:
 - i. transparenca;
 - ii. kushtet termale;
 - iii. kushtet e oksigjenimit;
 - iv. kripësia;
 - v. gjendja e lëndëve ushqyese.
 - b) ndotës të veçantë:
 - i. ndotja nga të gjitha substancat prioritare, që janë identifikuar se shkarkohen në trupin ujor;
 - ii. ndotja nga substanca të tjera, të cilat janë identifikuar, që shkarkohen në trupin ujor në sasi të konsiderueshme.

4. ELEMENTET E CILËSISË PËR KLASIFIKIMIN E STATUSIT EKOLOGJIK TË UJËRAVE BREGDETARE

- 4.1. Elementet e cilësisë për klasifikimin e statusit ekologjik të ujërave kalimtare përbëhen nga:
 - 4.1.1. Elementet biologjike:
 - a) përbërja, larmia dhe biomasa e fitoplanktonit;
 - b) përbërja dhe larmia e florës të tjetra ujore;
 - c) përbërja dhe larmia e faunës bentike jovertevrore;
 - 4.1.2. Elementet hidromorfologjike, që mbështesin elementet biologjike:
 - a) kushtet morfologjike:
 - i. variacionet e thellësisë;
 - ii. struktura dhe nënshtresa e shtratit të bregdetit;
 - iii. struktura e zonës ndëraticore.
 - b) regjimi baticor:
 - i. drejtimi i rrymave dominuese;
 - ii. ekspozimi i valëve.
 - 4.1.3. Elementet kimike dhe fiziko-kimike, që mbështesin elementet biologjike:
 - a) të përgjithshme:
 - i. transparenca;
 - ii. kushtet termale;
 - iii. kushtet e oksigjenimit;
 - iv. kripësia;
 - v. gjendja e lëndëve ushqyese.
 - b) ndotës të veçantë:
 - i. ndotja nga të gjitha substancat prioritare, që janë identifikuar se shkarkohen në trupin ujor;
 - ii. ndotja nga substanca të tjera, që janë identifikuar se shkarkohen në trupin ujor në sasi të konsiderueshme.

SHTOJCA IV

PËRKUFIZIMET E PËRGJITHSHME NORMATIVE PËR KLASIFIKIMIN E STATUSIT EKOLOGJIK TË LUMENJVE, LIQENEVE, UJËRAVE TRANZITORE DHE UJËRAVE BREGDETARE

Elementi	Statusi shumë i mirë	Statusi i mirë	Statusi mesatar
Të përgjithshme	Nuk ka ose ka shumë pak ndryshime antropogjene të vlerave të elementeve fiziko-kimike dhe hidromorfologjike të cilësisë për tipin e trupit ujor sipërfaqësor, krahasuar me vlerat tipike për tipin e trupit	Vlerat e elementeve biologjike të cilësisë për tipin e trupit ujor sipërfaqësor paraqesin nivele të ulëta devijimi për shkak të veprimtarive antropogjene, por që	Vlerat e elementeve biologjike të cilësisë për tipin e trupit ujor sipërfaqësor devijojnë mesatarisht nga vlerat tipike për tipin e trupit ujor sipërfaqësor në kushte natyrore. Vlerat paraqesin

	ujor në kushte natyrore. Vlerat e elementeve biologjike të cilësisë për trupin ujq sipërfaqësor pasqyrojnë vlerat tipike të tipit të trupit ujq në kushte natyrore dhe nuk paraqesin asnjë devijim ose shumë pak devijime. Këto janë kushtet dhe komunitetet specifike për llojin.	devijojnë lehtësisht, krahasuar me vlerat tipike të tipit të trupit ujq sipërfaqësor në kushte natyrore.	devijim mesatar për shkak të veprimtarive antropogjene dhe devijojnë në mënyrë të konsiderueshme, krahasuar me vlerat në kushtet e statusit të mirë.
--	---	---	---

Ujërat me status nën kategorinë mesatare klasifikohen si ujëra me status të dobët ose të keq.

Ujërat që shfaqin ndryshime madhore të vlerave të elementeve biologjike të cilësisë për tipin e trupit ujq sipërfaqësor, ku komunitetet biologjike devijojnë në mënyrë të konsiderueshme, krahasuar me ato të tipit të trupit ujq sipërfaqësor në kushte natyrore, klasifikohen me status të dobët.

Ujërat që shfaqin ndryshime madhore të vlerave biologjike të cilësisë për tipin e trupit ujq sipërfaqësor, ku mungon një pjesë e madhe e komuniteteve biologjike tipike për atë tip trupi ujq sipërfaqësor në kushte natyrore, klasifikohen me status të keq.

SHTOJCA V

1. PËRKUFIZIMET E STATUSIT EKOLOGJIK SHUMË TË MIRË, TË MIRË DHE MESATAR TË LUMENJVE PËR ELEMENTET BIOLOGJIKE, HIDROMORFOLOGJIKE DHE FIZIKO-KIMIKE TË CILËSISË

Elementi	Statusi shumë i mirë	Statusi i mirë	Statusi mesatar
Elementet biologjike të cilësisë			
Fitoplanktoni	Përbërja taksonomike e fitoplanktonit përkon plotësisht ose thuajse plotësisht me kushtet natyrore. Abondanca mesatare e fitoplanktonit përkon tërësisht me kushtet fiziko-kimike specifike për llojin dhe nuk është në atë nivel sa të ndryshojë në mënyrë domethënëse kushtet specifike për llojin për transparencën. Frekuenca dhe intensiteti i	Ka ndryshime të vogla në përbërjen dhe abondancën e taksoneve të fitoplanktonit, krahasuar me komunitetet specifike për llojin. Këto ndryshime nuk tregojnë për rritjen e përshpejtuar të algave, që sjell dëmtim të padëshiruar të ekuilibrit të organizmave të pranishme në trupin ujq ose të cilësisë fiziko-kimike të ujit ose të sedimentit. Mund të ketë rritje të	Përbërja e taksoneve të planktonit ndryshon mesatarisht nga komunitetet specifike për llojin. Abondanca ndryshon në mënyrë të moderuar dhe në nivele të tilla që mund të krijojë devijime të padëshiruara në vlerat e elementeve të tjera biologjike dhe fiziko-kimike të cilësisë. Mund të ketë rritje të moderuar të frekuencës dhe intensitetit të lulëzimeve të

	lulëzimeve të planktonit janë të njëjta me kushtet kushtet fiziko-kimike specifike për llojin.	lehtë të frekuencës dhe intensitetit të lulëzimeve të planktonit specifike për llojin.	planktonit. Mund të ketë lulëzime persistente gjatë muajve të verës.
Makrofitet dhe fitobentosit	Përbërja taksonomike përkon plotësisht ose thuhet plotësisht me kushtet natyrore. Nuk ka ndryshime të dukshme të abundancës mesatare të makrofiteve dhe fitobentosit.	Ka ndryshime të vogla të përbërjes dhe abundancës së taksoneve të makrofiteve dhe fitobentosit, krahasuar me komunitetet specifike për llojin. Këto ndryshime nuk paraqesin rritje të përshtetshme të fitobentosit ose formave më të zhvilluara të jetës bimore, që sjellin shqetësime të padëshiruara të ekuilibrit të organizmave të pranishëm në trupin ujor ose në cilësinë fiziko-kimike të ujit ose të sedimentit. Komuniteti i fitobentosit nuk ndikohet në mënyrë të parikthyeshme nga grupime bakteriale të pranishme, si rezultat i veprimtarive antropogjene.	Përbërja e taksoneve të makrofiteve dhe të fitobentosit ndryshon në mënyrë të moderuar nga ato specifike për llojin dhe ka devijime të konsiderueshme, krahasuar me kushtet kur statusi është i mirë. Ka ndryshime të moderuara të abundancës mesatare të makrofiteve dhe të fitobentosit. Komuniteti i fitobentosit mund të ndikohet dhe në disa zona mund edhe të zhvendoset nga grupime bakteriale të pranishme, si rezultat i veprimtarive antropogjene.
Fauna e invertebrorëve bentikë	Përbërja dhe abondanca taksonomike përkon plotësisht ose thuhet plotësisht me kushtet natyrore. Raporti midis taksoneve sensitive dhe atyre josensitive nuk shfaq asnjë shenjë devijimi nga nivelet natyrore. Niveli i diversitetit të taksoneve invertebrore nuk paraqet asnjë shenjë devijimi nga nivelet e natyrore.	Ka ndryshime të vogla në përbërjen dhe abundancën e taksoneve invertebrore nga komunitetet specifike për llojin. Raporti midis taksoneve sensitive dhe atyre josensitive, shfaq shenja të vogla devijimi nga nivelet specifike për llojin. Niveli i diversitetit të taksoneve invertebrore shfaq shenja të vogla devijimi nga nivelet e specifike për llojin.	Përbërja dhe abondanca e taksoneve invertebrore ndryshon mesatarisht nga komunitetet specifike për llojin. Mungojnë tërësisht grupet kryesore taksonomike të komunitetit specifik për llojin. Raporti midis taksoneve sensitive dhe atyre josensitive është më i ulët se niveli specifik për llojin dhe shumë më i ulët se niveli në statusin e mirë.
Fauna e peshqve	Përbërja dhe abondanca e llojeve përkon plotësisht ose thuhet plotësisht me kushtet natyrore. Janë të pranishme të gjitha llojet sensitive specifike për llojin. Strukturat moshore të komuniteteve të peshqve shfaqin shenja të vogla të	Ka ndryshime të vogla në përbërje dhe abundancë, krahasuar me komunitetet specifike për llojin për shkak të ndikimeve antropogjene në elementet fiziko-kimike dhe hidromorfologjike të cilësisë. Strukturat moshore të komuniteteve të peshqve	Përbërja dhe abondanca e peshqve ndryshojnë në mënyrë të moderuar, krahasuar me komunitetet specifike për llojin për shkak të ndikimeve antropogjene në elementet e fiziko-kimike dhe hidromorfologjike të cilësisë. Struktura moshore e

	ndikimit nga veprimtaritë antropogjene dhe nuk shfaqin mungesë riprodhimi apo zhvillimi të ndonjë lloji veçantë.	shfaqin shenja shqetësimesh, për shkak të ndikimeve antropogjene në elementet fiziko-kimike dhe hidromorfologjike të cilësisë dhe në disa raste janë tregues të mungesës së riprodhimit dhe zhvillimit të ndonjë lloji të veçantë, deri në atë masë sa disa klasa moshore mund të mos jenë të pranishme.	komuniteteve të peshqve shfaq shenja të mëdha të shqetësimeve antropogjene, deri në atë masë sa një pjesë e moderuar e llojeve specifike mungonjnë tërësisht ose kanë abondancë të ulët.
Elementet hidromorfologjike të cilësisë			
Regjimi hidrologjik	Sasia dhe dinamikat e rrjedhës dhe lidhja, si pasojë me ujërat nëntokësore reflektojnë plotësisht ose thajse plotësisht me kushtet natyrore.	Kushtet në përputhje me arritjen e vlerave, të përcaktuara më lart për elementet biologjike të cilësisë.	Kushtet në përputhje me arritjen e vlerave, të përcaktuara më lart për elementet biologjike të cilësisë.
Vazhdimësia e lumit	Vazhdimësia e lumit nuk ndikohet nga veprimtaritë antropogjene dhe lejon migrimin natyror të organizmave ujorë dhe transportin e sedimenteve.	Kushtet në përputhje me arritjen e vlerave, të përcaktuara më lart për elementet biologjike të cilësisë.	Kushtet në përputhje me arritjen e vlerave, të përcaktuara më lart për elementet biologjike të cilësisë.
Kushtet morfologjike	Tipologjia e kanaleve, variacionet e gjerësisë dhe thellësisë, shpejtësitë e prurjes, si dhe struktura dhe gjendja e zonës së bregut përkojnë plotësisht ose thajse plotësisht me kushtet natyrore.	Kushtet në përputhje me arritjen e vlerave, të përcaktuara më lart për elementet biologjike të cilësisë.	Kushtet në përputhje me arritjen e vlerave, të përcaktuara më lart për elementet biologjike të cilësisë.
Kushtet fiziko-kimike të cilësisë ⁽¹⁾			
Kushtet e përgjithshme	Vlerat e elementeve fiziko-kimike përkojnë plotësisht ose thajse plotësisht me kushtet natyrore. Përqendrimet e lëndëve ushqyese janë brenda diapazonit të kushteve natyrore. Nivelet e kripësisë, pH, bilancit të oksigjenit, kapacitetit acid-netrualizues dhe temperaturës nuk shfaqin shenja të ndikimeve antropogjene dhe janë brenda diapazonit të kushteve natyrore.	Temperatura, bilanci i oksigjenit, pH, kapaciteti acid-neutralizues dhe kripësia nuk i tejkalojnë nivelet e diapazonit të përcaktuar, me qëllim që të sigurohet funksionimi i ekosistemit specifik për llojin dhe arritja e vlerave, të përcaktuara më sipër për elementet biologjike të cilësisë. Përqendrimet e lëndëve ushqyese nuk i tejkalojnë nivelet e përcaktuara me qëllim që të sigurohet funksionimi i ekosistemit dhe arritja e vlerave, të	Kushtet në përputhje me arritjen e vlerave, të përcaktuara më lart për elementet biologjike të cilësisë.

		përcaktuara më sipër për elementet biologjike të cilësisë.	
Ndotësit sintetikë specifikë	Përqendrimet janë në vlera thuajse zero dhe të paktën nën kufijtë e diktimit të teknikave më të avancuara analitike në përdorim të përgjithshëm.	Përqendrimet nuk i tejkalojnë standardet e përcaktuara në përputhje me procedurën për përcaktimin e standardeve kimike të cilësisë, të parashikuar në përputhje me procedurën e detajuar në shtojcën VII, të këtij vendimi ⁽²⁾ , pa ndikuar në nxjerrjen në treg të produkteve të mbrojtjes së bimëve dhe biocideve (< SCM)	Kushtet në përputhje me arritjen e vlerave, të përcaktuara më lart për elementet biologjike të cilësisë.
Ndotësit josintetikë specifikë	Përqendrimet janë brenda diapazonit tipik për kushtet natyrore (nivelet e natyrore = nn). ⁽¹⁾	Përqendrimet nuk i tejkalojnë standardet e përcaktuara në përputhje me procedurën për përcaktimin e standardeve të cilësisë kimike, të parashikuar në përputhje me procedurën e detajuar në shtojcën VII, të këtij vendimi ⁽²⁾ , pa ndikuar në nxjerrjen në treg të produkteve të mbrojtjes së bimëve dhe biocideve (< SCM)	Kushtet në përputhje me arritjen e vlerave, të përcaktuara më lart për elementet biologjike të cilësisë.

⁽¹⁾ Shkurtime të përdorura kanë këto kuptime: nn = niveli natyror; SCM = standardet e cilësisë mjedisore;

⁽²⁾ Zbatimi i standardeve, që rrjedhin nga ky protokoll, nuk kërkon zvogëlimin e përqendrimeve të ndotjes nën nivelet natyrore (SCM > nn).

2. PËRKUFIZIMET E STATUSIT EKOLOGJIK SHUMË TË MIRË, TË MIRË DHE MESATAR TË LIQENEVE PËR ELEMENTET BIOLOGJIKE, HIDROMORFOLOGJIKE DHE FIZIKO-KIMIKE TË CILËSISË

Elementi	Statusi shumë i mirë	Statusi i mirë	Statusi mesatar
Elementet biologjike të cilësisë			
Fitoplanktoni	Përbërja taksonomike dhe abondanca e fitoplanktonit përkon plotësisht ose thuajse plotësisht me kushtet natyrore.	Ka ndryshime të vogla në përbërjen dhe abondancën e taksoneve të fitoplanktonit, krahasuar me komunitetet specifike për llojin. Këto ndryshime nuk tregojnë për rritjen e përsheptuar të algave, që sjell dëmtim të padëshiruar të ekuilibrit të organizmave të pranishme në trupin ujor ose të cilësisë fiziko-kimike të ujit ose të sedimentit.	Përbërja e taksoneve të planktonit ndryshon mesatarisht nga komunitetet specifike për llojin.
	Biomasa mesatare e fitoplanktonit përkon tërësisht me kushtet fiziko-kimike specifike për llojin dhe nuk është në atë nivel sa të ndryshojë në mënyrë domethënëse kushtet specifike për llojin për transparencën.	Mund të ketë rritje të lehtë	Abondanca ndryshon në mënyrë të moderuar dhe në nivele të tilla që mund krijojë devijime të padëshiruara në vlerat e elementeve të tjera biologjike dhe fiziko-kimike të cilësisë. Mund të ketë rritje të

	Frekuenca dhe intensiteti i lulëzimeve të planktonit janë të njëjta me kushtet kushtet fiziko-kimike specifike për llojin.	të frekuencës dhe intensitetit të lulëzimeve të planktonit, specifike për llojin.	moderuar të frekuencës dhe intensitetit të lulëzimeve të planktonit. Mund të ketë lulëzime persistente gjatë muajve të verës.
Makrofitet dhe fitobentosit	Përbërja taksonomike e fitoplanktonit përkon plotësisht ose thuhet plotësisht me atë në kushte normale. Nuk ka ndryshime të dukshme të abundancës mesatare të makrofiteve dhe fitobentosit.	Ka ndryshime të vogla në përbërjen dhe abundancën e taksoneve të makrofiteve dhe fitobentosit, krahasuar me komunitetet specifike për llojin. Këto ndryshime nuk paraqesin rritje të përsheptuar të fitobentosit ose formave më të zhvilluara të jetës bimore, që ndikojnë negativisht në ekuilibrin e organizmave të pranishëm në trupin ujor ose në cilësinë fiziko-kimike të ujit apo të sedimentit. Komuniteti fitobentik nuk ndikohet negativisht nga grupime bakteriale të pranishme për shkak të veprimtarisë antropogjene.	Përbërja e taksoneve makrofite dhe fitobentike ndryshon në nivel mesatar nga komuniteti specifik për llojin dhe ka devijime të konsiderueshme, krahasuar me përbërjen në statusin e mirë. Ka ndryshime të moderuara të abundancës mesatare të makrofiteve dhe fitobentosit. Komuniteti i fitobentosit mund të ndikohet dhe në disa zona, mund edhe të zhvendoset nga grupime bakteriale të pranishme, si rezultat i veprimtarive antropogjene.
Fauna e invertebrorëve bentikë	Përbërja dhe abundanca taksonomike përkon plotësisht ose thuhet plotësisht me kushtet natyrore. Raporti midis taksoneve sensitive dhe atyre josensitive nuk shfaq asnjë shenjë devijimi nga nivelet natyrore. Niveli i diversitetit të taksoneve invertebrorë nuk paraqet asnjë shenjë devijimi nga nivelet e natyrore.	Ka ndryshime të vogla në përbërjen dhe abundancën e taksoneve invertebrorë nga komunitetet specifike për llojin. Raporti midis taksoneve sensitive dhe atyre josensitive shfaq shenja të vogla devijimi nga nivelet specifike për llojin. Niveli i diversitetit të taksoneve invertebrorë shfaq shenja të vogla devijimi nga nivelet e specifike për llojin.	Përbërja dhe abundanca e taksoneve invertebrorë ndryshon mesatarisht nga komunitetet specifike për llojin. Mungojnë tërësisht grupet kryesore taksonomike të komunitetit specifik për llojin. Raporti midis taksoneve sensitive dhe atyre josensitive është më i ulët se niveli specifik për llojin dhe shumë më i ulët se niveli në statusin e mirë.
Fauna e peshqve	Përbërja dhe abundanca e llojeve përkon plotësisht ose thuhet plotësisht me kushtet natyrore. Janë të pranishme të gjitha llojet sensitive specifike për llojin. Strukturat moshore të komuniteteve të peshqve shfaqin shenja të vogla të ndikimit nga veprimtaritë antropogjene dhe nuk shfaqin mungesë riprodhimi apo zhvillimi të	Ka ndryshime të vogla në përbërje dhe abundancë, krahasuar me komunitetet specifike për llojin për shkak të ndikimeve antropogjene në elementet fiziko-kimike dhe hidromorfologjike të cilësisë. Strukturat moshore të komuniteteve të peshqve shfaqin shenja shqetësimesh, për shkak të ndikimeve antropogjene në elementet fiziko-kimike	Përbërja dhe abundanca e peshqve ndryshojnë në mënyrë të moderuar, krahasuar me komunitetet specifike për llojin për shkak të ndikimeve antropogjene në elementet e fiziko-kimike dhe hidromorfologjike të cilësisë. Struktura moshore e komuniteteve të peshqve shfaq shenja të mëdha të shqetësimeve

	ndonjë lloji të veçantë.	dhe hidromorfologjike të cilësisë dhe në disa raste janë tregues të mungesës së riprodhimit dhe të zhvillimit të ndonjë lloji të veçantë, deri në atë masë sa disa klasa moshore mund të mos jenë të pranishme.	antropogjene, deri në atë masë sa një pjesë e moderuar e llojeve specifike mungojnë tërësisht ose kanë abondancë të ulët.
Elementet hidromorfologjike të cilësisë			
Regjimi hidrologjik	Cilësia dhe dinamika e rrjedhës, niveli, koha e qëndrimit dhe ndërlidhja me ujërat nëntokësore reflektojnë plotësisht ose thajse plotësisht kushtet natyrore.	Kushtet në përputhje me arritjen e vlerave të përcaktuara më lart për elementet biologjike të cilësisë.	Kushtet në përputhje me arritjen e vlerave, të përcaktuara më lart për elementet biologjike të cilësisë.
Kushtet morfologjike	Variacionet e thellësisë së liqenit, sasisë dhe struktura e substratit, si dhe struktura dhe kushtet e zonës së bregut të liqenit përkojnë plotësisht ose thajse plotësisht me kushtet natyrore.	Kushtet në përputhje me arritjen e vlerave, të përcaktuara më lart për elementet biologjike të cilësisë.	Kushtet në përputhje me arritjen e vlerave, të përcaktuara më lart për elementet biologjike të cilësisë.
Elementet fiziko-kimike të cilësisë (1)			
Kushtet e përgjithshme	Vlerat e elementeve fiziko-kimike përkojnë plotësisht ose thajse plotësisht me kushtet natyrore. Përqendrimet e lëndëve ushqyese janë brenda diapazonit të kushteve natyrore. Nivelet e kripësisë, pH, bilancit të oksigjenit, kapacitetit acid-netrualizues dhe temperaturës nuk shfaqin shenja të ndikimeve antropogjene dhe janë brenda diapazonit të kushteve natyrore.	Temperatura, bilanci i oksigjenit, pH, kapaciteti acid-neutralizues dhe kripësia nuk i tejkalojnë nivelet e diapazonit të përcaktuar, me qëllim që të sigurohet funksionimi i ekosistemit specifik për llojin dhe arritja e vlerave të përcaktuara më sipër për elementet biologjike të cilësisë. Përqendrimet e lëndëve ushqyese nuk i tejkalojnë nivelet e përcaktuara me qëllim që të sigurohet funksionimi i ekosistemit dhe arritja e vlerave të përcaktuara më sipër për elementet biologjike të cilësisë.	Kushtet në përputhje me arritjen e vlerave, të përcaktuara më lart për elementet biologjike të cilësisë.
Ndotësit sintetikë specifikë	Përqendrimet janë në vlera thajse zero dhe të paktën nën kufijtë e diktimit të teknikave më të avancuara analitike në përdorim të përgjithshëm.	Përqendrimet nuk i tejkalojnë standardet e përcaktuara në përputhje me procedurën për përcaktimin e standardeve kimike të cilësisë, të parashikuar në përputhje me procedurën e detajuar	Kushtet në përputhje me arritjen e vlerave të përcaktuara më lart për elementet biologjike të cilësisë.

		në shtojcën VII, të këtij vendimi ⁽²⁾ , pa ndikuar në nxjerrjen në treg të produkteve të mbrojtjes së bimëve dhe biocideve (< SCM)	
Ndotësit josintetike specifike	Përqendrimet janë brenda diapazonit tipik për kushtet natyrore (nivelet e natyrore = nn). ⁽¹⁾	Përqendrimet nuk i tejkalojnë standardet e përcaktuara, në përputhje me procedurën për përcaktimin e standardeve të cilësisë kimike, të parashikuar në përputhje me procedurën e detajuar në shtojcën VII, të këtij vendimi ⁽²⁾ , pa ndikuar në nxjerrjen në treg të produkteve të mbrojtjes së bimëve dhe biocideve (< SCM)	Kushtet në përputhje me arritjen e vlerave të përcaktuara më lart për elementet biologjike të cilësisë.

⁽¹⁾ Shkurtime të përdorura kanë këto kuptime: nn = niveli natyror; SCM = standardet e cilësisë mjedisore;

⁽²⁾ Zbatimi i standardeve, që rrjedhin nga ky protokoll, nuk kërkon zvogëlimin e përqendrimeve të ndotjes në nivelet natyrore (SCM > nn).

3. PËRKUFIZIMET E STATUSIT EKOLOGJIK SHUMË TË MIRË, TË MIRË DHE MESATAR TË UJËRAVE TRANZITORE PËR ELEMENTET BIOLOGJIKE, HIDROMORFOLOGJIKE DHE FIZIKO-KIMIKE TË CILËSISË

Elementi	Statusi shumë i mirë	Statusi i mirë	Statusi mesatar
Elementet biologjike të cilësisë			
Fitoplanktoni	Përbërja taksonomike dhe abondanca e fitoplanktonit përkon plotësisht ose thuhet plotësisht me kushtet natyrore. Biomasa mesatare e fitoplanktonit përkon tërësisht me kushtet fiziko-kimike specifike për llojin dhe nuk është në atë nivel sa të ndryshojë në mënyrë domethënëse kushtet specifike për llojin për transparencën. Frekuenca dhe intensiteti i lulëzimeve të planktonit janë të njëjta me kushtet fiziko-kimike specifike për llojin.	Ka ndryshime të vogla në përbërjen dhe abondancën e taksoneve të fitoplanktonit. Ka ndryshime të vogla në biomasë, krahasuar me kushtet specifike për llojin. Këto ndryshime nuk tregojnë për rritjen e përshtetshme të algave, që sjell dëmtrim të padëshiruar të ekuilibrit të organizmave të pranishme në trupin ujor ose të cilësisë fiziko-kimike të ujit. Mund të ketë rritje të lehtë të frekuencës dhe intensitetit të lulëzimeve të planktonit specifike për llojin.	Përbërja e taksoneve të fitoplanktonit ndryshon mesatarisht nga komunitetet specifike për llojin. Biomasa ndryshon në mënyrë të moderuar dhe në nivele të tilla që mund të krijojë devijime të padëshiruara në vlerat e elementeve të tjera biologjike dhe fiziko-kimike të cilësisë. Mund të ketë rritje të moderuar të frekuencës dhe intensitetit të lulëzimeve të planktonit. Mund të ketë lulëzime persistente gjatë muajve të verës.
Makroalgat	Përbërja përkon plotësisht ose thuhet plotësisht me kushtet natyrore.	Ka ndryshime të vogla në përbërjen dhe abondancën e taksoneve të makroalgave, krahasuar	Përbërja e taksoneve të makroalgave ndryshon në nivel mesatar nga kushtet specifike për llojin dhe ka devijime të

	Nuk ka ndryshime të dukshme në mbulesën e makroalgave për shkak të veprimtarive antropogjene.	me komunitetet specifike për llojin. Këto ndryshime nuk paraqesin rritje të përsheptuar të fitobentosit ose formave më të zhvilluara të jetës bimore, që ndikojnë negativisht në ekuilibrin e organizmave të pranishëm në trupin ujqor ose në cilësinë fiziko-kimike të ujit.	konsiderueshme, krahasuar me përbërjen në statusin e mirë. Ka ndryshime të moderuara të abondancës, të tilla që mund të ndikojnë negativisht në ekuilibrin e organizmave të pranishëm në trupin ujqor.
Angiospermet (bimët me lule)	Përbërja taksonomike përkon plotësisht ose thajse plotësisht me kushtet natyrore. Nuk ka ndryshime të dukshme të abondancës për shkak të veprimtarive antropogjene.	Ka ndryshime të vogla në përbërjen e taksoneve të angiospermeve, krahasuar me komunitetet specifike për llojin. Abondanca e angiospermeve shfaq shenja të vogla ndikimi.	Përbërja e taksoneve të angiospermeve ndryshon në nivel mesatar nga komunitetet specifike për llojin dhe ka devijime të konsiderueshme, krahasuar me përbërjen në statusin e mirë. Ka ndryshime të moderuara në abondancën e taksoneve të angiospermeve.
Fauna e invertebrorëve bentikë	Niveli i diversitetit dhe abondancës së taksoneve të invertebrorëve është brenda diapazonit tipik në kushtet natyrore. Janë të pranishme të gjitha taksonet sensitive të lidhura me kushtet natyrore.	Niveli i diversitetit dhe abondancës së taksoneve të invertebrorëve është lehtësisht jashtë diapazonit të kushteve specifike për llojin. Është e pranishme pjesa më e madhe e taksoneve sensitive të komuniteteve specifike për llojin.	Niveli i diversitetit dhe abondancës së taksoneve të invertebrorëve është mesatarisht jashtë diapazonit të kushteve specifike për llojin. Janë të pranishme taksonet treguese të ndotjes. Mungojnë shumë prej taksoneve sensitive të komuniteteve specifike për llojin.
Fauna e peshqve	Përbërja dhe abondanca e llojeve është në përputhje me kushtet natyrore.	Abondanca e llojeve sensitive shfaq shenja të vogla devijimi nga kushtet specifike për llojin për shkak të ndikimeve antropogjene në elementet fiziko-kimike dhe hidromorfologjike të cilësisë.	Mungon një pjesë e moderuar e llojeve sensitive ndaj ndotjes, si rezultat i ndikimeve antropogjene në elementet fiziko-kimike ose hidromorfologjike të cilësisë.
Elementet hidromorfologjike të cilësisë			
Regjimi baticor	Regjimi i rrjedhës së ujërave të ëmbla përkon plotësisht ose thajse plotësisht me kushtet natyrore.	Kushtet në përputhje me arritjen e vlerave, të përcaktuara më lart për elementet biologjike të cilësisë.	Kushtet në përputhje me arritjen e vlerave, të përcaktuara më lart për elementet biologjike të cilësisë.
Kushtet morfologjike	Variacionet e thellësisë, kushtet e substratit, si dhe struktura dhe kushtet e zonës ndëraticore përkrijnë plotësisht ose thajse plotësisht me kushtet natyrore.	Kushtet në përputhje me arritjen e vlerave, të përcaktuara më lart për elementet biologjike të cilësisë.	Kushtet, në përputhje me arritjen e vlerave, të përcaktuara më lart për elementet biologjike të cilësisë.

Kushtet e përgjithshme	Elementet fiziko-kimike përkojnë plotësisht ose thuhet plotësisht me kushtet natyrore. Përqendrimet e lëndëve ushqyese janë brenda diapazonit tipik për kushtet natyrore. Temperatura, bilanci i oksigjenit dhe transparenca nuk paraqesin shenja të shqetësimeve antropogjene dhe janë brenda diapazonit tipik për kushtet natyrore.	Temperatura, bilanci i oksigjenit, pH, kapaciteti acid-neutralizues dhe kripësia nuk i tejkalojnë nivelet e diapazonit të përcaktuar, me qëllim që të sigurohet funksionimi i ekosistemit specifik për llojin dhe arritja e vlerave, të përcaktuara më sipër për elementet biologjike të cilësisë. Përqendrimet e lëndëve ushqyese nuk i tejkalojnë nivelet e përcaktuara, me qëllim që të sigurohet funksionimi i ekosistemit dhe arritja e vlerave, të përcaktuara më sipër për elementet biologjike të cilësisë.	Kushtet në përputhje me arritjen e vlerave, të përcaktuara më lart për elementet biologjike të cilësisë.
Ndotësit sintetikë specifikë	Përqendrimet janë në vlera thuhet zero dhe të paktën nën kufijtë e diktimit të teknikave më të avancuara analitike në përdorim të përgjithshëm.	Përqendrimet nuk i tejkalojnë standardet e përcaktuara në përputhje me procedurën për përcaktimin e standardeve kimike të cilësisë, të parashikuara në përputhje me procedurën e detajuar në shtojcën VII, të këtij vendimi ⁽²⁾ , pa ndikuar në nxjerrjen në treg të produkteve të mbrojtjes së bimëve dhe biocideve (< SCM)	Kushtet në përputhje me arritjen e vlerave të përcaktuara më lart për elementet biologjike të cilësisë.
Ndotësit josintetikë specifikë	Përqendrimet janë brenda diapazonit tipik për kushtet e pa shqetësuar (nivelet natyrore: nn). ⁽¹⁾	Përqendrimet nuk i tejkalojnë standardet e përcaktuara në përputhje me procedurën e detajuar në shtojcën VII, të këtij vendimi ⁽²⁾ , pa ndikuar në nxjerrjen në treg të produkteve të mbrojtjes së bimëve dhe biocideve (< SCM)	Kushtet në përputhje me arritjen e vlerave, të përcaktuara më lart për elementet biologjike të cilësisë.

⁽¹⁾ Shkurtime të përdorura kanë këto kuptime: nn = niveli natyror; SCM = standardet e cilësisë mjedisore;

⁽²⁾ Zbatimi i standardeve, që rrjedhin nga ky protokoll, nuk kërkon zvogëlimin e përqendrimeve të ndotjes nën nivelet natyrore: (SCM > nn).

4. PËRKUFIZIMET E STATUSIT EKOLOGJIK SHUMË TË MIRË, TË MIRË DHE MESATAR TË UJËRAVE BREGDETARE PËR ELEMENTET BIOLOGJIKE, HIDROMORFOLOGJIKE DHE FIZIKO-KIMIKE TË CILËSISË

Elementi	Statusi shumë i mirë	Statusi i mirë	Statusi mesatar
Elementet cilësore biologjike			

Fitoplanktoni	Përbërja taksonomike dhe abondanca e fitoplanktonit përkon plotësisht ose thuhet plotësisht me kushtet natyrore. Biomasa mesatare e fitoplanktonit përkon tërësisht me kushtet fiziko-kimike specifike për llojin dhe nuk është në atë nivel sa të ndryshojë në mënyrë domethënëse kushtet specifike për llojin për transparencën. Frekuenca dhe intensiteti i lulëzimeve të planktonit janë të njëjta me kushtet fiziko-kimike specifike për llojin.	Ka ndryshime të vogla në përbërjen dhe abondancën e taksonëve të fitoplanktonit. Ka ndryshime të vogla në biomasë, krahasuar me kushtet specifike për llojin. Këto ndryshime nuk tregojnë për rritjen e përsheptuar të algave, që sjell dëmtim të padëshiruar të ekuilibrit të organizmave të pranishme në trupin ujor ose të cilësisë fiziko-kimike të ujit. Mund të ketë rritje të lehtë të frekuencës dhe intensitetit të lulëzimeve të planktonit specifike për llojin.	Përbërja e taksonëve të fitoplanktonit ndryshon mesatarisht nga komunitetet specifike për llojin. Biomasa ndryshon në mënyrë të moderuar dhe në nivele të tilla, që mund të krijojë devijime të padëshiruara në vlerat e elementeve të tjera biologjike dhe fiziko-kimike të cilësisë. Mund të ketë rritje të moderuar të frekuencës dhe intensitetit të lulëzimeve të planktonit. Mund të ketë lulëzime persistente gjatë muajve të verës.
Makroalgat dhe angiospermet	Janë të pranishme të gjitha taksonet sensitive të makroalgave dhe angiospermeve, të lidhura me kushtet natyrore. Niveli i abondancës së angiospermeve dhe mbulesa e makroalgave janë në përputhje me kushtet natyrore.	Janë të pranishme shumica e taksonëve sensitive të makroalgave dhe angiospermeve, të lidhura me kushtet natyrore. Niveli i abondancës së angiospermeve dhe mbulesa e makroalgave shfaqin shenja të vogla ndikimi.	Mungon një numër i moderuar i taksonëve sensitive të makroalgave dhe angiospermeve, të lidhura me kushtet natyrore. Niveli i abondancës së angiospermeve dhe mbulesa e makroalgave ndryshojnë në mënyrë të moderuar aq sa mund të shkaktojnë dëmtim të padëshiruar të ekuilibrit të organizmave të pranishëm në trupin ujor.
Fauna e invertebrorëve bentikë	Niveli i diversitetit dhe abondancës së taksonëve të invertebrorëve është brenda diapazonit tipik për kushtet natyrore. Janë të pranishme të gjitha taksonet sensitive ndaj ndikimit, të lidhura me kushtet natyrore.	Niveli i diversitetit dhe abondancës së taksonëve të invertebrorëve është lehtësisht jashtë diapazonit të kushteve specifike për llojin. Është e pranishme pjesa më e madhe e taksonëve të sensitive të komuniteteve specifike për llojin.	Niveli i diversitetit abondancës së taksonëve të invertebrorëve e tejkalon mesatarisht diapazonin tipik për kushtet specifike për llojin. Janë të pranishme taksonet treguese të ndotjes. Mungojnë shumë prej taksonëve sensitive të komuniteteve specifike për llojin.
Elementet hidromorfologjike të cilësisë			
Regjimi baticor	Regjimi i rrjedhës së ujërave të ëmbla, si dhe drejtimi dhe shpejtësia e rrymave dominuese	Kushtet në përputhje me arritjen e vlerave, të përcaktuara më lart për elementet biologjike të	Kushtet në përputhje me arritjen e vlerave, të përcaktuara më lart për elementet biologjike të

	përkojnë plotësisht ose thuhet plotësisht me kushtet natyrore.	cilësisë.	cilësisë.
Kushtet morfologjike	Variacionet e thellësisë, struktura dhe substrati i shtratit bregdetar, si dhe struktura dhe kushtet e zonave ndërbaticore përkojnë plotësisht ose thuhet plotësisht me kushtet natyrore.	Kushtet në përputhje me arritjen e vlerave, të përcaktuara më lart për elementet biologjike të cilësisë.	Kushtet në përputhje me arritjen e vlerave, të përcaktuara më lart për elementet biologjike të cilësisë.
Elementet fiziko-kimike të cilësisë			
Kushtet e përgjithshme	Elementet fiziko-kimike përkojnë plotësisht ose thuhet plotësisht me kushtet natyrore. Përqendrimet e lëndëve ushqyese janë brenda diapazonit tipik për kushtet natyrore. Temperatura, bilanci i oksigjenit dhe transparencja nuk paraqesin shenja të shqetësimeve antropogjene dhe janë brenda diapazonit tipik për kushtet natyrore.	Temperatura, bilanci i oksigjenit, pH, kapaciteti acid-neutralizues dhe kripësia nuk i tejkalojnë nivelet e diapazonit të përcaktuar, me qëllim që të sigurohet funksionimi i ekosistemit specifik për llojin dhe arritja e vlerave, të përcaktuara më sipër për elementet biologjike të cilësisë. Përqendrimet e lëndëve ushqyese nuk i tejkalojnë nivelet e përcaktuara, me qëllim që të sigurohet funksionimi i ekosistemit dhe arritja e vlerave të përcaktuara më sipër për elementet biologjike të cilësisë.	Kushtet në përputhje me arritjen e vlerave, të përcaktuara më lart për elementet biologjike të cilësisë.
Ndotësit sintetikë specifikë	Përqendrimet janë në vlera thuhet zero dhe të paktën nën kufijtë e diktimit të teknikave më të avancuara analitike në përdorim të përgjithshëm.	Përqendrimet nuk i tejkalojnë standardet e përcaktuara, në përputhje me procedurën për përcaktimin e standardeve kimike të cilësisë, të parashikuara në përputhje me procedurën e detajuar në shtojcën VII, të këtij vendimi ⁽²⁾ , pa ndikuar në nxjerrjen në treg të produkteve të mbrojtjes së bimëve dhe biocideve (< SCM)	Kushtet në përputhje me arritjen e vlerave të përcaktuara më lart për elementet biologjike të cilësisë.
Ndotësit josintetikë specifikë	Përqendrimet janë brenda diapazonit tipik për kushtet e pashqetësuara (nivelet natyrore: nn). ⁽¹⁾	Përqendrimet nuk i tejkalojnë standardet e përcaktuara, në përputhje me procedurën e detajuar në shtojcën VII, të këtij vendimi ⁽²⁾ , pa ndikuar në nxjerrjen në treg të produkteve të mbrojtjes së bimëve dhe biocideve (< SCM)	Kushtet në përputhje me arritjen e vlerave, të përcaktuara më lart për elementet biologjike të cilësisë.

⁽¹⁾ Shkurtime e përdorura kanë këto kuptime: nn = niveli natyror; SCM = standardet e cilësisë mjedisore;
⁽²⁾ Zbatimi i standardeve, që rrjedhin nga ky protokoll, nuk kërkon zvogëlimin e përqendrimeve të ndotjes nën nivelet natyrore (SCM > nn).

SHTOJCA VI
PÛRKUFIZIMET E POTENCIALIT EKOLOGJIK SHUMË TË MIRË, TË MIRË DHE
MESATAR TË TRUPAVE UJORË TEPËR TË MODIFIKUAR OSE ARTIFICIALË PËR
ELEMENTET BIOLOGJIKE DHE HIDROMORFOLOGJIKE TË CILËSISË, KUSHTET
E PËRGJITHSHME, NDOTËSIT SINTETIKË SPECIFIKË DHE NDOTËSIT
JOSINTETIKË SPECIFIKË

Elementi		Potencial ekologjik shumë i mirë	Potencial ekologjik i mirë	Potencial ekologjik mesatar
Elementet biologjike të cilësisë		Vlerat e elementeve përkatëse biologjike ngjasojnë në një masë të konsiderueshme me vlerat e lidhura me tipin e trupit uhor sipërfaqësor të krahasueshëm, duke marrë parasysh kushtet fizike për shkak të karakteristikave artificiale ose tepër të modifikuara të trupit uhor.	Ka ndryshime të vogla të vlerave të elementeve përkatëse biologjike, krahasuar me vlerat tipike të potencialit ekologjik shumë të mirë.	Ka ndryshime të moderuara të vlerave të elementeve përkatëse biologjike, krahasuar me vlerat tipike të potencialit ekologjik shumë të mirë. Këto vlera devijojnë në mënyrë të konsiderueshme nga ato të cilësisë së mirë.
Elementet hidromorfologjike		Kushtet hidromorfologjike janë në përputhje me të vetmet ndikime në trupin uhor sipërfaqësor, që vijnë si rezultat i karakteristikave artificiale apo tepër të modifikuara të trupit uhor, pas marrjes së masave zbutëse, për sigurimin e përafërimit më të mirë të mundshëm të vijimësisë ekologjike, veçanërisht për sa u përket migrimit të faunës dhe terrenit të favorshëm për lëshimin e vezëve dhe shumimin.	Kushtet, në përputhje me arritjen e vlerave, të përcaktuara më lart për elementet biologjike të cilësisë.	Kushtet, në përputhje me arritjen e vlerave, të përcaktuara më lart për elementet biologjike të cilësisë.
Elementet fiziko-kimike	Kushtet e përgjithshme	Elementet fiziko-kimike përkojnë plotësisht ose thuajse plotësisht me kushtet natyrore tipike për tipin e trupit uhor sipërfaqësor më të afërt, të krahasueshëm me trupin uhor artificial apo tepër të modifikuar. Përqendrimet e lëndëve ushqyese janë brenda diapazonit tipik për kushtet e pashqetësuara.	Vlerat e elementeve fiziko-kimike janë brenda diapazonit të përcaktuar, me qëllim që të sigurohet funksionimi i ekosistemit dhe arritja e vlerave të përcaktuara më sipër për elementet biologjike të cilësisë. Temperatura dhe pH nuk i tejkalojnë	Kushtet në përputhje me arritjen e vlerave, të përcaktuara më lart për elementet biologjike të cilësisë.

		Nivelet e temperaturës, bilancit të oksigjenit dhe pH janë në përputhje me vlerat më të afërta, të krahasueshme me tipin e trupit ujqor sipërfaqësor në kushte natyrore.	nivelet e diapazonit të përcaktuar, me qëllim që të sigurohet funksionimi i ekosistemit dhe arritja e vlerave, të përcaktuara më sipër për elementet biologjike të cilësisë. Përqendrimet e lëndëve ushqyese nuk i tejkalojnë nivelet e përcaktuara, me qëllim që të sigurohet funksionimi i ekosistemit dhe arritja e vlerave, të përcaktuara më sipër për elementet e cilësisë biologjike.	
	Ndotësit sintetikë specifikë	Përqendrimet thuhet zero dhe të paktën nën kufijtë e diktimit të teknikave më të avancuara analitike në përdorim të përgjithshëm	Përqendrimet nuk i tejkalojnë standardet e përcaktuara në përputhje me procedurën e detajuar në shtojcën VII, të këtij vendimi ⁽¹⁾ , pa ndikuar në nxjerrjen në treg të produkteve të mbrojtjes së bimëve dhe biocideve (< SCM)	Kushtet në përputhje me arritjen e vlerave të përcaktuara më lart për elementet biologjike të cilësisë.
	Ndotësit josintetikë specifikë	Përqendrimet mbeten brenda diapazonit tipik për kushte natyrore, që i përket tipit të trupit ujqor sipërfaqësor më të afërt, të krahasueshëm me trupin ujqor artificial ose tepër të modifikuar (nivelet natyrore = nn).	Përqendrimet nuk i tejkalojnë standardet e përcaktuara, në përputhje me procedurën e detajuar në shtojcën VII, të këtij vendimi ⁽¹⁾ , pa ndikuar në nxjerrjen në treg të produkteve të mbrojtjes së bimëve dhe biocideve (< SCM)	Kushtet në përputhje me arritjen e vlerave, të përcaktuara më lart për elementet biologjike të cilësisë.

Zbatimi i standardeve, që rrjedhin nga ky protokoll, nuk kërkon zvogëlimin e përqendrimeve të ndotjes nën nivelet natyrore (SCM > nn).

SHTOJCA VII

PROCEDURA E PËRCAKTIMIT TË STANDARDEVE KIMIKE TË CILËSISË

1. AMBU-ja, për të përcaktuar standardet e cilësisë mjedisore për ndotësit e renditur në pikën 2, të kësaj shtojce, për mbrojtjen e biotës ujore, merr në konsideratë parashikimet e përcaktuara në këtë shtojcë.

2. Ndotësit kryesorë, të përmendur në pikën 1, të kësaj shtojce, janë si më poshtë vijon:

a) Komponimet organohalogjene dhe substancat që mund të formojnë këto komponime në mjedisin ujor;

b) Komponimet organofosfore;

c) Komponimet organike që përmbajnë kallajin;

ç) Substancat dhe preparatet ose produktet e krijuara nga shpërbërja e tyre, për të cilat është vërtetuar se kanë veti karcinogjene ose mutagjene dhe që mund të ndikojnë në funksionet steroidogjene, tiroidike, riprodhuese dhe funksione të tjera, të lidhura me sistemin endokrin në ose nëpërmjet mjedisit ujor;

d) Hidrokarburet e qëndrueshme dhe substancat e qëndrueshme organike toksike të bioakumulueshme;

dh) Cianidet;

e) Metalet dhe komponimet e tyre;

ë) Arseniku dhe komponimet e tij;

f) Biocidet dhe produktet e mbrojtjes së bimëve;

g) Materialet pezull;

gj) Substancat që kontribuojnë në eutrofikim (veçanërisht nitratat dhe fosfatet);

h) Substancat, të cilat kanë ndikim jo të favorshëm në bilancin e oksigjenit (dhe mund të maten përmes parametreve, si BOD, COD etj.).

3. Standardet e cilësisë mjedisore mund të përcaktohen për ujin, sedimentin ose biotën. Kur është e mundur, për ndotësit e listuar në pikën 2, të kësaj shtojce, Agjencia Kombëtare e Mjedisit, si institucioni përgjegjës për monitorimin e mjedisit, do të grumbullojë, si të dhëna akute, ashtu edhe kronike për taksonet e mëposhtme, të cilat janë të rëndësishme për tipin e trupit ujor përkatës, si dhe për çdo takson tjetër ujor, për të cilin ka të dhëna në dispozicion. Grupet bazë të taksoneve janë:

a) algat dhe/ose makrofitet ujore;

b) dafnia ose organizmat, përfaqësues të ujërave të kripura;

c) peshqit.

4. AMBU-ja ndjek hapat e mëposhtëm për përcaktimin e përqendrimit maksimal mesatar vjetor:

a) AMBU-ja sigurohet që në çdo rast të jenë përcaktuar faktorët e përshtatshëm të sigurisë, në përputhje me natyrën dhe cilësinë e të dhënave të disponueshme dhe me metodat për kryerjen e vlerësimit të sigurisë, sipas parashikimeve në legjislacionin për menaxhimin e kimikateve, si dhe me faktorët e sigurisë, të paraqitur në tabelën 1:

Tabela 1. Faktorët e Sigurisë

	Faktori i sigurisë
Të paktën një L(E)C ₅₀ akut për secilën prej tri niveleve trofike të grupit bazë	1 000
Një NOEC kronik (peshq, dafnia ose organizma përfaqësues të ujërave të kripura)	100
Dy NOEC kronikë nga llojet që përfaqësojnë dy nivele trofike (peshq, dafnia ose organizma përfaqësues të ujërave të kripura)	50
NOEC kronike për të paktën tri lloje (zakonisht peshq, dafnia ose organizma përfaqësues të ujërave të kripura dhe alga), që përfaqësojnë tri nivele trofike	10
Raste të tjera, përfshirë të dhëna nga terreni apo ekosisteme model, të cilat lejojnë përllogaritje dhe zbatim sa më të saktë të faktorëve të sigurisë	Vlerësimi, rast pas rasti

b) Kur ka të dhëna për qëndrueshmërinë dhe bioakumulimin, atëherë ato merren parasysh për përcaktimin e vlerës përfundimtare të standardit të cilësisë mjedisore;

c) Kështu, standardi duhet krahasuar me çdo evidencë të studimeve nga terreni. Në rast se vërehen anomali, përlogaritjet duhen rishikuar për të mundësuar llogaritje më të saktë të faktorit të sigurisë;

ç) Standardi i përfutur i nënshtrohet shqyrtimit dhe konsultimit publik, në mënyrë që të llogaritet një faktor sigurie sa më i saktë.