



www.qbz.gov.al

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare

Viti: 2023 – Numri: 119

Tiranë – E martë, 8 gusht 2023

PËRMBAJTJA

	Faqe
Udhëzim i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr. 19, datë 2.8.2023	Mbi vendosjen e rregullave specifike për kontrollin zyrtar të trikinelës në mish..... 14607
Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr. 448, datë 1.8.2023	Për importin e kafshëve të llojit derra, produkteve, nënprodukteve të tyre, materialit biologjik, embrioneve, mishit dhe nënprodukteve të tyre nga Maqedonia e Veriut..... 14620
Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr. 449, datë 1.8.2023	Për importin e kafshëve të llojit derra, produkteve, nënprodukteve të tyre, materialit biologjik, embrioneve, mishit dhe nënprodukteve të tyre nga Estonia..... 14623
Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr. 454, datë 2.8.2023	Për listën e agentëve të kontrollit biologjik në territorin e Republikës së Shqipërisë..... 14625
Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr. 455, datë 2.8.2023	Për përditësimin e urdhrit të ministrit nr. 275, datë 5.5.2023, “Për miratimin e lëndëve vepruese dhe përbërësve të tjerë, në përmbajtje të PMB-ve” 14658
Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr. 456, datë 2.8.2023	Për importin e kafshëve të llojit derra, produkteve, nënprodukteve të tyre, materialit biologjik, embrioneve, mishit dhe nënprodukteve të tyre nga Kroacia..... 14671
Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr. 457, datë 2.8.2023	Për importin e kafshëve të llojit derra, produkteve, nënprodukteve të tyre, materialit biologjik, embrioneve, mishit dhe nënprodukteve të tyre nga Bosnjë-Hercegovina..... 14673
Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr. 458, datë 2.8.2023	Për importin e kafshëve të llojit derra, produkteve, nënprodukteve të tyre, materialit biologjik, embrioneve, mishit dhe nënprodukteve të tyre nga Serbia..... 14675
Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr. 459, datë 2.8.2023	Për importin e kafshëve të llojit derra, produkteve, nënprodukteve të tyre, materialit biologjik, embrioneve, mishit dhe nënprodukteve të tyre nga Republika e Çekisë..... 14677

Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr. 460, datë 2.8.2023	Për importin e kafshëve të llojit derra, produkteve, nënprodukteve të tyre, materialit biologjik, embrioneve, mishit dhe nënprodukteve të tyre nga Lituania.....	14680
Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr. 461, datë 2.8.2023	Për importin e kafshëve të llojit derra, produkteve, nënprodukteve të tyre, materialit biologjik, embrioneve, mishit dhe nënprodukteve të tyre nga Hungaria.....	14682
Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr. 462, datë 2.8.2023	Për importin e kafshëve të llojit derra, produkteve, nënprodukteve të tyre, materialit biologjik, embrioneve, mishit dhe nënprodukteve të tyre nga Sllovakia.....	14684
Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr. 463, datë 2.8.2023	Për importin e kafshëve të llojit derra, produkteve, nënprodukteve të tyre, materialit biologjik, embrioneve, mishit dhe nënprodukteve të tyre nga Gjermania.....	14687
Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr. 464, datë 2.8.2023	Për importin e kafshëve të llojit derra, produkteve, nënprodukteve të tyre, materialit biologjik, embrioneve, mishit dhe nënprodukteve të tyre nga Bullgaria.....	14690
Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr. 465, datë 2.8.2023	Për importin e kafshëve të llojit derra, produkteve, nënprodukteve të tyre, materialit biologjik, embrioneve, mishit dhe nënprodukteve të tyre nga Ukraina.....	14692
Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr. 466, datë 2.8.2023	Për importin e kafshëve të llojit derra, produkteve, nënprodukteve të tyre, materialit biologjik, embrioneve, mishit dhe nënprodukteve të tyre nga Letonia.....	14694
Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr. 467, datë 2.8.2023	Për importin e kafshëve të llojit derra, produkteve, nënprodukteve të tyre, materialit biologjik, embrioneve, mishit dhe nënprodukteve të tyre nga Italia.....	14697
Kërkesë e Agjencisë Shtetërore për Shpronësimin nr. 311/12, datë 7.8.2023	Për shpronësimin për interes publik, për pasuritë e paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Rehabilitimi urban i Njësisë Administrative Gjinar në ZK 1742”, Bashkia Elbasan.....	14699



UDHËZIM

Nr. 19, datë 2.8.2023

**MBI VENDOSJEN E RREGULLAVE
SPECIFIKE PËR KONTROLLIN
ZYRTAR TË TRIKINELËS NË MISH¹**

Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë, të neneve 23 dhe 38 të ligjit nr. 9863, datë 28.1.2008, “Për ushqimin”, të ndryshuar,

UDHËZOJ:

1. Përcaktimin e rregullave për monitorimin e rregullt të derrave shtëpiakë, derrave të egër, njëthundrakëve, si një mjet i rëndësishëm për të vlerësuar ndryshimet në përhapjen e sëmundjes së trikinelës.

**KAPITULLI I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME**

Neni 1

Përkufizime

Për qëllim të këtij udhëzimi të zbatohen përkufizimet e mëposhtme:

1. “Trikinela” është çdo nematod që u përket specieve të gjinisë trikinela.

2. “Kushte strehimi të kontrolluara” është një lloj blegtorie ku derrat mbahen gjatë gjithë kohës në kushte të kontrolluara nga operatori i biznesit ushqimor, në lidhje me ushqimin dhe strehimin.

3. “Kompartiment (zonë blegtorale)” është një grup fermash në të cilat zbatohen kushtet e kontrolluara të strehimit. Të gjitha fermat që aplikojnë kushte strehimi të kontrolluara, mund të konsiderohen si kompartimente (zona blegtorale).

4. “Autoritet kompetente”, siç përcaktohet në germën “nj” dhe “o” në pjesën e përgjithshme të udhëzimit nr. 17, datë 24.9.2021, “Për kërkesat specifike të higjienës për mishin dhe produktet e mishit, duke përfshirë produktet e mishit, mishin e grirë dhe mishin e ndarë në mënyrë mekanike”.

KAPITULLI II

**DETYRIMET E AUTORITETEVE
KOMPETENTE DHE TË OPERATORËVE
TË BIZNESIT USHQIMOR**

Neni 2

Marrja e mostrave të karkasave

1. Të merren mostra nga karkasat e derrave shtëpiakë në thertore, si pjesë e ekzaminimit postmortem, si më poshtë:

a) të ekzaminohen për trikinelën të gjitha karkasat e dosave dhe të derrave të mbarështimit ose të paktën 10% e karkasave të kafshëve të dërguara për therje çdo vit nga secila fermë, e cila njihet zyrtarisht se zbaton kushte strehimi të kontrolluara;

b) të ekzaminohen sistematikisht për trikinelën të gjitha karkasat nga fermat të cilat nuk njihen zyrtarisht se zbatojnë kushte strehimi të kontrolluara.

Një mostër të merret nga çdo karkasë dhe mostra të ekzaminohet për trikinelë, në një laborator të përcaktuar për analizimin e mostrave të marra, në kuadër të kontroleve zyrtare, duke përdorur një nga metodat e mëposhtme të zbulimit:

a) metodën referencë të zbulimit, të përcaktuar në kapitullin 1, të shtojcës 1; ose

b) një metodë ekuivalente zbulimi, e përcaktuar në kapitullin 2, të shtojcës 2.

2. Nga karkasat e njëthundrakëve, derrave të egër dhe specieve të tjera të kafshëve të mbarështuara dhe të egra, të ndjeshme ndaj infestimit me trikinelë, të merren mostra në mënyrë sistematike në thertore ose në stabilimente për trajtimin e kafshëve të gjahut, si pjesë e ekzaminimit postmortem.

Nga secila karkasë do të merret një mostër dhe mostra do të ekzaminohet në përputhje me shtojcat 1 dhe 3 në një laborator të përcaktuar nga autoriteti kompetent.

3. Në pritje të rezultateve të ekzaminimit të trikinelës dhe me kusht që të garantohet gjurmueshmëria e plotë nga operatori i biznesit ushqimor, karkasat e derrave shtëpiakë dhe të njëthundrakëve mund të priten në një maksimum prej gjashtë pjesësh, në një thertore ose në një stabiliment prerjeje në të njëjtën ndërtesë.

¹ Ky udhëzim është përafuar pjesërisht me Rregulloren Zbatuese të Komisionit (BE) nr. 2015/1375, të datës 10 gusht 2015, “Për vendosjen e rregullave specifike për kontrollet zyrtare për trikinelën në mish”.



Neni 3 Përfashtime

1. Duke përfashtuar nenin 2(1), mishi i derrave shtëpiakë, që i është nënshtruar një trajtimi me ngrirje, në përfputhje me shtojcën 2, nën mbikëqyrjen e autoritetit kompetent përfashtohet nga ekzaminimi për trikinelë.

2. Duke përfashtuar nenin 2(1), karkasat dhe mishi i gicave të pashkëputur nga gjiri, të moshës më të vogël se pesë javë të përfashtohen nga ekzaminimi për trikinelë.

3. Duke përfashtuar nenin 2(1), karkasat dhe mishi i derrit shtëpiak mund të përfashtohen nga ekzaminimi për trikinelë, kur kafshët vijnë nga një fermë ose një kompartment (zonë blegtorale) që njihet zyrtarisht se zbaton kushte strehimi të kontrolluara, në përfputhje me shtojcën 4, në qoftë se:

a) asnjë infestim autokton nga trikinela në derrat shtëpiakë të mbajtur në ferma, që njihen zyrtarisht se zbatojnë kushte strehimi të kontrolluara nuk është zbuluar në tri vitet e fundit, kohë gjatë së cilës janë kryer testime të vazhdueshme në përfputhje me nenin 2; ose

b) të dhënat mbi historikun e testimeve të kryera në mënyrë të vazhdueshme në popullatën e derrave të therur, të sigurojnë të paktën 95% besueshmëri që prevalenca e trikinelës nuk e kalon një për një milion në këtë popullatë.

4. Me përfashtim të nenit 2(3) dhe pas miratimit nga autoriteti kompetent:

a) karkasat mund të priten në një stabiliment prerje që është pjesë e thertores (ngjitur) ose që është e ndarë nga thertorja, me kusht që:

i. procedura të aprovohet nga autoriteti kompetent;

ii. karkasa ose pjesët e saj nuk kanë si destinacion më shumë se një stabiliment prerjeje;

iii. në rast të një rezultati pozitiv, të gjitha pjesët shpallen të papërshtatshme për konsum njerëzor;

b) karkasat që rrjedhin nga derrat shtëpiakë mund të priten në më shumë pjesë në një stabiliment prerjeje në të njëjtën ndërtesë ose ngjitur me thertoren, me kusht që:

i. procedura të aprovohet nga autoriteti kompetent;

ii. prerja ose heqja e kockave kryhet në përfputhje me kërkesat e përcaktuara në kreun 2, “Mbi kërkesat specifike të higjienës për operatorin e biznesit

ushqimor, të udhëzimit nr. 17, datë 24.9.2021, “Për kërkesat specifike të higjienës për mishin dhe produktet e mishit, duke përfshirë produktet e mishit, mishin e grirë dhe mishin e ndarë në mënyrë mekanike”, përpara se të arrihet temperatura e përmendur sipas këtij udhëzimi;

iii. në rast rezultati pozitiv të gjitha pjesët shpallen të papërshtatshme për konsum njerëzor.

Neni 4 Ekzaminimi i trikinelës dhe aplikimi i vulës shëndetësore

1. Karkasat e përmendura në nenin 2 ose pjesë të tyre, me përfashtim të atyre të përmendura në nenin 3(4), nuk duhet të largohen nga ndërtesat përpara se rezultatet e ekzaminimit për trikinelën të rezultojnë negative.

Në mënyrë të ngjashme, pjesët e tjera të një kafshe të destinuara për konsum nga njerëzit ose kafshët, të cilat përmbajnë inde të muskujve të strijuar nuk duhet të largohen nga ndërtesat përpara se rezultatet e ekzaminimit për trikinelën të rezultojnë negative.

2. Mbetjet e kafshëve dhe nënproduktet shtazore që nuk janë të destinuara për konsum njerëzor dhe që nuk përmbajnë muskuj të strijuar mund të largohen nga ndërtesat përpara se të jenë të disponueshme rezultatet e ekzaminimit të trikinelës.

Megjithatë, veterineri zyrtar i thertores mund të kërkojë që të kryhet një ekzaminim për trikinelën ose një trajtim paraprak i nënprodukteve shtazore jo për konsum njerëzor përpara se t'i lejojë ato të largohen nga ndërtesat.

3. Kur ekziston dhe zbatohet një procedurë në thertore, që siguron se asnjë pjesë e karkasave të ekzaminuara nuk largohet nga ndërtesat derisa rezultati i ekzaminimit për trikinelën të rezultojë negativ dhe procedura të aprovohet zyrtarisht nga veterineri zyrtar ose kur zbatohet përfashtimi i parashikuar në nenin 3(4), mund të aplikohet vula shëndetësore përpara se rezultatet e ekzaminimit të trikinelës të jenë të disponueshme.

Neni 5 Trajnimi

Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë (ISUV) të sigurojë që i gjithë personeli i përfshirë në ekzaminimin e mostrave për zbulimin e trikinelës të



trajnohen në mënyrë të përshtatshme dhe të marrin pjesë, në:

- a) një program kontrolli të cilësisë së testeve të përdorura për zbulimin e trikinelës; dhe
- b) një vlerësim të rregullt të testimit, procedurave të regjistrimit dhe të analizimit të përdorura në laborator.

Neni 6

Metodat e zbulimit

1. Metodat e zbulimit të përcaktuara në kapitujt 1 dhe 2, të shtojcës 1, të përdoren për ekzaminimin e mostrave të përmendura në nenin 2, kur ka arsye për të dyshuar për infestimin me trikinelë.

2. Të gjitha mostrat pozitive do t'i dërgohen Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë (ISUV) ose laboratorit të referencës së BE-së për përcaktimin e llojit të trikinelës së përfshirë.

Neni 7

Planet e kontigjencës

Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit në bashkëpunim me Autoritetin Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve (AKVMB), Autoritetin Kombëtar të Ushqimit (AKU) dhe Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë (ISUV) do të hartojë një plan kontigjence, që përshkruan të gjitha veprimet që duhet të ndërmerren, kur mostrat e përmendura në nenin 2 rezultojnë pozitive për trikinelë. Ky plan do të përfshijë detaje që mbulojnë:

- a) gjurmueshmërinë e karkasave të infestuara, si dhe të pjesëve të tyre që përmbajnë inde muskulore;
- b) masat për trajtimin e karkasave të infestuara, si dhe pjesëve të tyre;
- c) hetimi i burimit të infestimit, si dhe të çdo përhapjeje midis kafshëve të egra;
- ç) çdo masë që duhet marrë në nivel të shitjes me pakicë ose te konsumatorët;
- d) masat që duhen marrë kur karkasat e infestuara nuk mund të identifikohen në thertore;
- dh) përcaktimi i llojit të trikinelës të përfshirë në infestim.

Neni 8

Njohja zyrtare e fermave që aplikojnë kushte strehimi të kontrolluara

Për qëllimet e këtij udhëzimi, Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve (AKVMB) mund të njohë zyrtarisht një fermë ose një kompartiment (zonë blegtorale) që aplikon kushte strehimi të kontrolluara, kur është në përputhje me kërkesat e përcaktuara në shtojcën 4.

Neni 9

Detyrimi i operatorëve të biznesit ushqimor për të informuar

Operatorët e biznesit ushqimor të fermave që njihen zyrtarisht që aplikojnë kushte strehimi të kontrolluara të informojnë Autoritetin Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, për çdo kërkesë të përcaktuar në aneksin 4, e cila nuk përmbushet më, ose për çdo ndryshim tjetër që mund të ndikojë në statusin e trikinelës së këtyre fermave.

Neni 10

Auditimet ose kontrollet e fermave që njihen zyrtarisht se zbatojnë kushte strehimi të kontrolluara

Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve të sigurojë që auditimet ose kontrollet të kryhen periodikisht për fermat që njihen zyrtarisht se zbatojnë kushte strehimi të kontrolluara.

Frekuenca e auditimeve ose e kontrolleve të bazohet në risk, duke marrë parasysh historinë e sëmundjes dhe prevalencën, gjetjet e mëparshme, zonën geografike, kafshët e egra lokale të prekshme (ndjeshme), praktikat e blegtorisë, mbikëqyrjen veterinarë dhe pajtueshmërinë e fermerëve me kërkesat.

Veterineri zyrtar i thertores të verifikojë që derrat shtëpiakë që vijnë nga këto ferma janë ekzaminuar në përputhje me nenin 2(1).

Neni 11

Programet e monitorimit

Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve të zbatojë një program monitorimi që mbulon popullatën e derrave shtëpiakë që vijnë nga



një fermë ose nga një kompaniment i njohur zyrtarisht se zbaton kushte strehimi të kontrolluara, me qëllim që të verifikojë që trikinela mungon në këtë popullatë.

Frekuenca e testimit, numri i kafshëve që do të testohen dhe plani i marrjes së mostrave të përcaktohen në programin e monitorimit. Për këtë qëllim, mostrat e mishit të mblidhen dhe të ekzaminohen për praninë e parazitëve të trikinelës, në përputhje me kapitujt 1 ose 2, të shtojcës 1.

Programi i monitorimit mund të përfshijë metodat serologjike si një mjet shtesë derisa një test i përshtatshëm të validohet nga ISUV-ja.

Neni 12

Tërheqja e njohjes zyrtare të fermave që zbatojnë kushte strehimi të kontrolluara

1. Kur rezultatet e auditimeve ose të kontrolleve të kryera në përputhje me nenin 10 tregojnë se kërkesat e shtojcës 4 nuk përmbushen më, AKVMB-ja tërheq njohjen zyrtare të fermës pa vonesë.

2. Kur derrat shtëpiakë të një ferme, të njohur zyrtarisht se zbaton kushte strehimi të kontrolluara, rezultojnë pozitive për trikinelën, AKVMB-ja pa vonesë duhet të:

a) tërheqë njohjen zyrtare të fermës;

b) ekzaminojë të gjithë derrat shtëpiakë të kësaj ferme në kohën e therjes;

c) gjurmtojë dhe të testojë të gjitha kafshët e mbarështimit që kanë mbërritur në fermë dhe për aq kohë sa është e mundur, të gjitha ato që janë larguar nga ferma të paktën gjashtë muaj përpara se të rezultonte pozitive; për këtë qëllim, mostrat e mishit do të mblidhen dhe do të ekzaminohen për praninë e parazitëve të trikinelës, duke përdorur metodat e zbulimit të përcaktuara në kapitujt 1 dhe 2, të shtojcës 1;

ç) hetojë, kur është e nevojshme dhe për aq kohë sa është e mundur, përhapjen e infestimit të parazitëve, për shkak të shpërndarjes së mishit nga derrat shtëpiakë të therur në periudhën që paraprind gjetjet (rezultatet) pozitive;

d) fillojë, kur është e nevojshme, një hetim epidemiologjik për të sqaruar shkakun e infestimit;

dh) marrë masat e duhura kur ndonjë karkasë e infestuar nuk mund të identifikohet në thetore, duke përfshirë:

i. rritjen e madhësisë për çdo mostër mishi, të mbledhur për testimin e karkasave të dyshuara; ose

ii. daklarimin e karkasave të papërshtatshme për konsum njerëzor;

iii. marrjen e masave të duhura për asgjësimin e karkasave të dyshuara ose të pjesëve të tyre dhe të atyre që rezultojnë pozitive.

3. Pas tërheqjes së njohjes zyrtare, fermat mund të njihen sërish zyrtarisht, pasi të jenë zgjidhur problemet e identifikuar dhe kërkesat e përcaktuara në aneksin 4, të jenë përmbushur në mënyrë të kënaqshme për autoritetin kompetent.

4. Nëse inspektimi ka identifikuar mungesë të përputhshmërisë me nenin 9 ose testim pozitiv në një fermë të një kompartimenti, ferma në fjalë duhet të hiqet nga kompartimenti derisa të rivendoset përputhshmëria.

KAPITULLI III IMPORTET

Neni 13

Kërkesat shëndetësore për importin

1. Mishi që përmban muskuj të strijuar nga speciet e kafshëve që mund të jenë mbartës të trikinelës, importohen në Shqipëri vetëm në qoftë se përpara eksportit është kryer ekzaminimi për trikinelën, në përputhje me kushtet ekuivalente të përcaktuara në nenet 2 ose 3 të këtij udhëzimi, për vendin ku kafshët janë therur.

2. Vetëm vendet e treta të renditura në shtojcën 5 mund të zbatojnë përjashtimet e parashikuara në nenin 3, pikat 2 dhe 3, pasi të kenë informuar Drejtorinë e Përgjithshme të Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit për zbatimin e këtyre përjashtimeve.

KAPITULLI IV DISPOZITAT SHFUQIZUESE DHE PËRFUNDIMTARE

Neni 14

Shfuqizimi

Udhëzimi nr. 9, datë 10.10.2016, “Për kontrollin zyrtar të trikinelës”, shfuqizohet.



Neni 15 Hyrja në fuqi

Ngarkohen për zbatimin e këtij udhëzimi, Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit, Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë.

Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I BUJQËSISË DHE
ZHVILLIMIT RURAL
Frida Krifca

SHTOJCA I METODAT E ZBULIMIT

KAPITULLI I METODA REFERENCË E ZBULIMIT

Metoda referencë e zbulimit për ekzaminimin e mostrave për trikinelë është ISO 18743:2015.

KAPITULLI II METODAT EKUIVALENTE

A. Metoda e tretjes së mostrës së bashkuar mekanikisht/teknika e sedimentimit

1. Pajisje dhe reagentë:

- Thikë ose gërshërë për prerjen e kampioneve;
- Tabaka të ndara me 50 katrorë, secili prej të cilëve mund të mbajë mostra prej afërsisht 2 g mish ose mjete të tjera, që japin garanci ekuivalente për gjurmueshmërinë e mostrave;
- Grirëse mishi ose blender elektrik;
- Një model termo-blender Stomacher 3 500;
- Qese plastike të përshtatshme për blenderin laboratorik *Stomacher*;
- Hinka konike ndarëse, me kapacitet 2 litra, mundësisht të pajisura me prizë sigurie tefloni;
- Mbajtëse, unaza dhe kapëse;
- Sitë, madhësia e rrjetës 180 mikronë, diametri i jashtëm 11 cm, me rrjetë inoksi ose rrjetë bronzi;
- Hinka, me diametër të brendshëm jo më pak se 12 cm, për të mbështetur sitat;
- Cilindra matëse qelqi 100 ml;

gj) Një termometër i saktë në 0,5°C brenda intervalit 20°C deri në 70°C;

h) Stirrer magnetic;

i) Rele që ndizet dhe fiket në intervale prej një minute;

j) Një trikinoskop me një tavolinë horizontale ose një stereo-mikroskop, me një burim drite të transmetuar nën fazë me intensitet të rregullueshëm;

k) Pjata Petri me diametër afërsisht 90 mm, të ndara me katrorë afërsisht 1 cm, ose pajisje ekuivalente për numërimin e larvave, si në pikën 6.14 të ISO 18743:2015;

l) acid klorhidrik 17,5 %;

ll) pepsina me fuqinë e mëposhtme:

- nëse është pluhur ose e grimtuar: 1:10 000 NF (Formulari Kombëtar i SHBA-së), që korrespondon me 1:12 500 BP (Farmakopeja Britanike) dhe me 2 000 FIP (Federata Internazionale e Farmacisë); ose
- nëse është e lëngshme: pepsinë e lëngshme e stabilizuar me minimumi 660 njësi të Farmakopesë Evropiane/ml.

Aktivitete të tjera të pepsinës mund të përdoren, me kusht që aktiviteti përfundimtar në lëngun tretës të jetë i barabartë me aktivitetin e 10 g prej 1:10 000 NF, siç përcaktohet në pikën 5.3 të ISO 18743:2015.

m) Një numër koshash prej 10 litrash që do të përdoren për dekontaminimin e pajisjeve, p.sh. me formol, dhe për lëngun tretës të mbetur nga mostrat që kanë rezultuar pozitive.

n) Peshore e kalibruar, për peshimin e mostrave dhe/ose pepsinës (saktësia $\pm 0,1$ g).

2. Mbledhja e kampioneve dhe sasia për t'u tretur

Siç përcaktohet në pikën 4.2 të ISO 18743:2015 (shih, gjithashtu, shtojcat A dhe B të tij për detaje të mëtejshme).

3. Procedura

I. Grirja

Grirja e mostrave të mishit paraprakisht në një grirëse mishi do të përmirësojë cilësinë e tretjes. Nëse përdoret një blender elektrik, blenderi duhet të vihet në punë tre deri në katër herë për afërsisht për një sekondë për çdo herë.

II. Procedura e tretjes

Kjo procedurë mund të përfshijë bashkimin e plotë (100 g mostra në të njëjtën kohë) ose bashkimet më pak se 100 g.

a) Bashkimet e plota (100 mostra në të njëjtën kohë):



i. blenderi laboratorik *Stomacher 3 500* është i pajisur me një qese plastike të dyfishtë dhe kontrolli i temperaturës është vendosur në 40 deri në 41°C;

ii. një litër e gjysmë ujë i parangrohur në 40 deri në 41°C derdhet në qesen e brendshme plastike;

iii. 25 ml acid klorhidrik 17,5 % i shtohet ujit në *Stomacher*;

iv. shtohen 100 mostra me peshë afërsisht 1 g secila (në 25 deri në 30°C) të marra nga çdo mostër individuale në përputhje me pikën 2;

v. në fund shtohen 6 g pepsinë ose 18 ml pepsinë të lëngshme. Kjo radhë duhet të ndiqet rreptësisht për të shmangur dekompozimin e pepsinës;

vi. *Stomacher*-i më pas lihet të përziejë përmbajtjen e qeses për 25 minuta;

vii. qesja plastike hiqet nga *Stomacher* dhe lëngu i tretjes filtrohet përmes sitës në një gotë prej 3 litrash;

viii. qesja plastike lahet me afërsisht 100 ml ujë, e cila më pas përdoret për të shpëlarë sitën dhe në fund i shtohet filtratit në gotë;

ix. deri në 15 mostra individuale mund të shtohen në një grup prej 100 mostrash dhe të ekzaminohen së bashku me këto mostra.

b) Bashkime më të vogla (më pak se 100 mostra):

i. blenderi laboratorik *Stomacher 3 500* është i pajisur me një qese plastike të dyfishtë dhe kontrolli i temperaturës është vendosur në 40 deri në 41°C;

ii. një lëng tretës përgatitet duke përzier rreth një litër e gjysmë ujë dhe 25 ml acid klorhidrik 17,5%. Shtohen 6 g pepsinë dhe përziejhet e gjitha në një temperaturë prej 40 deri në 41°C. Kjo radhë duhet të ndiqet rreptësisht për të shmangur dekompozimin e pepsinës;

iii. nga lëngu i tretjes, matet një vëllim që korrespondon me 15 ml për gram mostër (p.sh. për 30 mostra vëllimi i kërkuar është $30 \times 15 \text{ ml} = 450 \text{ ml}$) dhe transferohet në pjesën e brendshme të dy qeseve plastike, së bashku me mostrat e mishit, me peshë afërsisht 1 g (në 25 deri në 30°C) të marra nga çdo mostër individuale në përputhje me pikën 2.

iv. uji në një temperaturë prej afërsisht 41°C derdhet në qesen e jashtme për të krijuar një vëllim të përgjithshëm prej një litri e gjysmë në dy qeset. *Stomacher*-i më pas lihet të përziejë përmbajtjen e qeses për 25 minuta;

v. qesja plastike hiqet nga *Stomacher* dhe lëngu i tretjes filtrohet përmes sitës në një gotë prej 3 litrash;

vi. qesja plastike lahet me afërsisht 100 ml ujë (në 25 deri në 30°C), i cili më pas përdoret për të shpëlarë sitën dhe në fund i shtohet filtratit në gotë.

III. Zbulimi i larvave me sedimentim

- Akulli (300 deri në 400 g copa akulli, akull i shtypur ose akull i grimcuar) shtohet në lëngun e tretjes për të rritur vëllimin e tij në rreth 2 litra. Më pas lëngu i tretjes përziejhet derisa akulli të shkrihet. Në rastin e bashkimeve më të vogla (shih seksionin II (b)), sasia e akullit duhet të reduktohet në mënyrë korresponduese.

- Lëngu tretës i ftohur transferohet në një hinkë ndarëse 2 litra, të pajisur me një *stirrer magnetic* në një fiksuese shtesë.

- Sedimentimi lejohet të vazhdojë për 30 minuta, kohë gjatë së cilës hinka e sedimentimit vibrohet me ndërprerje, p.sh. 1 minutë vibrim pasohet nga 1 minutë pushim.

- Pas 30 minutash, 60 ml mostër e sedimentit futet shpejt në një cilindër matës 100 ml (hinka shpëlahet me detergjent pas përdorimit).

- Mostra 60 ml lihet të qëndrojë për të paktën 10 minuta, pas kësaj kohe tërhiqet me thithje supernatanti, për të lënë një vëllim prej 15 ml, që të ekzaminohet për praninë e larvave.

- Për thithje, mund të përdoret një shiringë e disponueshme, e pajisur me një tub plastik. Gjatësia e tubit duhet të jetë e tillë që 15 ml të mbetet në cilindrin matës, kur dorezat e shiringës mbështeten tek buzët e cilindrit.

- Pjesa e mbetur prej 15 ml hidhet në një pjatë Petri ose pajisje ekuivalente për numërimin e larvave dhe ekzaminohet duke përdorur një trikinoskop ose stereo-mikroskop.

- Cilindri matës lahet me 5 deri në 10 ml ujë rubineti dhe shpëlarja i shtohet mostrës.

- Tretësirat duhet të ekzaminohen sapo të jenë gati. Në asnjë rrethanë nuk mund të shtyhet ekzaminimi për ditën e nesërme.

Kur tretësirat janë të paqarta, ato duhet të qartësohen si më poshtë:

- mostra përfundimtare prej 60 ml hidhet në një cilindër matës dhe lihet të qëndrojë për 10 minuta; më pas hiqet me thithje 45 ml lëng supernatanti dhe 15 ml e mbetura shtohen në 45 ml me ujë rubineti;

- pas një periudhe qëndrimi të mëtejshme prej 10 minutash, 30 ml lëng supernatanti hiqet me thithje dhe 15 ml e mbetura hidhen në një pjatë Petri ose në pajisje ekuivalente për numërimin e larvave dhe ekzaminohen duke përdorur një trikinoskop ose stereo-mikroskop.

- cilindri matës lahet me 10 ml ujë rubineti dhe ky ujë larës i shtohet mostrës në pjatën Petri ose pajisjes



ekuivalente për numërimin e larvave dhe ekzaminohet me anë të trikinoskopit ose stereo-mikroskopit.

IV. Rezultate pozitive ose të dyshimta

Kur ekzaminimi i një mostre të përbashkët prodhon një rezultat pozitiv ose të pasigurt, nga çdo derr merret një mostër tjetër prej 20 g, siç përcaktohet në pikën 4.2 të ISO 18743:2015 (shih, gjithashtu, shtojcat A dhe B të tij për detaje të mëtejshme). Mostrat prej 20g të marra nga pesë derra grumbullohen dhe ekzaminohen duke përdorur metodën e përshkruar në këtë kapitull. Në këtë mënyrë do të ekzaminohen mostrat nga 20 grupe me pesë derra. Kur trikinela zbulohet në një mostër të bashkuar nga pesë derra, mostrat e tjera prej 20 g mbledhen nga derrat individuale të grupit dhe secili ekzaminohet veçmas duke përdorur metodën e përshkruar në këtë kapitull. Mostrat e parazitëve duhet të mbahen në alkool etilik 70–90% (përqendrimi përfundimtar) për t'u ruajtur dhe identifikuar në nivel llojesh në ISUV. Për procedurën e dekontaminimit, shihni pikën 12 të ISO 18743:2015.

B. Metoda e tretjes së mostrave të bashkuara mekanikisht/teknika e “izolimit në filtër”

1. Pajisje dhe reagentë

Siç është përcaktuar në seksionin A(1). Pajisje shtesë:

a) Hinkë 1 litërshe Gelman, e kompletuar me mbajtëse filtri (diametri 45 mm);

b) Disqe filtri, të përbërë nga një rrjetë rrethore prej çeliku inox me një hapje prej 35 mikronësh (diametri i diskut: 45 mm), dy unaza gome 1 mm të trasha (diametri i jashtëm: 45 mm; diametri i brendshëm: 38 mm), rrjeta rrethore vendoset midis dy unazave të gomës dhe lidhet me to, duke përdorur një ngjitës me dy përbërës të përshtatshëm për të dy materialet;

c) Një balonë erlenmajer me kapacitet 3 litra, e pajisur me tub anësor për thithje;

ç) Një pompë filtri;

d) Qese plastike me kapacitet të paktën 80 ml;

dh) Pajisje për vulosjen e qeseve plastike;

e) Renilaza, me fuqi 1:150 000 njësi Sokslet për gram.

2. Mbledhja e mostrave

Siç përcaktohet në pikën 4.2 të ISO 18743:2015 (shih, gjithashtu, shtojcat A dhe B të tij për detaje të mëtejshme).

3. Procedura

I. Grirja

Grirja e mostrave të mishit paraprakisht në një grirëse mishi do të përmirësojë cilësinë e tretjes. Nëse përdoret një blender elektrik, blenderi duhet të vihet në punë tre deri në katër herë për afërsisht për një sekondë për çdo herë.

II. Procedura e tretjes

Kjo procedurë mund të përfshijë bashkimin e plotë (100 g mostra në të njëjtën kohë) ose bashkimet më pak se 100 g.

a) bashkimet e plota (100 mostra në të njëjtën kohë) shih seksionin (3)(II)(a);

b) bashkimet më të vogla (më pak se 100 mostra) shih seksionin A(3)(II)(b).

III. Zbulimi i larvave me filtrim

a) Akulli (300 deri në 400 g copa akulli, akull i shtypur ose akull i grimcuar) shtohet në lëngun e tretjes për të rritur vëllimin e tij në rreth 2 litra. Në rastin e bashkimeve më të vogla, sasia e akullit duhet të reduktohet në mënyrë korresponduese.

b) Lëngu tretës përzihet deri sa të shkrihet akulli. Lëngu tretës i ftohur lihet të paktën për 3 minuta në mënyrë që larvat të rrotullohen në vetvete.

c) Hinka Gelman, e pajisur me mbajtëse filtri dhe disk filtri, montohet në balonën Erlenmajer të lidhur me pompë filtri.

ç) Lëngu i tretjes derdhet në gypin Gelman dhe filtrohet. Në fund të filtrimit, lëngu tretës mund të ndihmohet të kalojë përmes filtrit duke aplikuar thithje me pompën e filtrit. Thithja duhet të ndërpritet përpara se filtri të thahet, d.m.th. kur kanë mbetur në 2 deri në 5 ml lëng hinkë.

d) Kur i gjithë lëngu tretës është filtruar, disku i filtrit hiqet dhe vendoset në një qese plastike me kapacitet 80 ml së bashku me 15–20 ml tretësirë renilazë. Tretësira e renilazës përgatitet duke shtuar 2 gr renilazë në 100 ml ujë rubineti.

dh) Qesja plastike vuloset dy herë dhe vendoset ndërmjet qeses së brendshme dhe të jashtme në *Stomacher*.

e) *Stomacher* lejohet të tundet për 3 minuta, p.sh. kur po punon me një bashkim të plotë ose jo.

ë) Pas 3 minutash, qesja plastike së bashku me diskun e filtrit dhe tretësirën e renilazës hiqet nga *Stomacher* dhe hapet me gërshtë. Lëngu që përmban hidhet në pjatën Petri ose në një pajisje ekuivalente për numërimin e larvave. Qesja lahet me 5–10 ml ujë, i cili pastaj shtohet në pjatën Petri ose në pajisjen ekuivalente për numërimin e larvave dhe



ekzaminohet në trikinoskop ose me stereo-mikroskop.

f) Lëngjet tretëse duhet të ekzaminohen sapo të jenë gati. Në asnjë rrethanë ekzaminimi nuk duhet të vonohet deri ditën tjetër.

Shënim. Disqet e filtrave të mos përdoren asnjëherë pa u pastruar plotësisht. Disqet e papastra nuk duhet të lejohen asnjëherë të thahen. Disqet e filtrave mund të pastrohen duke i lënë gjithë natën në tretësirë renilaze. Përpara përdorimit ato duhet të lahen me tretësirë renilaze të freskët, duke përdorur *Stomaicher-in*.

IV. Rezultatet pozitive ose të dyshimta

Siç parashikohet në pikën IV të seksionit A(3).

C. Metoda e tretjes automatike për mostrat e bashkuara deri në 35 gr

1. *Pajisje dhe reagentë*

a) Thikë ose gërshërë për prerjen e kampionëve.

b) Tabaka e ndarë në 50 kuadrate, ku secila prej tyre mund të mbajnë mostrat afërsisht prej 2gr mish, apo mjete të tjera, që japin garanci ekuivalente në lidhje me gjurmueshmërinë e mostrave.

c) Një blender Trichomatic 35®, i pajisur me filtër.

ç) Acid klorhidrik $8,5 \pm 0,5$ % peshë.

d) Filtra transparente me membranë polikarbonate me diametër 50 mm dhe me madhësi poresh 14 mikronë.

dh) Pepsina me fuqinë e mëposhtme:

- nëse është pluhur ose e grimtuar: 1:10 000 NF (Formulari Kombëtar i SHBA) që korrespondon me 1:12 500 BP (Farmakopeja Britanike) dhe me 2 000 FIP (Federata Internazionale e Farmacisë), ose

- nëse është e lëngshme: pepsinë e lëngshme e stabilizuar me minimumi 660 njësi të Farmakopesë Evropiane/ml.

Aktivitetet të tjera të pepsinës mund të përdoren, me kusht që aktiviteti përfundimtar në lëngun tretës të jetë i barabartë me aktivitetin e 10 g prej 1:10 000 NF, siç përcaktohet në pikën 5.3 të ISO 18743:2015.

e) Shkallën e kalibruar, për peshimin e mostrave dhe/ose pepsinës (saktësia $\pm 0,1$ g).

ë) Pincetë me majë të sheshtë.

f) Disa pjata mikroskopi me gjatësi të paktën 5 cm si dhe disa pjata petri me diametër të paktën 6 cm, të shënuara në anën e poshtme me hapësira $10 \times 10 \text{ mm}^2$, duke përdorur një instrument me majë.

g) Stereo-mikroskop me dritë të transmetuar (me zmadhim 15–60 herë) ose trikinoskop me tavolinë horizontale.

gj) Enë për hedhjen e mbetjeve të lëngshme.

h) Enë 10 litërshe që përdoren për dekontaminimin e aparatit, p.sh. me formol, si dhe për lëngjet tretëse që mbesin kur mostrat dalin pozitiv.

i) Termometër me saktësi 0.5°C , brenda intervalit 20 deri në 70°C .

2. *Mbledhja e mostrave*

Siç përcaktohet në pikën 4.2 të ISO 18743:2015 (shih, gjithashtu, shtojcat A dhe B të tij për detaje të mëtejshme).

3. *Procedura*

I. Procedura e tretjes

a) Vendoset blenderi me filtrin e shtuar, lidhet tubi i mbetjeve dhe tubi vendoset në mënyrë të tillë që të rrjedhë në enën e mbeturinave.

b) Kur blenderi është i ndezur, do të nisi nxehja.

c) Përpara se kjo të bëhet, valvola në pjesën e poshtme e vendosur poshtë dhomës së reaksionit duhet të hapet dhe të mbyllet.

ç) Shtohen deri në 35 mostra që peshojnë afërsisht 1gr secila (në $25\text{--}30^\circ\text{C}$) të marra nga çdo mostër individuale në përputhje me pikën 2. Të sigurohet që pjesët më të mëdha të tendinave janë hequr pasi ato mund të bllokojnë filtrin.

d) Hidhet ujë deri në skajin e një dhome lëngjesh të lidhur me blenderin (afërsisht 400 ml).

dh) Shtohen rreth 30 ml acid klorhidrik (8.5%) në skajin e dhomës me të vogël, e lidhur me dhomën e lëngjeve.

e) Vendoset një membrane filtri nën filtrin e trashë në mbajtësen e filtrit në shtimin e filtrit.

ë) Në fund, shtohen 7 gr pepsin ose 21 ml pepsin e lëngshme. Kjo radhë duhet të ndiqet rreptësisht për të shmangur dekompozimin e pepsinës.

f) Mbyllet kapakët e dhomave të reaksionit dhe dhomave të lëngjeve.

g) Zgjidhet periudha e tretjes. Duhet të caktohet një periudhë e shkurtër tretjeje (5 minuta) për derrat në moshën normale të therjes dhe një kohë më e gjatë (8 minuta) për mostrat e tjera.

gj) Kur ndizet butoni i fillimit të punës së blenderit, procesi i shpërndarjes dhe i tretjes fillon automatikisht, i ndjekur nga filtrimi. Pas 10–13 minutash procesi përfundon dhe ndalon automatikisht.

h) Hapni kapakun e dhomës së reaksioneve pasi siguroheni që dhoma është bosh. Në qoftë se ka shkumë ose ka mbetur lëng tretës në dhomë procedura përsëritet në përputhje me seksionin V.



II. Rigjenerimi i larvave

a) Hiqet mbajtësja e filtrit dhe transferohet membrana filtruese në një mbajtëse të pjerrët ose pjatë petri.

b) Shqyrtohet membrana filtruese e përdorur në një stereo-mikroskop ose një trikinoskop.

III. Pajisjet e pastrimit

a) Kur rezultati del pozitiv, dhoma e reaksionit të blenderit mbushet me ujë të valuar deri në 2/3 e saj. Pastaj hidhet ujë i zakonshëm rubineti në dhomën e lidhur të lëngjeve derisa të mbulohet sensori më i poshtëm. Më pas pastrimi bëhet në mënyrë automatike. Dekontaminimi i mbajtësit të filtrit dhe çdo pajisje tjetër bëhet duke përdorur p.sh. formol.

b) Pasi të përfundojë puna për ditën, mbushni dhomën e lëngut të blenderit me ujë dhe vendoseni në një cikël standard.

IV. Përdorimi i membranës filtruese

Çdo filtër me membranë polikarbonate mund të përdoret jo më shumë se pesë herë. Filtër duhet të rrotullohet ndërmjet çdo përdorimi. Përveç kësaj, filtër duhet të kontrollohet pas çdo përdorimi për ndonjë dëmtim që do ta bënte atë të papërshtatshëm për përdorim të mëtejshëm.

V. Metoda që përdoret kur tretja nuk është e plotë dhe nuk mund të bëhet filtrimi.

Pasi blenderi vendoset në ciklin automatik sipas seksionit I, hapet kapaku i dhomës së reaksionit dhe kontrollohet nëse ka shkumë ose lëng tjetër të mbetur në dhomë. Në qoftë se ka të tilla, veprohet si më poshtë:

a) mbyllet valvola e poshtme poshtë dhomës së reaksionit;

b) largohet mbajtësja e filtrit dhe transferohet membrana filtruese në një pjatë mikroskopi ose pjatë petri.

c) vendoset një membranë e re filtruese te mbajtësi i filtrit dhe montohet mbajtësja e filtrit;

ç) mbushet dhoma e lëngjeve të blenderit me ujë derisa sensori i poshtëm të mbulohet;

d) kryhet cikli automatik i pastrimit;

dh) pasi cikli i pastrimit ka mbaruar, hapet kapaku i dhomës së reaksionit dhe kontrollohet për mbetje lëngjesh;

e) kur dhoma është bosh, hiqet mbajtësja e filtrit dhe vendoset membrana e filtrit te një pjatë mikroskopi ose pjatë petri me anë të pincetës;

ë) ekzaminohen dy membranat e filtrave në përputhje me seksionin II; në qoftë se filtrat nuk mund të ekzaminohen, përsëritet i gjithë procesi i

tretjes me kohë tretje më të gjatë në përputhje me seksionin I.

VI. Rezultatet pozitive ose të dyshimta

Siç parashikohet në pikën IV të seksionit A(3).

D. Metoda me përzierie magnetike për tretjen e mostrave të bashkuara/“izolimi në filtër” dhe zbulimi i larvave me testin e aglutinimit latex

Kjo metodë konsiderohet e barasvlershme vetëm për testimin e mishit të derrave shtëpiakë.

1. Pajisje dhe reagentë

a) Thikë ose gërshërë dhe pinceta për prerjen e mostrave.

b) Tabaka e ndarë në 50 kuadrate, ku secila prej tyre mund të mbajë mostrat afërsisht prej 2 gr mish apo mjete të tjera, duke dhënë garanci ekuivalente, në lidhje me gjurmueshmërinë e mostrave.

c) Blender me teh të mprehtë prerës. Kur mostrat janë më të mëdha se 3 gr, përdoret një grirëse mishi me hapje 2–4 mm ose gërshërë. Në rastin e mishit të ngrirë apo gjuhës (pas largimit të shtresës sipërfaqësore, e cila nuk mund të tretet) nevojitet përdorimi i grirësit të mishit dhe madhësia e mostrave rritet në mënyrë të konsiderueshme.

ç) Përzierës magnetik me pjatë ngrohje të kontrolluar në mënyrë termostatike dhe thupër për përzierje të veshur me Teflon afërsisht 5 cm i gjatë.

d) Bejkera qelqi, kapaciteti 3 litra.

dh) Sita, madhësia e rrjetës 180 mikron, diametri i jashtëm 11 cm, me rrjetë inoksi.

e) Aparat filtrimi prej çeliku për rrjeta filtri 20 µm me hinkë çeliku.

ë) Pompë vakumi.

f) Enë (depozita) metali ose plastike, me kapacitete 10–15 litra, për të mbledhur lëngun tretës.

g) Një rrotullues 3D.

gj) Fletë alumini.

h) Acid klorhidrik 25%.

i) Pepsina me fuqinë e mëposhtme:

- nëse është pluhur ose e grimtuar: 1:10 000 NF (Formulari Kombëtar i SHBA) që korrespondon me 1:12 500 BP (Farmakopeja Britanike) dhe me 2 000 FIP (Federata Internazionale e Farmacisë), ose
- nëse është e lëngshme: pepsinë e lëngshme e stabilizuar me minimumi 660 njësi të Farmakopesë Evropiane/ml.

Aktivitete të tjera të pepsinës mund të përdoren, me kusht që aktiviteti përfundimtar në lëngun tretës të jetë i barabartë me aktivitetin e 10 g prej 1:10 000 NF, siç përcaktohet në pikën 5.3 të ISO 18743:2015.

j) Ujë rubineti i nxehtë në 46–48°C.



k) Peshore e kalibruar, për peshimin e mostrave dhe/ose pepsinës (saktësia $\pm 0,1$ g).

l) Pipeta të madhësive të ndryshme (1, 10 dhe 25 ml), mikropipeta sipas instruksioneve të prodhuesit të aglutinimit të lateksit si dhe mbajtëse pipetash.

ll) Filtra me rrjetë najloni 20 mikronë me diametër që përputhet me sistemin e filtrimit.

m) Pinceta plastike ose çeliku nga 10–15 cm.

n) Shishe konike, 15 ml.

nj) Shtypës havani me majë konike tefloni ose çeliku për t'u futur në shishe konike.

o) Termometër me saktësi 0.5°C , brenda intervalit $20\text{--}70^{\circ}\text{C}$.

p) Letra aglutinuese lateksi të testit me kit Trichin-L Antigen të validuar me kodin nr. EURLP_D_001/2011.

q) Tretësirë asnjane (buffer) me konservantë (hollues kampioni) për testin me kit Trichin-L i validuar me kodin Nr EURLP_D_001/2011.

r) Tretësirë asnjane (buffer) të shtuar me konservantë (kontrolli negativ) të testit me kit Trichin-L antigen i validuar me kodin Nr EURLP_D_001/2011.

rr) Tretësirë asnjane (buffer) të shtuar me antigenet e *Trichinella spiralis* dhe konservantë (kontrolli pozitiv) i testit me kit Trichin-L antigen i validuar me kodin nr. EURLP_D_001/2011.

s) Tretësirë asnjane (buffer) të veshur me copëza polistireni të shtuar me antitropa me konservantë (rruaza lateksi) të testit me kit me antigen të Trichin-L validuar me kodin nr. EURLP_D_001/2011.

sh) Kunja njëpërdorimësh.

2. Mbledhja e mostrave

Siç përcaktohet në pikën 4.2 të ISO 18743:2015 (shih, gjithashtu, anekset A dhe B të tij për detaje të mëtejshme).

3. Procedura

I. Për bashkime të plota (100 g mostra në të njëjtën kohë)

a) $16 \pm 0,5$ ml acid kloridrik 25 % ($0,2$ % finale) hidhet në një bejker 3 litra që përmban 2.0 litra ± 200 ml ujë rubineti, të ngrohur paraprakisht në $46\text{--}48^{\circ}\text{C}$; thupra përzierëse vendoset në bejker dhe bejkeri vendoset në pjatën e parangrohur dhe fillon përzierja.

b) Shtohet 10 ± 1 gr pepsinë pluhur (ose 30 ± 3 ml pepsin e lëngshme).

c) $100\text{--}115$ g mostra të mbledhura në përputhje me pikën 2 copëtohen në blender bashkë me $150 \pm$

15 ml tretësirë asnjane (buffer) të ngrohur më parë.

ç) Mishi i copëtuar transferohet në një bejker 3 litra që përmban ujë, pepsin dhe acid kloridrik.

d) Thika e blenderit zhytet herë pas here në lëngun tretës në bejker dhe ena e blenderit shpëlahet me sasi të vogla të lëngut tretës për të larguar çdo sasi mishi që mund të jetë ngjitur.

dh) Bejkeri mbulohet me fletë alumini.

e) Përzierësi magnetik duhet të rregullohet në mënyrë të tillë që të mbajë një temperaturë konstante $4\text{--}46^{\circ}\text{C}$ gjatë gjithë veprimit. Gjatë përzierjes, lëngu tretës duhet të rrotullohet me shpejtësi të lartë të mjaftueshme për të krijuar një fugë të thellë por pa spërkatur.

ë) Lëngu tretës përziehet derisa grimcat e mishit zhduken (afërsisht 30 minuta). Më pas, përzierësi fiket dhe lëngu tretës hidhet nëpërmjet sitës në hinkën e sedimentimit. Tretja mund të kërkojë kohë të gjatë (jo më shumë se 60 minuta) në përpunimin e disa llojeve të mishit (gjuhë, mish gjahu etj.).

f) Procesi i tretjes konsiderohet i kënaqshëm në qoftë se jo më shumë se 5% e peshës së mostrës fillestare mbetet në sitë.

g) Filtri me rrjetë najloni 20 mikronë vendoset në mbajtësen e filtrit. Hinka konike prej çeliku filtruese fiksohet te mbajtësja me sistem bllokimi dhe rrjeta prej çeliku me madhësi 180 mikronë vendoset në hinkë. Pompa e vakumit lidhet me mbështetësen e filtrit dhe me enën prej metali apo plastike, për të mbledhur lëngun tretës.

gj) Përzierja ndalohet dhe lëngu tretës hidhet në hinkën e filtrimit nëpërmjet rrjetës. Bejkeri shpëlahet afërsisht me 250 ml ujë të ngrohtë. Uji i shpëlarjes hidhet në filtrues pasi të jetë filtruar plotësisht lëngu tretës.

h) Membrana e filtrimit kapet me pincetë, duke e mbajtur nga anët. Kjo membranë paloset në katërsh (minimumi) dhe futet në tubin konik 15 ml. Zgjedhja e tubit konik duhet t'i përshtatet shtypësit të havanit.

i) Membrana e filtrimit shtyhet në fund të tubit konik 15 ml me ndihmën e shtypësit të havanit dhe shtypet fort, duke bërë afërsisht 20 lëvizje të njëpasnjëshme shtypëse lart e poshtë me shtypësin e havanit, i cili duhet të pozicionohet brenda palosjes së membranës filtruese, sipas udhëzimeve të prodhuesit.

j) $0,5 \pm 0,01$ ml nga holluesi i mostrës shtohet në tubin konik 15 ml me pipetë dhe membrana filtruese



homogjenizohet më shtypësin e havanit duke bërë lëvizje të njëpasnjëshme me amplitudë të ulët lart e poshtë për 30 sekonda, duke shmangur lëvizjet e papritura për të kufizuar spërkatjen, sipas udhëzimeve të prodhuesit.

k) Çdo mostër, kontrolli negativ dhe kontrolli pozitiv shpërndahen me pipeta në fusha të ndryshme të letres së aglutinimit, sipas udhëzimeve të prodhuesit.

l) Rruazat e lateksit shtohen me pipetë në çdo fushë të letres së aglutinimit, sipas udhëzimeve të prodhuesit, pa i venë ato në kontakt me mostrën/mostrat dhe me kontrollet. Në çdo fushë, rruazat e lateksit përzihen me kujdes me një thupër të përshtatshme deri sa lëngu i homogjenizuar të mbulojë të gjithë fushën.

ll) Letra aglutinuese vendoset në tundësin 3D dhe tundet për 10 ± 1 minuta, sipas udhëzimeve të prodhuesit.

m) Pas kohës së përcaktuar nga udhëzimet e prodhuesit, tundja ndalohet dhe letra e aglutinimit vendoset në një sipërfaqe të sheshtë dhe rezultatet e reaksionit lexohen menjëherë, sipas udhëzimeve të prodhuesit. Agregatat e rruazave shfaqen në rastet kur kemi një mostër pozitive. Në rast të mostrave negative, gjendja e turbullt mbetet homogjene, pa agregate të rruazave.

II. Për bashkime më të vogla se 100 gr, siç përcaktohet në pikën 8 të ISO 18743:2015.

Aty ku nevojitet, mund të shtohen deri në 15 g në një bashkim total prej 100 g dhe të ekzaminohen së bashku me këto mostra në përputhje me seksionin I. Më shumë se 15 g duhet të ekzaminohen si një bashkim i plotë. Për bashkime deri në 50 g, lëngu tretës dhe përbërësit mund të reduktohen në 1 litër ujë, 8 ml acid klorhidrik dhe 5 g pepsinë.

III. Rezultatet pozitive ose të dyshimta

Kur ekzaminimi i një mostre kolektive jep rezultat pozitiv ose të dyshimtë në testin e aglutinimit të lateksit, një mostër tjetër prej 20 g merret nga çdo derr në përputhje me pikën 4.2 të ISO 18743:2015 (shih, gjithashtu, anekset A dhe B të tij për detaje të mëtejshme). Mostrat prej 20 gr nga pesë derra bashkohen dhe ekzaminohen duke përdorur metodën e përshkruar në seksionin I. Në këtë mënyrë mund të ekzaminohen mostrat nga 20 grupe me pesë derra.

Kur merret një rezultat pozitiv nga aglutinimi i lateksit nga një grup prej pesë derrash, 20 gr mostra të tjera merren nga individët në grup dhe secili

ekzaminohet veçmas, duke përdorur metodën e përshkruar në seksionin I.

Kur merret një rezultat pozitiv ose i dyshimtë nga aglutinimi i lateksit, të paktën 20 gr nga muskujt e derit dërgohet në laboratorin kombëtar të referencës (ISUV) për konfirmim, duke përdorur ISO 18743:2015 ose një nga metodat ekuivalente siç përshkruhet më sipër.

Mostrat e parazitëve duhet të mbahen në alkool etilik 70–90 % (përqendrimi përfundimtar) për t'u ruajtur dhe identifikuar në nivel llojesh në laboratorin kombëtar të referencës (ISUV).

Pas mbledhjes së parazitëve, lëngjet pozitive duhet të dekontaminohen duke u ngrohur me nxehtësi të pakën deri në 60°C.

IV. Procedura e pastrimit dhe dekontaminimit pas rezultateve pozitive apo të dyshimta

Kur nga ekzaminimi i një mostre kolektive apo individuale në testin e aglutinimit të lateksit, dalin rezultate pozitive ose të dyshimta, i gjithë materiali në kontakt me mishin (tasi dhe tehu i blenderit, thika, shtypësi i havanit, bejkeri, thupra përzierëse, sensori i temperaturës, hinka konike e filtrimit, sita dhe pincetat) duhet të dekontaminohen me kujdes, duke i zhytur për disa sekonda në ujë të nxehtë (65 - 90°C). Mbetjet e mishit ose larvat e pa aktivizuara që mund të mbesin në sipërfaqen e tyre duhet të largohen me sfungjer të pastër dhe me ujë rubineti. Nëse është e nevojshme, disa pika detergjent mund të shtohen për të larguar yndyrën nga pajisjet. Më pas rekomandohet shpëlarja e çdo pjese plotësisht për të hequr të gjitha gjurmët e detergjentit.

E. Testi i tretjes artificiale për zbulimin *in vitro* të larvave të *Trichinella spp.* në mostrat e mishit PrioCHECK® *Trichinella* AAD Kit.

Kjo metodë është konsideruar e barasvlershme vetëm për testimin e mishit të derrave shtëpiake.

Ky test me kit PrioCHECK® *Trichinella* AAD Kit duhet të përdoret sipas manualit të udhëzimeve të manualit duke përdorur hinka të ndara (Lenz NS 29/32) dhe tub testi qelqi prej 80 ml.

SHTOJCA II TRAJTIMET ME NGRIRJE

A. Metoda e ngrirjes 1

a) Mishi i sjellë në gjendje të ngrirë duhet të ruhet në këtë gjendje.

b) Pajisjet teknike, si dhe furnizimi me energji i dhomës frigoriferike duhet të jenë të tilla që të



sigurojnë që temperatura e kërkuar të arrihet shpejt dhe të mbahet në të gjitha pjesët e dhomës dhe të mishit.

c) Paketimet e izoluar hiqen përpara ngrirjes, me përjashtim të rasteve kur mishi është në temperaturën e kërkuar në momentin që është sjellë në dhomën frigoriferike, si dhe në rastet kur mishi është paketuar në mënyrë të tillë që nuk e pengon mishin të arrijë temperaturën e kërkuar brenda kohës së duhur.

ç) Ngarkesat në dhomën frigoriferike duhet të mbahen të ndara veç dhe të mbyllura me çelës.

d) Regjistrohet koha dhe data kur secila ngarkesë futet në dhomën frigoriferike.

dh) Temperatura në dhomën frigoriferike duhet të jetë të paktën -25°C . Kjo temperaturë matet, duke përdorur instrumente të kalibruara termoelektrike dhe regjistrohet vazhdimisht. Temperatura nuk duhet të matet direkt në rrymën e ajrit të ftohtë. Instrumentet duhet të mbahen të mbyllura me çelës. Grafikët e temperaturës duhet të mbajnë të dhënat përkatëse nga regjistri i inspektimit të mishit të importit, si dhe datën dhe kohën e fillimit dhe përfundimit të ngrirjes së mishit. Këto të dhëna të ruhen për 1 vit pas plotësimit.

e) Mishi me diametër ose trashësi deri në 25 cm duhet të ngrijë për të paktën 240 orë pa ndërprerje, ndërsa mishi me diametër ose trashësi nga 25 cm deri në 50 cm duhet ngrijë për të paktën 480 orë pa ndërprerje. Ky proces ngrirjeje nuk duhet të aplikohet për mishin me trashësi ose diametër më të madh. Koha e ngrirjes llogaritet duke u nisur nga pika kur temperatura në dhomën e ngrirjes arrin atë të specifikuar në germën “f”.

B. Metoda e ngrirjes 2

Dispozitat e përgjithshme dhënë në germat “a” deri “e” të seksionit A (metoda 1) zbatohen edhe në këtë rast dhe kombinimi kohë-temperaturë aplikohet si më poshtë:

a) mishi me diametër ose trashësi deri në 15 cm duhet të ngrijë sipas një nga kombinimet kohë-temperaturë të mëposhtme:

- 20 ditë në -15°C ;
- 10 ditë në -23°C ;
- 6 ditë në -29°C .

b) mishi me diametër ose trashësi ndërmjet 15 cm dhe 50 cm duhet të ngrijë sipas një nga kombinimet kohë-temperaturë të mëposhtme:

- 30 ditë në -15°C ;
- 20 ditë në -25°C ;

- 12 ditë në -29°C .

Temperatura në dhomën e ngrirjes nuk duhet të jetë më e madhe se niveli i temperaturës së inaktivimit të zgjedhur. Kjo temperaturë matet duke përdorur instrumente të kalibruara termo-elektrike dhe regjistrohet vazhdimisht. Temperatura nuk duhet të matet direkt në rrymën e ajrit të ftohtë. Instrumentet duhet të mbahen të mbyllura me çelës. Grafikët e temperaturës duhet të mbajnë të dhëna nga regjistri i inspektimit të mishit të importit si dhe datën dhe kohën e fillimit dhe përfundimit të ngrirjes së mishit. Këto të dhëna të ruhen për 1 vit pas plotësimit.

Kur përdoren tunelet e ngrirjes dhe procedurat e përshkruara në seksionet A dhe B nuk ndiqen në mënyrë rigoroze, operatori i biznesit ushqimor duhet të jetë në gjendje t'i provojë autoritetit kompetent se metoda alternative është efektive në vrasjen e parazitëve trkinela në mishin e derrit.

C. Metoda e ngrirjes 3

Trajtimi konsiston në tharjen me ngrirje ose ngrirjen komerciale të mishit për kombinime të specifikuar kohë-temperaturë me temperaturë të monitoruar në qendër të secilës copë.

a) Dispozitat e përgjithshme dhënë në germat “a” deri “e” të seksionit A (metoda 1) zbatohen edhe në këtë rast dhe aplikohet kombinimi kohë-temperaturë, si më poshtë:

- 106 orë në -18°C ;
- 82 orë në -21°C ;
- 63 orë në $-23,5^{\circ}\text{C}$;
- 48 orë në -26°C ;
- 35 orë në -29°C ;
- 22 orë në -32°C ;
- 8 orë në -35°C ;
- 1/2 orë në -37°C .

b) Temperatura matet duke përdorur instrumente termoelektrike të kalibruara dhe regjistrohet vazhdimisht. Termometri futet në qendër të copës së prerë të mishit e cila nuk duhet të jetë më e vogël se pjesa më trashë e mishit që duhet të futet në ngrirje. Kjo copë futet në dhomën e ngrirjes në pozicionin më pak të favorshëm, jo ngjitur me pajisjet e ftohjes apo direkt në rrymën e ftohtë të ajrit. Instrumentet duhet të mbahen të mbyllura me çelës. Grafikët e temperaturës duhet të mbajnë të dhëna nga regjistri i inspektimit të mishit të importit, si dhe datën dhe kohën e fillimit dhe përfundimit të ngrirjes së mishit. Këto të dhëna të ruhen për 1 vit pas plotësimit.



SHTOJCA III EKZAMINIMI I KAFSHËVE TË TJERA NGA DERRI

Mishi i njëthundrakëve, mishi i kafshëve të gjahut dhe çdo mish tjetër që mund të përmbajnë parazitët trikinela duhet të ekzaminohet në përputhje me një nga metodat e tretjes të përcaktuara në kapitullin I ose II, të shtojcës I, me ndryshimet e mëposhtme:

a) mostra me peshë të paktën 10 gr merren nga gjuha ose muskujt e nofullës së njëthundrakëve dhe nga këmbët e përparme, gjuha ose diafragma e derrit të egër;

b) në rastin e njëthundrakëve, ku këto muskuj mungojnë, një mostër me madhësi më të madhe merret nga një këmbë e diafragmës në kalimin për në pjesën e forcuar. Muskujt duhet të pastrohen nga indet lidhëse dhe yndyra;

c) të paktën 5 gr mostër tretet duke ndjekur metodën referencë të zbulimit të përcaktuar në kapitullin I ose një metodë ekuivalente të përcaktuar në kapitullin II. Për çdo tretje, pesha totale e muskujve të ekzaminuar nuk duhet të kalojë 100 gr në rastin e metodës së përcaktuar në kapitullin I dhe metodat A dhe B të përcaktuara në kapitullin II si dhe 35 gr në rastin e metodës C të përcaktuar në kapitullin II;

ç) kur rezultati është pozitiv, merret një mostër tjetër 50 gr për një ekzaminim të mëvonshëm të pavarur;

d) pa cenuar rregullat për ruajtjen e specieve të kafshëve, i gjithë mishi të kafshëve të gjahut, përveç derrit të egër, të tilla si: arinj, gjitarët mishngrënës (përfshirë gjitarët e detit) dhe zvarranikët testohen duke marrë mostra 10 gr të muskujve në vendet e preferuara ose sasi më të mëdha në qoftë se këto vende nuk janë të disponueshme. Vendet e preferuara janë:

i. tek arinjtë: diafragma, muskuli maseter dhe gjuha;

ii. te lopët e detit: gjuha;

iii. te krokodilët: muskujt maseter, pterygoid dhe ndërbrinjorë;

iv. te zogjtë: muskujt e kokës (p.sh. muskujt maseter dhe muskujt e qafës);

dh) koha e tretjes duhet të jetë e mjaftueshme për të siguruar tretjen e duhur të indeve të këtyre kafshëve, por nuk duhet të kalojë 60 minuta.

SHTOJCA IV

KAPITULLI I NJOHJA ZYRTARE E FERMAVE OSE E NJË KOMPARTAMENTI QË APLIKON KUSHTE STREHIMI TË KONTROLLUARA

A. Operatorët e biznesit ushqimor për të marrë njohjen zyrtare të fermave duhet të plotësojnë kërkesat e mëposhtme:

a) operatori duhet të ketë marrë të gjitha masat paraprake praktike në lidhje me ndërtimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave në mënyrë që të parandalojë që brejtësit, çdo lloj gjatari tjetër dhe shpendët mishngrënës të kenë akses në ndërtesat ku mbahen kafshët;

b) Operatori duhet të zbatojë një program efektiv për kontrollin e insekteve, veçanërisht për brejtësit, në mënyrë për të parandaluar infestimin e derrave. Operatori duhet të mbajë të dhëna të programit sipas kërkesës së AKVMB-së;

c) Operatori duhet të sigurojë që i gjithë ushqimi për kafshë të jetë marrë nga një fabrikë që prodhon ushqime për kafshë;

ç) Operatori duhet të ruajë ushqimin për kafshë të destinuar për speciet e prekshme nga trikinela në kapanone të mbyllura ose kontejnerë të tjerë që janë të padepërtueshëm nga brejtësit. Të gjitha furnizimet e tjera me ushqim për kafshë duhet të trajtohen me nxehtësi ose të prodhohen dhe të ruhen sipas kërkesave të AKVMB-së;

d) Operatori duhet të sigurojë që kafshët e ngordhura të mblidhen, identifikohen dhe transportohen pa vonesa të panevojshme në përputhje me legjislacionin për nënproduktet me origjinë shtazore jo për konsum njerëzor;

dh) Nëse një vendgrumbullim mbeturinash ndodhet në afërsi të fermës, operatori duhet të informojë AKVMB-në. Më pas, AKVMB-ja duhet të vlerësojë risqet e përfshira dhe të vendosë nëse ferma do të njihet si një fermë që zbaton kushte strehimi të kontrolluara;

e) Operatori duhet të sigurojë identifikimin e derrave shtëpiakë, në mënyrë që çdo kafshë në fermë të mund të gjurmohet;

ë) operatori duhet të sigurojë që derrat shtëpiakë do të futen në fermë vetëm nëse ata origjinojnë dhe vijnë nga ferma që njihen zyrtarisht se zbatojnë kushte strehimi të kontrolluara;



f) Asnjë nga derrat shtëpiakë nuk duhet të ketë akses në ambientet e jashtme, përveç rasteve kur operatori për të plotësuar kërkesat e AKVMB-së, mund të tregojë me anë të një analize risku se periudha kohore, objektet dhe rrethanat e daljes në natyrë nuk paraqesin rrezik për futjen e trikinelës në fermë.

B. Operatorët e biznesit ushqimor të fermave të njohura zyrtarisht se zbatojnë kushte strehimi të kontrolluara duhet të informojnë AKVMB-në kur ndonjë nga kërkesat e përcaktuara në germën A nuk arrin të përmbushet më ose kur ka ndodhur ndonjë ndryshim tjetër që mund të ndikojë në statusin e fermës.

C. AKVMB-ja mund të njohë një fermë ose një kategori fermash vetëm me kusht që të ketë verifikuar se kërkesat e përcaktuara në germën A, janë përmbushur.

KAPITULLI II RAPORTIM MBI SITUATËN E TRIKINELËS

Numri i testeve dhe rezultatet e testimit për trikinelën në derrat shtëpiakë, derrat e egër, njëthundrakët, kafshët e gjahut dhe çdo kafshë tjetër e prekshme nga trikinela, do të dorëzohen në Drejtorinë e Përgjithshme të Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Të dhënat për derrat shtëpiakë duhet të paktën të ofrojnë informacion specifik, në lidhje me:

- testet mbi kafshët e rritura në kushte strehimi të kontrolluara;
- teste për dosat e mbarështimit dhe derrat e majmërisë.

SHTOJCA V VENDET E TRETA OSE RAJONET E TYRE QË ZBATOJNË PËRJASHTIMET E PËRMENDURA NË NENIN 13(2)

Kodi ISO i vendit	Vendi i tretë ose rajonet e tij	Vërejtje
BM	Mbretëria e Bashkuar (*)	Zbatimi i përjashtimeve të parashikuara në nenin 3, pika 2 dhe 3

(*) Në përputhje me Marrëveshjen për tërheqjen e Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së

Veriut nga Bashkimi Evropian dhe Komuniteti Evropian i Energjisë Atomike dhe, në veçanti neni 5(4) i Protokollit për Irlandën/Irlandën e Veriut, në lidhje me shtojcën 2 të këtij Protokollit, për qëllimet e kësaj shtojce, referencat në Mbretërinë e Bashkuar nuk përfshijnë Irlandën e Veriut.

URDHËR Nr. 448 datë 1.8.2023

PËR IMPORTIN E KAFSHËVE TË LLOJIT DERRA, PRODUKTEVE, NËNPRODUKTEVE TË TYRE, MATERIALIT BIOLOGJIK, EMBRIONEVE, MISHIT DHE NËNPRODUKTEVE TË TYRE NGA MAQEDONIA E VERIUT

Mbështetur në nenin 102, pika 4, të Kushtetutës; në nenet 42 dhe 43 të ligjit nr. 10465, datë 29.9.2011, “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar,

URDHËROJ:

1. Lejimin e importit dhe tranzitimit për në territorin e Republikës së Shqipërisë të të gjitha kafshëve të gjalla të llojit derra të butë dhe të egër, produkteve të tyre, materialit biologjik dhe embrioneve të kafshëve të gjalla të llojit derra, mishin e freskët dhe nënprodukteve të tyre të kafshëve të llojit derra, vetëm nëse plotësohen kushtet e mëposhtme nga pika 1.1 deri në pikën 1.8, përkatësisht nga shteti i Maqedonisë së Veriut:

Ndarja administrative e nivelit të parë	Ndarja administrative e nivelit të dytë*	Ndarja administrative e nivelit të tretë
Češinovo-Oblesevo	Ularci*	
Delcevo*		
Karbinci	Karbinci*	
Kočani*		
Kratovo*		
Gostivar*		
Kriva Palanka*		
Kumanovo	Kumanovo*	
Kumanovo	Dolno Konjare*	
Kumanovo	Ljubodrag*	
Kumanovo	Tabanovce*	
Kumanovo	Recica*	
Makedonska Kamenica	Moshitica*	
Makedonska Kamenica	Preseka*	
Makedonska Kamenica	Glavovica*	



Novo Selo	Novo Selo	
Probištip	Drenok*	
Probištip	Shtalkovica*	
Probištip	Stalkovica*	
Rankovce	Otosnica*	
Staro Nagoriçane	Staro Nagoriçane*	
Staro Nagoriçane	Arbanasko*	
Staro Nagoriçane	Tromegia*	
Štip	Štip*	
Vinita	Vinita*	
Vinita	Vinicka Krshla*	
Vrapçište*		
Novatsi*		
Kavadartsi*		

Shënime. Simboli (*) nënkupton zonën e infektuar që bllokohet.

1.1. Për kafshët e gjalla të llojit derra të butë dhe të egër, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që kafshët:**

a) nuk kanë shfaqur shenja klinike të murtajes afrikane të derrave ditën e dërgesës;

b) janë mbajtur që nga lindja ose për tre muajt e fundit në një kompartment (zonë) pa prezencë të murtajes afrikane të derrave; ose

c) janë mbajtur në një stacion karantine, të izoluar për 30 ditë përpara dërgesës dhe i janë nënshtruar një testi virologjik dhe një testi serologjik të kryer të paktën 21 ditë pas hyrjes në stacionin e karantinës, me rezultate negative.

1.2. Për materialin biologjik të kafshëve të llojit derra të butë ose të egër, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që kafshët donatore të materialit biologjik:**

a) janë mbajtur që nga lindja ose për të paktën tre muaj para grumbullimit në një stacion, në të cilin janë mbikëqyrur në përpunje me nenet 15.1.28 deri në 15.1.30 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe vërtetohet se asnjë rast i murtajes afrikane të derrave nuk ka ndodhur në tre vjetëve të fundit. Kjo periudhë reduktohet në 12 muaj, vetëm nëse survejanca demonstron dokumenton se nuk ka dëshmi të përfshirjes së rriqnave në epidemiologjinë e infeksionit;

b) nuk kanë shfaqur shenja klinike të murtajes afrikane të derrave në ditën e mbledhjes së materialit biologjik;

c) sperma është mbledhur, përpunuar dhe ruajtur në përpunje me kapitullit 4.6 dhe 4.7 të Kodit Terrestrial të OIE-së;

ç) sperma e përdorur për fekundimin e ovociteve është në përpunje me kushtet e përcaktuara në

nenin 15.1.10 ose nenin 15.1.11, të Kodit Terrestrial të OIE-së sipas rastit.

1.3. Për embrionet e derivuara *in vivo* të derrave të butë, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që kafshët donatore të embrioneve:**

a) janë mbajtur që nga lindja ose për të paktën tre muaj para grumbullimit të embrioneve në një stacion, në të cilën janë mbikëqyrur në përpunje me nenet 15.1.28 deri në 15.1.30 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe vërtetohet se asnjë rast i murtajes afrikane të derrave nuk ka ndodhur në tre vjetët e fundit. Kjo periudhë reduktohet në 12 muaj vetëm nëse survejanca demonstron dokumenton se nuk ka dëshmi të përfshirjes së rriqnave në epidemiologjinë e infeksionit;

b) nuk kanë shfaqur shenjë klinike të murtajes afrikane të derrave në ditën e mbledhjes së embrioneve;

c) i janë nënshtruar një testi serologjik të kryer të paktën 21 ditë pas grumbullimit, me rezultate negative;

ç) embrionet janë mbledhur, përpunuar dhe ruajtur në përpunje me dispozitat përkatëse të kapitullit 4.8 dhe 4.10, të Kodit Terrestrial të OIE-së.

1.4. Për mishin e kafshëve të llojit derra të butë ose të egër, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) e gjithë ngarkesa e mishit të freskët vjen nga kafshët e llojit derra që kanë origjinën nga tufat në të cilat janë mbikëqyrur në përpunje me nenet 15.1.28 deri në 15.1.30 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe vërtetohet se asnjë rast i murtajes afrikane të derrave nuk ka ndodhur në tre vjetët e fundit. Kjo periudhë reduktohet në 12 muaj vetëm nëse survejanca demonstron dokumenton se nuk ka dëshmi të përfshirjes së rriqnave në epidemiologjinë e infeksionit;

b) janë testuar mostra nga një numër statistikisht përfaqësues i kafshëve për sëmundjen e murtajes afrikane të derrave, me rezultate negative;

c) e gjithë ngarkesa e mishit të freskët vjen nga kafshët të cilat janë therur në një thertore të miratuar dhe i janë nënshtruar kontrollit me rezultate të favorshme të inspektimit para dhe pas vdekjes në përpunje me kapitullin 6.3 të Kodit Terrestrial të OIE-së;



ç) janë marrë masat e nevojshme pas therjes për të shmangur kontaktin e mishit të freskët me çdo burim të virusit të murtajës afrikane të derrave.

1.5. Për mishin e freskët të kafshëve të egra të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) janë vrarë në një vend ose zonë të lirë nga murtaja afrikane e derrave në përputhje me pikën 1 ose pikën 2 të nenit 15.1.4 të Kodit Terrestrial të OIE-së;

b) i janë nënshtruar me rezultate të favorshme një inspektimi pas vdekjes në përputhje me kapitullin 6.3 të Kodit Terrestrial të OIE-së në një objekt ekzaminimi të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti.

1.6. Për produktet e mishit të kafshëve të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) mishi i freskët plotëson kushtet përkatëse në nenet 15.1.14, 15.1.15 dhe 15.1.16 të Kodit Terrestrial të OIE-së;

b) mishi është përpunuar në një objekt të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti dhe ka plotësuar kushtet përkatëse të nenëve 15.1.14, 15.1.15 dhe 15.1.16 të Kodit Terrestrial të OIE-së; ose

c) janë përpunuar në një objekt të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti, në mënyrë që të sigurohet shkatërrimi i virusit të murtajës afrikane të derrave, në përputhje me nenin 15.1.23 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë marrë masat e nevojshme pas përpunimit të mishit për të shmangur kontaktin e produktit me çdo burim të virusit të murtajës afrikane të derrave.

1.7. Për qimet (e pjesës së shpinës) e kafshëve të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) e kanë origjinën nga derrat e egër ose të butë të kapur në një vend, zonë ose ndarje pa prezencë të murtajës afrikane të derrave dhe janë përpunuar në një objekt të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti; ose

b) janë përpunuar në një objekt të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti ku është siguar shkatërrimi i virusit të murtajës afrikane të derrave në përputhje me një nga proceset e listuara në nenin 15.1.26 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë marrë masat e nevojshme pas përpunimit për të shmangur kontaktin me produktin me çdo burim të virusit të murtajës afrikane të derrave.

1.8. Për lëkurët e kafshëve të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) kanë ardhur nga derra të një vendi ose zone të lirë nga sëmundja e murtajës afrikane të derrave, në përputhje me pikën 1 ose pikën 2, të nenit 15.1.4 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë përpunuar në një objekt të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti; ose

b) origjinojnë nga derra të egër ose të butë të kapur në një vend, zonë ose kompartament pa prezencë të sëmundjes së murtajës afrikane të derrave dhe janë përpunuar në një objekt të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti; ose

c) janë përpunuar në një objekt të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti, ku është siguar shkatërrimi i virusit të murtajës afrikane të derrave në përputhje me një nga procedurat e përmendura në nenin 15.1.25 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë marrë masat paraprake të nevojshme pas përpunimit për të shmangur kontaktin e produktit me çdo burim të virusit të murtajës afrikane të derrave.

2. Urdhri nr. 440, datë 25.7.2023, “Për importin e kafshëve të llojit derra, produkteve, nënprodukteve të tyre, materialit biologjik, embrioneve, mishit dhe nënprodukteve të tyre nga Maqedonia e Veriut”, shfuqizohet.

3. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit të informojë rregullisht, brenda 24 orëve, Autoritetin Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, Drejtorinë e Përgjithshme të Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit për çdo ngarkesë të kafshëve të llojit derra, produkteve dhe nënprodukteve të tyre, materialit biologjik, embrioneve, mishit dhe nënprodukteve të tyre.

4. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohen Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I BUJQËSISË DHE
ZHVILLIMIT RURAL
Frida Krifca



URDHËR
Nr. 449, datë 1.8.2023

**PËR IMPORTIN E KAFSHËVE TË
LLOJIT DERRA, PRODUKTEVE,
NËNPRODUKTEVE TË TYRE,
MATERIALIT BIOLOGJIK,
EMBRIONEVE, MISHIT DHE
NËNPRODUKTEVE TË TYRE
NGA ESTONIA**

Mbështetur në nenin 102, pika 4, të Kushtetutës; në nenet 42 dhe 43 të ligjit nr. 10465, datë 29.9.2011, “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar,

URDHËROJ:

1. Lejimin e importit dhe tranzitimit për në territorin e Republikës së Shqipërisë të të gjitha kafshëve të gjalla të llojit derra të butë dhe të egër, produkteve të tyre, materialit biologjik dhe embrioneve e kafshëve të gjalla të llojit derra, mishin e freskët dhe nënprodukteve të tyre të kafshëve të llojit derra, vetëm nëse plotësohen kushtet e mëposhtme nga pika 1.1 deri në pikën 1.8, përkatësisht nga shteti i Estonisë:

Ndarja administrative e nivelit të parë	Ndarja administrative e nivelit të dytë	Ndarja administrative e nivelit të tretë
Harju	Harju	Tagadi
Harju	Kose	Tammiku
Harju	Kose	Nõmbra
Harju	Kiili	Kiili
Ida-Viru	Toila	Voka
Ida-Viru	Kohtla-Nõmme	Kohtla-Nõmme
Järva	Roosna-Alliku	Oeti
Jõgeva	Torma	Liikatu
Lääne-Viru	Viru-Nigula	Viru-Nigula
Lääne-Viru	Viru-Nigula	Pada
Lääne-Viru	Viru-Nigula	Malla
Lääne-Viru	Viru-Nigula	Mahu
Lääne-Viru	Lackvere	Luusika
Lääne-Viru	Rägavere	Viru-Kabala
Lääne-Viru	Väike-Maarja	Pikevere
Lääne-Viru	Vihula	Lauli
Pärnu	Tõstamaa	Päraküla
Põlva	Mikitamäe	Laossina
Põlva	Orava	Kõvera
Põlva	Orava	Kamnitsa
Põlva	Räpina	Linte
Põlva	Mooste	Rasina

Põlva	Põlva	Lutsu
Põlva	Ahja	Ahja
Rapla	Kohila	Urge
Saare	Kärla	Hirmuste
Viljandi	Abja	Penuja
Viljandi	Tarvastu	Soe
Võru	Misso	Kärinä

1.1. Për kafshët e gjalla të llojit derra të butë dhe të egër, **certifikata shëndetësore veterinarë duhet të vërtetojë që kafshët:**

a) nuk kanë shfaqur shenja klinike të murtagjës afrikane të derrave ditën e dërgesës;

b) janë mbajtur që nga lindja ose për tre muajt e fundit në një kompartment (zonë) pa prezencë të murtagjës afrikane të derrave; ose

c) janë mbajtur në një stacion karantine, të izoluar për 30 ditë përpara dërgesës dhe i janë nënshtruar një testi virologjik dhe një testi serologjik të kryer të paktën 21 ditë pas hyrjes në stacionin e karantinës, me rezultate negative.

1.2. Për materialin biologjik të kafshëve të llojit derra të butë ose të egër, **certifikata shëndetësore veterinarë duhet të vërtetojë që kafshët donatore të materialit biologjik:**

a) janë mbajtur që nga lindja ose për të paktën tre muajt para grumbullimit në një stacion, në të cilin janë mbikëqyrur në përputhje me nenet 15.1.28 deri në 15.1.30 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe vërtetohet se asnjë rast i murtagjës afrikane të derrave nuk ka ndodhur në tre vjetët e fundit. Kjo periudhë reduktohet në 12 muaj vetëm nëse survejanca demonstron dokumenton se nuk ka dëshmi të përfshirjes së rriqave në epidemiologjinë e infeksionit;

b) nuk kanë shfaqur shenja klinike të murtagjës afrikane të derrave në ditën e mbledhjes së materialit biologjik;

c) sperma është mbledhur, përpunuar dhe ruajtur në përputhje me kapitujt 4.6 dhe 4.7 të Kodit Terrestrial të OIE-së;

ç) sperma e përdorur për fekondimin e ovociteve është në përputhje me kushtet e përcaktuara në nenin 15.1.10 ose me nenin 15.1.11 të Kodit Terrestrial të OIE-së, sipas rastit.

1.3. Për embrionet e derivuara *in vivo* të derrave të butë, **certifikata shëndetësore veterinarë duhet të vërtetojë që kafshët donatore të embrioneve:**



a) janë mbajtur që nga lindja ose për të paktën tre muaj para grumbullimit të embrioneve në një stacion, në të cilën janë mbikëqyrur në përputhje me nenet 15.1.28 deri në 15.1.30 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe vërtetohet se asnjë rast i murtajes afrikane të derrave, nuk ka ndodhur në tre vjetët e fundit.

Kjo periudhë reduktohet në 12 muaj vetëm nëse survejanca demonstron dokumenton se nuk ka dëshmi të përfshirjes së rriqnave në epidemiologjinë e infeksionit;

b) nuk kanë shfaqur shenjë klinike të murtajes afrikane të derrave në ditën e mbledhjes së embrioneve;

c) i janë nënshtruar një testi serologjik të kryer të paktën 21 ditë pas grumbullimit, me rezultate negative;

ç) embrionet janë mbledhur, përpunuar dhe ruajtur në përputhje me dispozitat përkatëse të kapitujve 4.8 dhe 4.10 të Kodit Terrestrial të OIE-së.

1.4. Për mishin e kafshëve të llojit derra të butë ose të egër, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) e gjithë ngarkesa e mishit të freskët vjen nga kafshët e llojit derra që kanë origjinën nga tufat në të cilat janë mbikëqyrur në përputhje me nenet 15.1.28 deri në 15.1.30 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe vërtetohet se asnjë rast i murtajes afrikane të derrave nuk ka ndodhur në tre vjetët e fundit. Kjo periudhë reduktohet në 12 muaj vetëm nëse survejanca demonstron dokumenton se nuk ka dëshmi të përfshirjes së rriqnave në epidemiologjinë e infeksionit;

b) janë testuar mostra nga një numër statistikisht përfaqësues i kafshëve për sëmundjen e murtajes afrikane të derrave, me rezultate negative;

c) e gjithë ngarkesa e mishit të freskët vjen nga kafshë të cilat janë therur në një thertore të miratuar dhe i janë nënshtruar kontrollit me rezultate të favorshme të inspektimit para dhe pas vdekjes në përputhje me kapitullin 6.3 të Kodit Terrestrial të OIE-së;

ç) janë marrë masat e nevojshme pas therjes për të shmangur kontaktin e mishit të freskët me çdo burim të virusit të murtajes afrikane të derrave.

1.5. Për mishin e freskët të kafshëve të egra të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) janë vrarë në një vend ose zonë të lirë nga murtaja afrikane e derrave në përputhje me pikën 1

ose me pikën 2 të nenit 15.1.4 të Kodit Terrestrial të OIE-së;

b) i janë nënshtruar me rezultate të favorshme një inspektimi pas vdekjes në përputhje me kapitullin 6.3 të Kodit Terrestrial të OIE-së, në një objekt ekzaminimi të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti.

1.6. Për produktet e mishit të kafshëve të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) mishi i freskët plotëson kushtet përkatëse në nenet 15.1.14, 15.1.15. dhe 15.1.16 të Kodit Terrestrial të OIE-së;

b) mishi është përpunuar në një objekt të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti dhe ka plotësuar kushtet përkatëse të neneve 15.1.14, 15.1.15 dhe 15.1.16 të Kodit Terrestrial të OIE-së; ose

c) janë përpunuar në një objekt të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti, në mënyrë që të sigurohet shkatërrimi i virusit të murtajes afrikane të derrave, në përputhje me nenin 15.1.23 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë marrë masat e nevojshme pas përpunimit të mishit për të shmangur kontaktin e produktit me çdo burim të virusit të murtajes afrikane të derrave.

1.7. Për qimet (e pjesës së shpinës) e kafshëve të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) e kanë origjinën nga derrat e egër ose të butë të kapur në një vend, zonë ose ndarje pa prezencë të murtajes afrikane të derrave dhe janë përpunuar në një objekt të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti; ose

b) janë përpunuar në një objekt të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti ku është siguruar shkatërrimi i virusit të murtajes afrikane të derrave, në përputhje me një nga proceset e listuara në nenin 15.1.26 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë marrë masat e nevojshme pas përpunimit për të shmangur kontaktin me produktin me çdo burim të virusit të murtajes afrikane të derrave.

1.8. Për lëkurët e kafshëve të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) kanë ardhur nga derra të një vendi ose zone të lirë nga sëmundja e murtajes afrikane të derrave, në përputhje me pikën 1 ose me pikën 2 të nenit 15.1.4 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë përpunuar



në një objekt të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti; ose

b) origjinojnë nga derra të egër ose të butë të kapur në një vend, zonë ose kompartament pa prezencë të sëmundjes së murtajës afrikane të derrave dhe janë përpunuar në një objekt të miratuar nga autoriteti veterinar, për qëllime eksporti; ose

c) janë përpunuar në një objekt të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti, ku është siguruar shkatërrimi i virusit të murtajës afrikane të derrave në përputhje me një nga procedurat e përmendura në nenin 15.1.25 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë marrë masat paraprake të nevojshme pas përpunimit për të shmangur kontaktin e produktit me çdo burim të virusit të murtajës afrikane të derrave.

2. Urdhri nr. 555, datë 22.11.2022, “Për importin e kafshëve të llojit derra, produkteve, nënprodukteve të tyre, materialit biologjik, embrioneve, mishit dhe nënprodukteve të tyre nga Estonia”, shfuqizohet.

3. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit të informojë rregullisht, brenda 24 orëve, Autoritetin Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, Drejtorinë e Përgjithshme të Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit për çdo ngarkesë të kafshëve të llojit derra, produkteve dhe nënprodukteve të tyre, materialit biologjik, embrioneve, mishit dhe nënprodukteve të tyre.

4. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohen Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I BUJQËSISË DHE
ZHVILLIMIT RURAL
Frida Krifca

URDHËR

Nr. 454, datë 2.8.2023

PËR LISTËN E AGJENTËVE TË KONTROLLIT BIOLOGJIK NË TERRITORIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë; të nenit 14, të pikës 7, të ligjit nr. 105/2016, “Për mbrojtjen e bimëve”, të ndryshuar,

URDHËROJ:

1. Miratimin e listës së agjentëve të kontrollit biologjik që lejohen të importohen, eksportohen dhe përdoren në territorin e Republikës së Shqipërisë, me qëllim kontrollin e dëmtuesve, sipas aneksit bashkëlidhur këtij urdhri.

2. Ngarkohen për zbatimin e këtij urdhri Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë dhe Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve.

Ky urdhër botohet në Fletoren Zyrtare dhe hyn në fuqi më 1 janar 2024.

MINISTËR I BUJQËSISË DHE
ZHVILLIMIT RURAL
Frida Krifca



ANEKSI

**LISTA E AGJENTËVE TË KONTROLLIT BIOLOGJIK QË LEJOHEN TË
IMPORTOHEN, EKSPORTOHEN DHE PËRDOREN NË TERRITORIN E REPUBLIKËS
SË SHQIPËRISË**

KLASIFIKIMI, DEJTUESI I SYNUAR, PËRHAPJA DHE PËRDORIMI

I. INSEKTET**1. Coleoptera**

<i>Adalia bipunctata</i>	
Familja	Coccinellidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Aphididae
Burimi i parë i përhapjes	Palaeartik (?)
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	?
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Danimarkë, Gjermani, Itali, Holandë, Portugali, Zvicër
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Aleochara bilineata</i>	
Familja	Staphylinidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Delia antiqua</i> , <i>Delia radicum</i> (= <i>Delia brassicae</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Evropa Veriore dhe e Mesme, Kanada dhe SHBA
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1997 (Në Holandë)
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Holandë, disa vende të tjera evropiane
Përdorimi	Në ambiente të hapura
<i>Atheta coriaria</i>	
Sinonimet	<i>Atheta brachelytra</i> , <i>Dalotia coriaria</i> , <i>Homalota coriaria</i>
Familja	Staphylinidae
Burimi i parë i përhapjes	Europë, Azia Veriore, Amerika e Veriut, Oqeania, e shpërndarë gjerësisht në rajonin e EPPO-s
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Thripidae (thrips), Sciaridae (fungus gnats), Ephydriidae (shore flies)
Data e përdorimit të parë	2002 (Biobest)
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Francë, Gjermani, Holandë, Poloni, Spanjë, Zvicër, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Chilocorus baileyi</i>	
Familja	Coccinellidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Diaspididae
Burimi i parë i përhapjes	Australi
Përhapja në EPPO	Jo i përhapur



Data e përdorimit të parë	1985
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Francë, Holandë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Chilocorus bipustulatus</i>	
Familja	Coccinellidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Diaspididae, Coccidae (<i>Saissetia oleae</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Palaeartik i jugut
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur (Jug dhe Qendër)
Data e përdorimit të parë	1959
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Francë, Greqi, Izrael, Itali, Holandë, Turqi
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Chilocorus circumdatus</i>	
Familja	Coccinellidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Diaspididae
Burimi i parë i përhapjes	Azia Juglindore
Përhapja në EPPO	Jo i përhapur
Data e përdorimit të parë	1985
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Francë, Holandë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Chilocorus nigrita</i>	
Familja	Coccinellidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Diaspididae, Asterolecaniidae
Burimi i parë i përhapjes	Azia Jugore
Përhapja në EPPO	Jo i përhapur
Data e përdorimit të parë	1985
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Danimarkë, Francë, Gjermani, Holandë, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Coccinella septempunctata</i>	
Familja	Coccinellidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Aphididae
Burimi i parë i përhapjes	Palaeartik
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1980
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Francë, Gjermani, Portugali
Përdorimi	Në ambiente të hapura
<i>Cryptolaemus montrouzier</i>	
Familja	Coccinellidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Planococcus citri</i>
Burimi i parë i përhapjes	Australi
Përhapja në EPPO	Zona mesdhetare
Data e përdorimit të parë	1985



Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Guernsej, Irlandë, Itali, Xheri, Holandë, Norvegji, Poloni, Portugali, Rusi, Sllovaki, Spanjë, Suedi, Zvicër, Tunizi, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Delphastus catalinae</i>	
Sinonim	<i>Delphastus pusillae</i>
Familja	Coccinellidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Aleyrodidae (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Neartik/Neotropik
Përhapja në EPPO	Jo i përhapur
Data e përdorimit të parë	1993
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finland, Francë, Gjermani, Greqi, Jordani, Holandë, Poloni, Rusi, Spanjë, Tunizi, Mbretëria e Bashkuar (i kufizuar me licencë)
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Propylea quatuordecimpunctata</i>	
Sinonim	Propylaea 14-punctata, Calvia
Familja	Coccinellidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Shumëllojshmëri e madhe e afideve që i përkasin superfamiljes së Aphidoidea
Burimi i parë i përhapjes	Vendas në rajonin Paleartik dhe i shpërndarë gjerësisht në Evropë, i vendosur në rajonin e Neartik.
Përhapja në EPPO	Shqipëri, Austri, Bjellorusi, Belgjikë, Bosnjë dhe Hercegovinë, Bullgari, Kroaci, Qipro, Republika Çeke, Danimarkë, Estoni, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Hungari, Itali, Latvia, Luksemburg, Maqedoni, Malta, Moldavi, Norvegji, Poloni, Portugali, Rumani, Rusi, Sllovaki, Slloveni, Spanjë, Suedi, Zvicër, Holandë, Turqi, Ukrainë.
Data e përdorimit të parë	2018
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Itali, Luksemburg, Holandë, Spanjë, Mbretëri e Bashkuar dhe vendet e Beneluksit
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Rhizophagus grandis</i>	
Familja	Rhizophagidae
Dëmtuesit e synuar	<i>Dendroctonus micans</i>
Data e përdorimit të parë	1963
Vendet EPPO ku është hedhur	ish-BRSS (Gjeorgji) [S], MB [E], Francë [E] (Ndoshta i përhapur gjerësisht në Evropën Qendrore dhe Lindore)
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë, shumë herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Belgjikë
<i>Rhyzobius forestieri</i>	
Familja	Coccinellidae



Dëmtuesit e synuar	<i>Saissetia oleae</i>
Data e përdorimit të parë	1980
Vendet EPPO ku është hedhur	Itali [S], Francë [S], Greqi [E], Qipro [N], Izrael [E]
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Australi
<i>Rhyzobius lophanthae</i>	
Sinonim	<i>Lindorus lophanthae</i>
Familja	Coccinellidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Diaspididae (<i>Pseudolacaspis pentagona</i>), <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> , <i>Chrysomphalus dictyospermi</i> , <i>Parlatoria blanchardi</i>
Burimi i parë i përhapjes	Australi
Përhapja në EPPO	Mesdhe, Rusi
Data e përdorimit të parë	1980
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Danimarkë, Gjermani, Greqi, Izrael, Itali, Holandë, Portugali, Zvicër, Turqi
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Rodolia cardinalis</i>	
Familja	Coccinellidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Icerya purchasi</i>
Burimi i parë i përhapjes	Australi
Përhapja në EPPO	Mesdhe, CIS (Komonuelthi i Shteteve të Pavarura)
Data e përdorimit të parë	?1980
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Holandë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Scymnus impexus</i>	
Familja	Coccinellidae
Dëmtuesit e synuar	<i>Adelges</i> spp.
Data e përdorimit të parë	1968
Vendet EPPO ku është hedhur	Suedi [S], MB [N] (vendat në Evropë)
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Gjermani
<i>Scymnus reunioni</i>	
Sinonim	<i>Nephus reunioni</i>
Familja	Coccinellidae
Dëmtuesit e synuar	<i>Planococcus citri</i>
Data e përdorimit të parë	1967
Vendet EPPO ku është hedhur	Izrael [N], Itali (Sardenja) [P], ish-BRSS (Gjeorgji) [F?]
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë



Origjina e materialit të grumbulluar	Indi
<i>Scymnus rubromaculatus</i>	
Familja	Coccinellidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Aphididae
Burimi i parë i përhapjes	Evropa Qendrore
Përhapja në EPPO	Finland, Estonia, Lituania
Data e përdorimit të parë	1990
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Francë, Holandë, Portugali
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Serangium parcesetosum</i>	
Familja	Coccinellidae
Dëmtuesit e synuar	<i>Dialeurodes citri</i>
Data e përdorimit të parë	1973
Vendet EPPO ku është hedhur	Ish-BRSS [Gjeorgji, C*; Azerbajxhan, C*; Uzbekistan, F], Francë (Corse) [E], Izrael, Turqi [S?]
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Indi, ish-BRSS
<i>Stethorus punctillum</i>	
Familja	Coccinellidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Panonychus ulmi</i>
Burimi i parë i përhapjes	Palaearkti
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1995
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Francë, Gjermani, Holandë, Portugali, Spanjë, Suedi
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura

2. Dipteret

<i>Aphidoletes aphidimyza</i>	
Familja	Cecidomyiidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Aphididae (<i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Macrosiphum sp.</i> , <i>Aulacorthum sp.</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Evropa Qendrore, Palaearktik
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1985
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Guernsej, Hungari, Irlandë, Itali, Xheri, Jordani, Lituani, Maltë, Marok, Holandë, Norvegji, Poloni, Portugali, Spanjë, Sllovakia, Suedi, Zvicër, Tunizi, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura



<i>Cryptochetum iceryae</i>	
Familja	Cryptochetidae
Dëmtuesit e synuar	<i>Icerya purchasi</i>
Data e përdorimit të parë	1987
Vendet EPPO ku është hedhur	Izrael [S]
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Australi
<i>Episyrphus balteatus</i>	
Familja	Syrphidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Aphididae
Burimi i parë i përhapjes	Evrope
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1995
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Danimarkë, Gjermani, Itali, Holandë, Portugali
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Eupeodes corollae</i>	
Sinonimet	<i>Metasyrphus corollae</i> , <i>Syrphus corollae</i>
Familja	Syrphidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Aphididae
Burimi i parë i përhapjes	Rajonet Palaearktik dhe Afrotropikal jugore
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	2020
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Latvia, Holandë, Spanjë, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Feltiella acarisuga</i>	
Sinonimet	<i>Feltiella tetranychii</i> , <i>Therodiplosis persicae</i>
Familja	Cecidomyiidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Tetranychus urticae</i> , <i>T. cinnabarinus</i>
Burimi i parë i përhapjes	Evropa Perëndimore, Mesdhe
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1995
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Guernsej, Irlandë, Itali, Lituani, Holandë, Norvegji, Poloni, Spanjë, Suedi, Zvicër, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Sphaerophoria rueppellii</i>	
Sinonimet	<i>Sphaerophoria flavicauda</i> , <i>Sphaerophoria nitidicollis</i>
Familja	Syrphidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Kryesisht Aphididae por edhe miza të bardha, tripset dhe marimangat



Burimi i parë i përhapjes	Gjerësisht i përhapur në rajonet Palaearktik dhe Afrotropikal jugore
Përhapja në EPPO	Rajoni i Mesdheut
Data e përdorimit të parë	2012
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Spanjë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura

3. Hemiptera/Heteroptera

<i>Anthocoris nemoralis</i>	
Familja	Anthocoridae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Psyllidae (orchards)
Burimi i parë i përhapjes	Palaearktik
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	?
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Danimarkë, Gjermani, Holandë
Përdorimi	Në ambiente të hapura
<i>Anthocoris nemorum</i>	
Familja	Anthocoridae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Cacopsylla pyri</i> , thrips
Burimi i parë i përhapjes	Palaearktik
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1992
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Danimarkë, Francë, Itali, Xhersi, Holandë, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të hapura
<i>Macrolophus pygmaeus</i>	
Familja	Miridae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Aleyrodidae
Burimi i parë i përhapjes	Palaearktik
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1990
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Guernsej, Hungari, Irlandë, Itali, Jordani, Lituani, Maltë, Holandë, Norvegji, Poloni, Portugali, Sllovaki, Spanjë, Suedi, Zvicër, Tunizi, Turqi, Mbretëri e Bashkuar (i kufizuar me licencë)
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
Shënim shtesë	<i>Macrolophus pygmaeus</i> ishte përfshirë më parë në listën pozitive me emrin <i>Macrolophus melanotoma</i> (sinonim: <i>Macrolophus caliginosus</i>), ky gabim u gjet dhe u korrigjua në vitin 2009; <i>Macrolophus pygmaeus</i> është raportuar si i dëmshëm në domatet qershë dhe në Gerbera. Prandaj nuk rekomandohet të përdoret në këto kultura. Këshillohet kujdes kur përdoret <i>M. pygmaeus</i> në



	çdo kulturë të re, veçanërisht në bimë zbukuruese me një prag të ulët për dëmtimin pamor.
<i>Orius albidipennis</i>	
Familja	Anthocoridae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Thrips
Burimi i parë i përhapjes	Mesdhe, Palaeartik
Përhapja në EPPO	Mesdheu
Data e përdorimit të parë	1991
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Francë, Izrael, Itali, Holandë, Spanjë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Orius laevigatus</i>	
Familja	Anthocoridae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Thripidae (<i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Thrips tabaci</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Palaeartik (përveç veriut)
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur (përveç veriut)
Data e përdorimit të parë	1991
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Guernsej, Hungari, Irlandë, Itali, Xhersi, Jordani, Lituani, Maltë, Marok, Holandë, Norvegji, Poloni, Portugali, Sllovaki, Spanjë, Zvicër, Tunizi, Mbretëria e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Orius majusculus</i>	
Familja	Anthocoridae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Thripidae (<i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Thrips tabaci</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Palaeartik
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1991
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Guernsej, Itali, Xhersi, Lituani, Holandë, Norvegji, Poloni, Portugali, Spanjë, Suedi, Zvicër, Mbretëria e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Picromerus bidens</i>	
Familja	Pentatomidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Lepidoptera
Burimi i parë i përhapjes	Palaeartik (gjithashtu në Neartik)
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1990
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	CIS countries, Gjermani, Poloni, Rusi
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Podisus maculiventris</i>	
Familja	Pentatomidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Lepidoptera, <i>Leptinotarsa decemlineata</i>
Burimi i parë i përhapjes	Amerika Veriore dhe Jugore
Përhapja në EPPO	Jo e përhapur
Data e përdorimit të parë	1996



Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Bullgari, Danimarkë, Finlandë, Francë, Greqi, Itali, Holandë, Rusi, Spanjë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura

4. Hymenoptera

<i>Acerophagus maculipennis</i>	
Sinonimi	<i>Pseudaphycus maculipennis</i>
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Pseudococcidae
Burimi i parë i përhapjes	Palaeartik
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur (në jug)
Data e përdorimit të parë	1980
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Francë, Gjermani, Holandë, Spanjë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Ageniaspis citricola</i>	
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit e synuar	<i>Phyllocnistis citrella</i>
Data e përdorimit të parë	1994-
Vendet EPPO ku është hedhur	Izrael, Marok, Algjeri, Tunizi, Francë, Greqi, Qipro, Spanjë [C], Itali (Sicilia); themeluar Një herë në Ishujt Kanarie ku siguron kontroll të plotë të dëmtuesit të synuar
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë, shumë herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Tajlandë, Florida (SHBA)
<i>Allotropa burrelli</i>	
Familja	Platygasteridae
Dëmtuesit e synuar	<i>Pseudococcus comstocki</i>
Data e përdorimit të parë	1945
Vendet EPPO ku është hedhur	ish-BRSS [P*]
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Japoni
<i>Allotropa convexifrons</i>	
Familja	Platygasteridae
Dëmtuesit e synuar	<i>Pseudococcus comstocki</i>
Data e përdorimit të parë	1945
Vendet EPPO ku është hedhur	ish-BRSS [P*]
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Kore
<i>Amitus spiniferus</i>	



Familja	Platygasteridae
Dëmtuesit e synuar	<i>Aleurothrixus floccosus</i>
Data e përdorimit të parë	1971-
Vendet EPPO ku është hedhur	Francë [C*], Itali [S*]
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Amerika Qendrore
<i>Anagrus atomus</i>	
Familja	Mymaridae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Cicadellidae
Burimi i parë i përhapjes	Palaeartik
Përhapja në EPPO	?
Data e përdorimit të parë	1994
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Francë, Gjermani, Guernsej, Xhersi, Holandë, Spanjë, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Anagrus agraeus</i>	
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit e synuar	<i>Nipaeococcus viridis</i>
Data e përdorimit të parë	1984-
Vendet EPPO ku është hedhur	Jordani [S?], Izrael [S?]
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Guana
<i>Anagrus fusciventris</i>	
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Pseudococcidae
Burimi i parë i përhapjes	Australi
Përhapja në EPPO	Jo e pranishme
Data e përdorimit të parë	1990
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Danimarkë, Francë, Gjermani, Holandë, Spanjë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Anagrus vladimiri</i>	
Sinonimi	<i>Anagrus pseudococci</i>
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Pseudococcidae
Burimi i parë i përhapjes	Mesdhe
Përhapja në EPPO	Mesdhe
Data e përdorimit të parë	1995
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Francë, Çeki, Greqi, Itali, Holandë, Portugali, Spanjë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Anaphes nitens</i>	



Familja	Mymaridae
Dëmtuesit e synuar	<i>Gonipterus scutellatus</i>
Data e përdorimit të parë	1978
Vendet EPPO ku është hedhur	Itali [C], Francë [P], Spanjë [S]
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Australi
<i>Anastatus bifasciatus</i>	
Familja	Eupelmidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Heteroptera (<i>Halyomorpha halys</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Evropë
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	2019
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Itali
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Aphelinus abdominalis</i>	
Familja	Aphelinidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Aphididae (<i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Aulacorthum solani</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Evropë
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1992
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Bullgari, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Guernsej, Irlandë, Itali, Xhersi, Jordani, Holandë, Poloni, Spanjë, Suedi, Zvicër, Tunizi, Mbretëria e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Aphelinus mali</i>	
Familja	Aphelinidae
Dëmtuesit e synuar	<i>Eriosoma lanigerum</i>
Data e përdorimit të parë	1920-
Vendet EPPO ku është hedhur	Francë [P], Hungari [S], Izrael [P], Itali [S], Zvicër [S], ish-BRSS (Azerbajxhan) [C], Portugali [N], Belgjikë [C], Gjermani [P], MB [P], Slloveni, Maltë, Holandë [P], Spanjë [P], Poloni [P], Suedi [P], Qipro [C], Danimarkë [P] (gjerësisht i përhapur në rajonin EPPO)
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	SHBA
<i>Aphidius colemani</i>	
Familja	Braconidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Aphididae (<i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>M. nicotianae</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Afrika e Veriut, Lindja e Mesme, India
Përhapja në EPPO	Zona e Mesdheut



Data e përdorimit të parë	1992
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Guernsej, Hungari, Irlandë, Itali, Xhersi, Jordani, Lituani, Maltë, Marok, Holandë, Norvegji, Poloni, Portugali, Sllovaki, Spanjë, Suedi, Zvicër, Tunizi, Turqi, Mbretëri e Bashkuar.
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Aphidius ervi</i>	
Familja	Braconidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Aulacorthum solani</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i>
Burimi i parë i përhapjes	Palacarktik
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1995
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Guernsej, Hungari, Irlandë, Itali, Xhersi, Lituani, Holandë, Norvegji, Poloni, Portugali, Sllovaki, Spanjë, Suedi, Zvicër, Mbretëri e Bashkuar.
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Aphidius matricariae</i>	
Familja	Braconidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Myzus persicae</i>
Burimi i parë i përhapjes	Holarktik
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur në rajone me klimë të butë
Data e përdorimit të parë	1990
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Gjermani, Guernsej, Xhersi, Holandë, Poloni, Portugali, Sllovaki, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Aphytis diaspidis</i>	
Familja	Aphelinidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Diaspididae, <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> , <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>
Burimi i parë i përhapjes	Kaliforni
Përhapja në EPPO	Mesdhe
Data e përdorimit të parë	?
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Holandë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Aphytis holoxanthus</i>	
Familja	Aphelinidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Diaspididae
Burimi i parë i përhapjes	Azi
Përhapja në EPPO	Mesdhe
Data e përdorimit të parë	1996
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Çeki, Francë, Holandë, Spanjë dhe Izrael
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Aphytis lepidosaphes</i>	
Familja	Aphelinidae



Dëmtuesit e synuar	<i>Cornuaspis beckii</i>
Data e përdorimit të parë	1956-
Vendet EPPO ku është hedhur	Izrael [C], Qipro [N], Francë [N], Greqi [S], Spanjë [S], Itali (Sicili) [P]
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Kinë
<i>Aphytis lingnanensis</i>	
Familja	Aphelinidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Aonidiella aurantii</i> , <i>Chrysomphalus dictyospermi</i>
Burimi i parë i përhapjes	Ndoshta Azia Lindore (vendosur gjerësisht diku tjetër)
Përhapja në EPPO	Mesdhe
Data e përdorimit të parë	?
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Greqi , Itali, Spanjë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Aphytis melinus</i>	
Familja	Aphelinidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Aonidiella aurantii</i>
Burimi i parë i përhapjes	Indi/Pakistan
Përhapja në EPPO	Mesdhe
Data e përdorimit të parë	1995
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Çeki, Danimark, Francë, Greqi, Itali, Portugali, Spanjë.
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Aphytis proclia</i>	
Familja	Aphelinidae
Dëmtuesit e synuar	<i>Pseudaaulacaspis pentagona</i>
Data e përdorimit të parë	1924
Vendet EPPO ku është hedhur	Itali [S] (<i>Gjerësisht i përhapur në rajonin EPPO</i>)
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Azia Lindore
<i>Aprostocetus hagenowii</i>	
Sinonimet	<i>Tetrastichus hagenowii</i> , <i>Tetrastichodes hagenowii</i>
Familja	Eulophidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Blattidae (<i>Periplaneta spp.</i>)
Burimi i parë i përhapjes	?
Përhapja në EPPO	Rumani
Data e përdorimit të parë	1993
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Francë, Gjermani, Holandë, Spanjë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Bracon hebetor</i>	
Sinonimet	<i>Habrobracon hebetor</i>
Familja	Braconidae



Dëmtuesit kryesorë të synuar	Lepidoptera (në produktet e ruajtura)
Burimi i parë i përhapjes	Indi, Anglia
Përhapja në EPPO	Zona Mesdheut (kryesisht lindore)
Data e përdorimit të parë	1980
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Shumë shtete (përfshirë Gjermani, Portugali)
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Clausenia purpurea</i>	
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit e synuar	<i>Pseudococcus citriculus</i>
Data e përdorimit të parë	1940
Vendet EPPO ku është hedhur	Izrael [C]
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Japoni
<i>Coccophagus lycimnia</i>	
Familja	Aphelinidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Coccidae
Burimi i parë i përhapjes	Kosmopolitan
Përhapja në EPPO	Mesdhe
Data e përdorimit të parë	1988
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Danimarkë, Francë, Gjermani, Holandë, Portugali, Spanjë, Suedi.
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Coccophagus rusti</i>	
Familja	Aphelinidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Coccidae
Burimi i parë i përhapjes	Kosmopolitan
Përhapja në EPPO	Mesdhe
Data e përdorimit të parë	1988
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Francë, Holandë, Spanjë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Coccophagus scutellaris</i>	
Familja	Aphelinidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Coccidae
Burimi i parë i përhapjes	Kosmopolitan
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1986
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Francë, Holandë, Portugali, Spanjë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Comperiella bifasciata</i>	
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Diaspididae (<i>Chrysomphalus aonidum</i> , <i>Aonidiella aurantii</i>)
Burimi i parë i përhapjes	? Kaliforni/Kina Jugore
Përhapja në EPPO	Mesdhe



Data e përdorimit të parë	1985
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Greqi, Holandë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Cotesia marginiventris</i>	
Sinonimet	<i>Apanteles marginiventris</i>
Familja	Braconidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Lepidoptera (Noctuidae)
Burimi i parë i përhapjes	Amerika
Përhapja në EPPO	?
Data e përdorimit të parë	1993
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Francë, Holandë, Spanjë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Dacnusa sibirica</i>	
Familja	Braconidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Agromyzidae (<i>Liriomyza spp.</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Paleartik, Evropë
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur në rajone me klimë të butë
Data e përdorimit të parë	1981
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Bullgari, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Guernsej, Itali, Xhersi, Jordani, Maltë, Marok, Holandë, Norvegji, Poloni, Portugali, Sllovaki, Spanjë, Suedi, Zvicër, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura (selino, marule)
<i>Diglyphus isaea</i>	
Familja	Eulophidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Agromyzidae (<i>Liriomyza spp.</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Palaeartik
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1984
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Hungari, Itali, Jordani, Maltë, Marok, Holandë, Norvegji, Poloni, Portugali, Sllovaki, Spanjë, Suedi, Zvicër, Tunizi, Turqi, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Encarsia berlesei</i>	
Familja	Aphelinidae
Dëmtuesit e synuar	Pseudaulacaspis pentagona
Data e përdorimit të parë	1906-
Vendet EPPO ku është hedhur	Itali [C], Bullgari [C], Zvicër [C], Spanjë [C], Austri [C], ish-BRSS [C], Francë [P], Hungari, Slloveni
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Japonia, Azia Lindore
<i>Encarsia citrina</i>	



Familja	Aphelinidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Diaspididae
Burimi i parë i përhapjes	Kosmopolitan
Përhapja në EPPO	Mesdhe
Data e përdorimit të parë	1984
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Francë, Gjermani, Holandë, Spanjë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Encarsia formosa</i>	
Familja	Aphelinidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Aleyrodidae (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Neartik jugore
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1930
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri Belgjikë, Bullgari, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Hungari, Irlandë, Itali, Jordani, Lituani, Maltë, Marok, Holandë, Norvegji, Poloni, Portugali, Sllovaki, Spanjë, Suedi, Zvicër, Tunizi, Turqia, Britani e Madhe
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Encarsia herndoni</i>	
Sinonimi	Encarsia elongata
Familja	Aphelinidae
Dëmtuesit e synuar	Lepidosaphes gloverii
Data e përdorimit të parë	1979
Vendet EPPO ku është hedhur	Spanjë [S]
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Azia Lindore
<i>Encarsia lahorensis</i>	
Familja	Aphelinidae
Dëmtuesit e synuar	Dialeurodes citri
Data e përdorimit të parë	1973-
Vendet EPPO ku është hedhur	Itali [S; Sardenja, P; Sicili, C], ish-BRSS (Gjeorgji) [C*], Francë [E], Turqi, Greqi [S, E], Izrael [C*]
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë, shumë herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Indi, Pakistan
<i>Encarsia perniciosi</i>	
Familja	Aphelinidae
Dëmtuesit e synuar	Quadraspidiotus perniciosus
Data e përdorimit të parë	1932-



Vendet EPPO ku është hedhur	Itali [P], ish-BRSS [E], Gjermani [P], Francë [P], Bullgari [C], ish Çekosllovaki [E, N], Zvicër [P], ish-Jugosllavi [N], Austri [E], Greqi [E], Spanjë [P] (Gjerësisht i përhapur në rajonin EPPO)
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë, shumë herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Kinë, Kore
<i>Encyrtus aurantii</i>	
Sinonimet	<i>Encyrtus lecaniorum</i>
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Coccidae
Burimi i parë i përhapjes	Palaeartik
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur (Jug)
Data e përdorimit të parë	1980
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Francë, Gjermani, Holandë, Spanjë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Encyrtus infelix</i>	
Sinonimet	<i>Eucomys tananarivensis</i>
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Coccidae
Burimi i parë i përhapjes	Rajoni Afrotropikal
Përhapja në EPPO	Izrael
Data e përdorimit të parë	1992
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Danimarkë, Francë, Holandë, Spanjë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Ephedrus cerasicola</i>	
Familja	Braconidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Aphis frangulae</i> , <i>A. gossypii</i> , <i>Aulacorthum circumflexum</i> , <i>Aulacorthum solani</i> , <i>Brachycaudus helichrysi</i> , <i>Capitophorus inulae</i> , <i>Cavariella aegopodii</i> , <i>Chaetosiphon fragaefolii</i> , <i>Cryptomyzus galeopsidis</i> , <i>Dysaphis apiifolia</i> , <i>Dysaphis sp.</i> , <i>Hyadaphis foeniculi</i> , <i>Hyperomyzus lactucae</i> , <i>Hyperomyzus sp.</i> , <i>Myzus ascalonicus</i> , <i>M. cerasi</i> , <i>M. ligustri</i> , <i>M. nicotinae</i> , <i>M. ornatus</i> , <i>M. persicae</i> , <i>Nasonovia ribisnigri</i> , <i>Nasonovia sp.</i> , <i>Ovatus crataegarius</i> , <i>Phorodon humili</i> , <i>Rhodobium porosum</i>
Burimi i parë i përhapjes	Në mënyrë natyrale në të gjithë Evropën
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1999
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Danimarkë, Finland, Francë, Gjermani, Holandë, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Eretmocerus debachi</i>	
Familja	Aphelinidae
Dëmtuesit e synuar	<i>Parabemisia myricae</i>



Data e përdorimit të parë	1982-
Vendet EPPO ku është hedhur	Izrael [C], Turqi [C], Itali [S] (Shpërndarja mesdhetare?)
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Japoni, Amerika e Veriut
<i>Eretmocerus eremicus</i>	
Familja	Aphelinidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Bemisia tabaci</i>
Burimi i parë i përhapjes	Neartik jugor
Përhapja në EPPO	Mesdhe
Data e përdorimit të parë	1994
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Guernsej, Hungari, Itali, Lituani, Maltë, Marok, Holandë, Norvegji, Poloni, Portugali, Sllovaki, Spanjë, Zvicër, Tunizi, Turqi
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Eretmocerus mundus</i>	
Familja	Aphelinidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Bemisia tabaci</i>
Burimi i parë i përhapjes	Evropa Jugore
Përhapja në EPPO	Mesdhe
Data e përdorimit të parë	1996
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Danimarkë, Gjermani, Itali, Holandë, Portugali, Spanjë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Gyranusoidea litura</i>	
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Pseudococcus longispinus</i>
Burimi i parë i përhapjes	Afrikë
Përhapja në EPPO	Francë, Spanjë
Data e përdorimit të parë	1990
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Francë, Holandë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Leptomastidea abnormis</i>	
Sinonimi	<i>Leptomastix abnormis</i>
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Pseudococcidae
Burimi i parë i përhapjes	Palaeartik
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1984
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Danimarkë, Gjermani, Guernsej, Izrael, Itali, Xhersi, Holandë, Spanjë, Zvicër, Turqi, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Leptomastix dactylopii</i>	
Familja	Encyrtidae



Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Planococcus citri</i>
Burimi i parë i përhapjes	Neotropik
Përhapja në EPPO	Rajoni Mesdheut
Data e përdorimit të parë	1992
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Guernsej, Irlandë, Itali, Xhersi, Holandë, Norvegji, Poloni, Portugali, Spanjë, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Leptomastix epona</i>	
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Pseudococcidae</i> , especially <i>Pseudococcus viburni</i>
Burimi i parë i përhapjes	Palaeartik
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur (jug)
Data e përdorimit të parë	1992
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Danimarkë, Francë, Gjermani, Gërni, Xhersi, Holandë, Spanjë, Mbretëria e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Metaphycus annekei</i>	
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit e synuar	<i>Saissetia oleae</i>
Data e përdorimit të parë	?
Vendet EPPO ku është hedhur	Greqi [C], Izrael [E], Francë [E], Itali [F]
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Afrika e Jugut
<i>Metaphycus flavus</i>	
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Coccidae, <i>Saissetia oleae</i> , <i>Coccus hesperidum</i>
Burimi i parë i përhapjes	Neartik
Vendosur në EPPO	Po
Përhapja në EPPO	Mesdhe
Data e përdorimit të parë	1999
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Gjermani, Holandë, Zvicër
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Metaphycus helvolus</i>	
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Coccidae (<i>Saissetia oleae</i> , <i>Coccus hesperidum</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Afrika e jugut (gjithashtu krijuar në Neartik)
Përhapja në EPPO	Greqi, Itali
Data e përdorimit të parë	1992
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Danimarkë, Francë, Gjermani, Greqi, Izrael, Itali, Holandë, Spanjë, Suedi, Zvicër
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Metaphycus lounsburyi</i>	



Sinonimet	<i>M. bartletti</i> , <i>M. annecki</i> dhe <i>M. hagenowii</i> , gjithashtu vendosur në disa vende të Mesdheut, nuk është identifikuar në <i>M. lounsburyi</i>
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Coccidae (<i>Saissetia oleae</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Kaliforni, Australi, Hawaii, Afrika e Jugut
Përhapja në EPPO	Mesdheu
Data e përdorimit të parë	1997
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Danimarkë, Francë, Itali, Holandë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Metaphycus swirskii</i>	
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Coccidae
Burimi i parë i përhapjes	Afrika lindore?
Përhapja në EPPO	Francë, Greqi (Kretë), Izrael, Itali (ndoshta shumë i përhapur në Rajonin e Mesdheut)
Data e përdorimit të parë	1992
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Francë, Holandë, Spanjë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Microterys nietneri</i>	
Sinonimet	<i>Microterys flavus</i>
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Coccidae (<i>Saissetia oleae</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Kaliforni, Pakistan
Përhapja në EPPO	Itali
Data e përdorimit të parë	1987
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Danimarkë, Francë, Gjermani, Greqi, Izrael, Holandë, Spanjë, ish-Jugosllavi
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Neodryinus typhlocybae</i>	
Familja	Dryinidae
Dëmtuesit e synuar	Metcalfa pruinosa
Data e përdorimit të parë	1989-
Vendet EPPO ku është hedhur	Itali, Francë, Slloveni, Zvicër
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	SHBA
<i>Neodusmetia sangwani</i>	
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit e synuar	Antonina graminis
Data e përdorimit të parë	1971
Vendet EPPO ku është hedhur	Izrael [S]
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë



Origjina e materialit të grumbulluar	India e Jugut
<i>Ooencyrtus kuvanae</i>	
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit e synuar	Lymantria dispar
Data e përdorimit të parë	1922
Vendet EPPO ku është hedhur	ish Çekosllovakia [E], Spanja [P], Maroku [E], Algjeria [E], Portugalia [E], ish-BRSS (Kazakistani, Moldavia, Rusia, Ukraina, Uzbekistani) [P]
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Japoni
<i>Opius pallipes</i>	
Familja	Braconidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Liriomyza bryoniae</i>
Burimi i parë i përhapjes	Palaeartik (?)
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1980
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Francë, Gjermani, Greqi, Guernsej, Xhersi, Lituani, Holandë, Poloni, Spanjë, Mbretëria e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Praon volucre</i>	
Sinonimi	Aphidius volucre
Familja	Braconidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Aphididae
Burimi i parë i përhapjes	Palaeartik
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	?
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Guernsej, Xhersi, Hollandë, Mbretëria e Bashkuar
Përdorimi	Indoors
<i>Pseudaphycus malinus</i>	
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit e synuar	Pseudococcus comstocki
Data e përdorimit të parë	1945
Vendet EPPO ku është hedhur	ish-BRSS [C]
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Kore
<i>Psyllaephagus pilosus</i>	
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit e synuar	Ctenarytaina eucalypti
Data e përdorimit të parë	1994



Vendet EPPO ku është hedhur	Irlandë [S], Francë [S]
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Australi
<i>Psytalia concolor</i>	
Sinonim	Opius concolor
Familja	Braconidae
Dëmtuesit e synuar	Bactrocera oleae
Data e përdorimit të parë	1914-
Vendet EPPO ku është hedhur	Itali [S], Greqi [P], Francë [P], Spanjë [P], Portugali, ish-Jugosllavi [N]
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Libi, Tunizi
<i>Pteroptrix orientalis</i>	
Sinonim	Archenomus orientalis
Familja	Aphelinidae
Dëmtuesit e synuar	Pseudauleacaspis pentagona
Data e përdorimit të parë	1909
Vendet EPPO ku është hedhur	Itali [S]
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Japoni
<i>Pteroptrix smithi</i>	
Familja	Aphelinidae
Dëmtuesit e synuar	Chrysomphalus aonidum
Data e përdorimit të parë	1956
Vendet EPPO ku është hedhur	Izrael [C*]
Hedhur shumë herë/një herë	Një herë
Origjina e materialit të grumbulluar	Hong Kong
<i>Scutellista caerulea</i>	
Sinonimi	<i>Scutellista cyanea</i>
Familja	Pteromalidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Coccidae (<i>Saissetia oleae</i> , <i>S. coffeae</i> , <i>Ceroplastes rusci</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Afrikë
Përhapja në EPPO	Mesdhe, CIS
Data e përdorimit të parë	1990
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Danimarkë, Francë, Holandë, Zvicër
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Tetracnemoidea brevicornis</i>	



Sinonimi	<i>Hungariella pretiosa</i>
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Pseudococcidae
Burimi i parë i përhapjes	?
Përhapja në EPPO	Itali
Data e përdorimit të parë	1992
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Francë, Holandë, Spanjë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Tetracnemoidea peregrina</i>	
Sinonimi	<i>Hungariella peregrina</i>
Familja	Encyrtidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Pseudococcidae
Burimi i parë i përhapjes	Amerika e Veriut
Përhapja në EPPO	Izrael
Data e përdorimit të parë	1992
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Francë, Izrael, Holandë, Spanjë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Thripobius javae</i>	
Sinonimi	<i>Thripobius semiluteus</i>
Familja	Eulophidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Thysanoptera (<i>Heliothrips</i> spp.)
Burimi i parë i përhapjes	Zonat tropikale dhe subtropikale të Afrikës, Azisë dhe Australisë
Përhapja në EPPO	Izrael
Data e përdorimit të parë	1995
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Danimarkë, Francë, Gjermani, Holandë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Torymus sinensis</i>	
Familja	Torymidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Dryocosmus Kuriphilus</i>
Burimi i parë i përhapjes	Japoni dhe SHBA
Përhapja në EPPO	Nga vitin 2005
Data e përdorimit të parë	1982?
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Itali
Përdorimi	Në ambiente të hapura
<i>Trichogramma brassicae</i>	
Sinonimi	<i>Trichogramma maidis</i>
Familja	Trichogrammatidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Lepidoptera (<i>Ostrinia nubilalis</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Europë
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1980
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Itali, Xhersi, Jordani, Holandë, Sllovaki, Spanjë, Zvicër, Mbretëri e Bashkuar



Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Trichogramma cacoeciae</i>	
Familja	Trichogrammatidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Lepidoptera
Burimi i parë i përhapjes	Europë
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1980
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Danimarkë, Francë, Gjermani, Hungari
Përdorimi	Në ambiente të hapura
<i>Trichogramma cordubensis</i>	
Viti i shtimit në listën positive të EPPO	2020
Familja	Trichogrammatidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Lepidoptera (e.g. <i>Cydalima perspectalis</i> , <i>Lobesia botrana</i> & <i>Eupoecilia ambiguella</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Mesdhe (Algjeri, Egjipt, Francë, Iran, Marok, Portugali, Spanjë)
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1980
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Francë
Përdorimi	Në ambiente të hapura
<i>Trichogramma dendrolimi</i>	
Familja	Trichogrammatidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Lepidoptera
Burimi i parë i përhapjes	Europë
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1985
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Gjermani, Sllovaki
Përdorimi	Në ambiente të hapura
<i>Trichogramma evanescens</i>	
Familja	Trichogrammatidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Lepidoptera (duke përfshirë në produktet e ruajtura)
Burimi i parë i përhapjes	Europë
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1993
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Itali, Xhersi, Jordani, Holandë, Portugali, Sllovaki, Spanjë, Tunizi, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Trichogramma pintoi</i>	
Sinonimi	<i>Trichogramma euproctidis</i>
Familja	Trichogrammatidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Kryesisht speciet Lepidoptera: <i>Ostrinia nubilalis</i> , <i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Cydia nigricana</i> , <i>Cydia pomonella</i> , <i>Cydia funebrana</i> , <i>Plutella xylostella</i> , <i>Mamestra brassicae</i> , <i>Lacanobia oleracea</i>



Burimi i parë i përhapjes	Palearktik, Lindja e Afërt, Nearktik, rajoni Neotropik; Rajoni Oriental, gjerësisht i përhapur në rajonin EPPO
Data e përdorimit të parë	2002 (Hungari)
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Bjellorusi, Republika Çeke, Hungari, Moldavi, Poloni, Rusi, Sllovaki, Ukrainë, Uzbekistan
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Trichopria drosophilae</i>	
Familja	Diapriidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Parazitoid i pupave të <i>Drosophila suzukii</i> , parazitoid relativisht specifik krahasuar me parazitoidët e tjerë të Dipterës.
Burimi i parë i përhapjes	Gjerësisht i përhapur, kryesisht në zonat me klimë tropikale/mesdhetare/të ngrohtë. Indigjene në rajonin EPPO
Përhapja në EPPO	France, Gjermani, Greqi, Israel, Itali, Marok dhe Holandë, Spanjë
Data e përdorimit të parë	2015 (Itali)
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Itali (nga 2015), Spanjë (2017) dhe Zvicër (2017)
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura

5. Neuroptera

<i>Chrysoperla carnea</i>	
Sinonimi	<i>Chrysopa carnea</i>
Familja	Chrysopidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Aphididae etc.
Burimi i parë i përhapjes	Kosmopolitan
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1987
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Guernsej, Irlandë, Itali, Holandë, Portugali, Spanjë, Suedi, Zvicër, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura

6. Thysanoptera

<i>Franklinothrips megalops</i>	
Sinonimi	<i>Franklinothrips myrmicaeformis</i>
Familja	Aeolothripidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Thysanoptera
Burimi i parë i përhapjes	Afrika, Izraeli, India
Përhapja në EPPO	Izrael, Tunizi
Data e përdorimit të parë	1992
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Francë, Holandë, Spanjë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Franklinothrips vespiformis</i>	
Familja	Aeolothripidae



Dëmtuesit kryesorë të synuar	Thysanoptera
Burimi i parë i përhapjes	Azi
Përhapja në EPPO	Izrael, Portugali
Data e përdorimit të parë	1990
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Danimarkë, Francë, Gjermani, Izrael, Holandë, Portugali, Suedi, Zvicër
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Karnyothrips melaleucus</i>	
Familja	Phlaeothripidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Coccidae, Diaspididae (<i>Howardia biclavis</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Pantropikal
Përhapja në EPPO	Portugali (Madeira)
Data e përdorimit të parë	1994
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Danimarkë, Francë, Holandë, Spanjë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura

II. ARACHNIDA, Acarina

<i>Amblydromalus limonicus</i>	
Sinonimet	<i>Amblyseius limonicus</i> , <i>Typhlodromus (Amblyseius) limonicus</i> , <i>Amblyseius (Typhlodromalus) limonicus</i> , <i>Typhlodromus limonicus</i> , <i>Amblyseius (Amblyseius) limonicus</i> , <i>Typhlodromalus limonicus</i> , <i>Typhlodromalus lailae</i>
Familja	Phytoseiidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Tripset dhe krahëbardhat (kryesisht <i>Bemisia tabaci</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Amerika Veriore, Qendrore dhe Jugore, Hawaii, Zelanda e Re dhe Australia
Përhapja në EPPO	E vendosur në veri-lindje të Spanjës
Data e përdorimit të parë	2010
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Danimarkë, Angli, Finlandë, Francë, Gjermani, Irlandë, Holandë, Poloni, Rusi, Suedi dhe Ukrainë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Amblyseius andersoni</i>	
Sinonimi	<i>Typhlodromus andersoni</i>
Familja	Phytoseiidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Tetranychus urticae</i> , <i>T. cinnabarinus</i> , <i>Panonychus ulmi</i> , <i>Aculops lycopersicae</i> , <i>Polyphagotarsonemus latus</i> , <i>Phytonemus pallidus</i>
Burimi i parë i përhapjes	Palearktik dhe Nearktik
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	2006 (nga Syngenta)
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Francë, Gjermani, Itali, Holandë, Poloni, Spanjë, Mbretëria e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Amblyseius barkeri</i>	
Sinonimet	<i>Amblyseius mckenziei</i> , <i>Neoseiulus barker</i>



Familja	Phytoseiidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Thysanoptera (<i>Thrips tabaci</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>), Tarsonemidae
Burimi i parë i përhapjes	Europë
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1981
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Danimarkë, Francë, Gjermani, Itali, Holandë, Sllovaki, Zvicër
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Amblyseius degenerans</i>	
Sinonimi	<i>Iphiseius degenerans</i>
Familja	Phytoseiidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Thysanoptera
Burimi i parë i përhapjes	Afrikë/Mesdhe
Përhapja në EPPO	Mesdhe
Data e përdorimit të parë	1993
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Hungari, Itali, Xhersi, Holandë, Norvegji, Poloni, Spanjë, Zvicër, Tunizi, Turqi, Britani e Madhe
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Amblyseius swirskii</i>	
Sinonimi	<i>Typhlodromips swirskii</i>
Familja	Phytoseiidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>
Burimi i parë i përhapjes	Në lindje të rajonit të Mesdheut, natyralisht ndodhet në Izrael, Itali, Qipro, Greqi dhe Egjipt, të gjetura në kultura të ndryshme si mollë, kajsë, agrume, perime dhe pambuk
Data e përdorimit të parë	2005 (Austri, Belgjikë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Hungari, Itali, Marok, Holand, Poloni dhe Turqi)
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Bjellorusi, Belgjikë, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Guernsej, Hungari, Itali, Xhersi, Marok, Holandë, Norvegji, Poloni, Spanjë, Turqi, Mbretëria e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Cheyletus eruditus</i>	
Familja	Cheyletidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Marimangat e ruatjes, marimangat (gjethore).
Burimi i parë i përhapjes	Indigjen
Përhapja në EPPO	Belgjikë, Holandë
Data e përdorimit të parë	1985
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Çeki, Francë, Gjermani, Holandë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
Shënime shtesë	Janë raportuar raste të reaksioneve alergjike tek fermerët
<i>Euseius gallicus</i>	
Familja	Phytoseiidae



Dëmtuesit kryesorë të synuar	Flutra e bardhë (Aleyrodidae) dhe tripsi (Thysanoptera)
Burimi i parë i përhapjes	Europa, zonat detare dhe mesdhetare
Përhapja në EPPO	Belgjikë, Francë, Holandë, Tunizi dhe Turqi
Data e përdorimit të parë	Hollandë, 2010
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Francë, Gjermani, Holandë, Poloni dhe Ukrainë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Hypoaspis aculeifer</i>	
Sinonimet	<i>Geolaelaps aculeifer</i>
Familja	Laelapidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Sciaridae, <i>Rhizoglyphus echinopus</i>
Burimi i parë i përhapjes	Europë
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1995
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Guernsej, Irlandë, Itali, Holandë, Norvegji, Poloni, Portugali, Spanjë, Zvicër, Mbretëria e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Macrocheles robustulus</i>	
Sinonimet	<i>Holostaspis subbadius</i> , <i>Macrocheles coprophila</i>
Familja	Macrochelidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Dëmtuesit që jetojnë në tokë si tripset (pupa) dhe sciarids (larvat)
Burimi i parë i përhapjes	Kosmopolitan
Përhapja në EPPO	Austri, Bullgari, Republika Çeke, Gjeorgji, Gjermani, Greqi, Hungari, Itali, Poloni, Rusi, Sllovaka, Suedi dhe Mbretëria e Bashkuar
Data e përdorimit të parë	2010
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Itali, Holandë, Poloni, Rusi, Spanjë, Suedi, Mbretëri e Bashkuar dhe Ukrainë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Metaseiulus occidentalis</i>	
Sinonimet	<i>Galendromus occidentalis</i> , <i>Typhlodromus occidentalis</i>
Familja	Phytoseiidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Tetranychidae
Burimi i parë i përhapjes	Neartik
Përhapja në EPPO	?
Data e përdorimit të parë	1991
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Danimarkë, Francë, Greqi, Guernsej, Xhersi, Holandë, Poloni, Spanjë, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Neoseiulus californicus</i> (vetëm shtami jo diapauzuese)	
Sinonimet	<i>Amblyseius californicus</i> , <i>Typhlodromus californicus</i> , <i>Amblyseius mungeri</i> , <i>Typhlodromus mungeri</i> , <i>Amblyseius chilensis</i> , <i>Typhlodromus marinus</i>



Familja	Phytoseiidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Tetranychidae
Burimi i parë i përhapjes	Amerika Veriore Jugore/Kaliforni, Mesdhe
Përhapja në EPPO	?
Data e përdorimit të parë	1985
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Guernsej, Irlandë, Itali, Xhersi, Maltë, Holandë, Poloni, Portugali, Spanjë, Zvicër, Tunizi, Mbretëria e Bashkuar (i kufizuar me licencë)
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Neoseiulus cucumeris</i>	
Sinonimet	<i>Amblyseius cucumeris</i>
Familja	Phytoseiidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Thysanoptera (<i>T. tabaci</i> , <i>F. occidentalis</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Kosmopolitan
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur (jo i pranishëm në Suedi, Finlandë, Norvegji)
Data e përdorimit të parë	1985
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Guernsej, Hungari, Irlandë, Itali, Xhersi, Jordani, Lituani, Maltë, Holandë, Norvegji, Poloni, Portugali, Sllovaki, Spanjë, Suedi, Zvicër, Tunizi, Turqi, Mbretëria e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Phytoseiulus persimilis</i>	
Sinonimet	<i>Phytoseiulus riegeli</i> , <i>Phytoseiulus tardi</i>
Familja	Phytoseiidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Tetranychidae (<i>Tetranychus urticae</i>)
Burimi i parë i përhapjes	Mesdhe
Përhapja në EPPO	Europa Jugore
Data e përdorimit të parë	1968
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Guernsej, Hungari, Irlandë, Itali, Xhersi, Jordani, Lituani, Maltë, Marok, Holandë, Norvegji, Poloni, Portugali, Sllovaki, Spanjë, Suedi, Zvicër, Tunizi, Turqi, Mbretëria e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Stratiolaelaps scimitus</i>	
Sinonimet	<i>Hypoaspis scimitus</i>
Shënimi taksonomik	Speciet janë përdorur më parë me emrin e gabuar <i>Stratiolaelaps miles</i> (= <i>Hypoaspis miles</i> = <i>Geolaelaps miles</i>)
Familja	Laelapidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Sciaridae, <i>Rhizoglyphus echinopus</i>
Burimi i parë i përhapjes	Palaeartik
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1994



Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Irlandë, Itali, Xhersi, Holandë, Norvegji, Poloni, Portugali, Spanjë, Suedi, Zvicër, MB
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura
<i>Transeius montdorensis</i>	
Sinonimet	<i>Amblyseius montdorensis</i> , <i>Typhlodromips montdorensis</i>
Familja	Phytoseiidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Aleyrodidae (Trialeurodes spp. dhe Bemisia spp.), thrips (<i>Franklinella occidentalis</i> dhe <i>Thrips tabaci</i>) dhe Eriophyidae (<i>Aculops lycopersici</i>), edhe pse do të përdoret kryesisht kundër <i>Frankliniella occidentalis</i>
Burimi i parë i përhapjes	Ishujt e Paqësorit dhe zonat perëndimore të kontinentit Australian
Data e përdorimit të parë	2004
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Holandë, Poloni, Rumani, Spanjë dhe Britani e Madhe
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Typhlodromus pyri</i>	
Familja	Phytoseiidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Panonychus ulmi</i> , <i>Tetranychus urticae</i> , <i>Eriophyes vitis</i> , <i>Epirimerus vitis</i>
Burimi i parë i përhapjes	Europë/Neartik
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1985
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Francë, Gjermani, Hungari, Portugali, Sllovaki
Përdorimi	Në ambiente të hapura

6. Nematoda

<i>Heterorhabditis bacteriophora</i>	
Sinonimet	<i>Heterorhabditis heliothidis</i>
Familja	Heterorhabditidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Vine weevils (<i>Otiorhynchus</i> spp.)
Burimi i parë i përhapjes	Evropa Jugore dhe Qendrore /Amerika e Veriut
Përhapja në EPPO	Evropa Jugore dhe Qendrore
Data e përdorimit të parë	1984
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Francë, Gjermani, Itali, Holandë, Slloveni, Zvicër
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Heterorhabditis downesi</i>	
Sinonimi	Tipi Irlandez i <i>Heterorhabditis</i>
Familja	Heterorhabditidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Vine weevils (<i>Otiorhynchus</i> spp.), <i>Phyllopertha horticola</i> , <i>Hoplia philanthus</i> , <i>Melolontha melolontha</i> , <i>Hylobius abietis</i>



Burimi i parë i përhapjes	Evropë
Përhapja në EPPO	Danimarkë, Gjermani, Hungari, Irlandë, Itali, Mbretëri e Bashkuar
Data e përdorimit të parë	2001
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Irlandë, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Heterorhabditis megidis</i>	
Familja	Heterorhabditidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Vine weevils (<i>Otiorhynchus</i> spp.)
Burimi i parë i përhapjes	Europë
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1984
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Guernsej, Irlandë, Itali, Xheri, Holandë, Norvegji, Poloni, Sllovaki, Spanjë, Suedi, Zvicër, Tunizi, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Phasmarhabditis hermaphrodita</i>	
Familja	Phasmarhabditidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Kërmijtë pa guaskë (Slug)
Burimi i parë i përhapjes	Europa Qëndrore
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur (përveç vendeve në veri)
Data e përdorimit të parë	1984
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Danimarkë, Francë, Gjermani, Guernsej, Itali, Xheri, Holandë, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Steinernema carpocapsae</i>	
Sinonimet	<i>Neoaplectana carpocapsae</i> , <i>N. feltiae</i>
Familja	Steinernematidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Vine weevils (<i>Otiorhynchus</i> spp.), Sciaridae, insektet që vijnë nga toka
Burimi i parë i përhapjes	Evropë (Holarktik)
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1984
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Belgjikë, Danimarkë, Francë, Gjermani, Guernsej, Itali, Xheri, Holandë, Portugali, Slloveni, Suedi, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Steinernema feltiae</i>	
Sinonimet	<i>Neoaplectana feltiae</i> , <i>N. bibionis</i> , <i>Steinernema bibionis</i> , <i>N. leucaniae</i>
Familja	Steinernematidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Melolonthidae, Sciaridae etj.
Burimi i parë i përhapjes	Evropë (Holarktik)
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	1984



Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Austri, Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Guernsej, Irlandë, Itali, Xhersi, Holandë, Norvegji, Poloni, Sllovaki, Slloveni, Spanjë, Suedi, Zvicër, Mbretëri e Bashkuar
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Steinernema glaseri</i>	
Sinonimet	<i>Neoaplectana glaseri</i>
Familja	Steinernematidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	Insektet e tokës, veçanërisht Coleoptera duke përfshirë Chrysomelidae, Curculionidae, Elateridae, Scarabaeidae, disa Lepidoptera, Orthoptera etj.
Burimi i parë i përhapjes	Argjentinë, Brazil, Kinë, Republika Çeke, Palestinë, Portugali, Republika e Koresë, Republika Sllovake, Spanjë, Zvicër, SHBA
Përhapja në EPPO	Republika Çeke, Portugali, Republika Sllovake, Spanjë, Zvicër
Data e përdorimit të parë	2004
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Holandë, Belgjikë
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura
<i>Steinernema kraussei</i>	
Familja	Steinernematidae
Dëmtuesit kryesorë të synuar	<i>Otiorhynchus sulcatus</i>
Burimi i parë i përhapjes	Në të gjithë Evropën dhe Amerikën e Veriut
Përhapja në EPPO	Gjerësisht i përhapur
Data e përdorimit të parë	2001 (në Irlandë)
Vendet EPPO-s ku janë përdorur	Irlandë, Norvegji, shumica e vendeve të tjera evropiane
Përdorimi	Në ambiente të mbyllura/të hapura



URDHËR
Nr. 455, datë 2.8.2023

PËR PËRMITESIMIN E URDHËRIT TË
MINISTRIT NR. 275, DATË 5.5.2023,
“PËR MIRATIMIN E LËNDËVE
VEPRUESE DHE PËRBËRËSVE TË
TJERË, NË PËRMBAJTJE TË PMB-ve”

Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës, të nenit 19, pika 5, të kreut V, të ligjit nr. 105/2016, “Për mbrojtjen e bimëve”, të ndryshuar, si dhe të pikës 6.3, të kreut VII, të vendimit nr. 335, datë 6.6.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullave për regjistrimin, të procedurës dhe të kriterëve të vlerësimit të produkteve për mbrojtjen e bimëve”, të ndryshuar, dhe sipas propozimit të strukturës përgjegjëse për mbrojtjen e bimëve,

URDHËROJ:

1. Në urdhrin e ministrit nr. 275, datë 5.5.2023, “Për miratimin e lëndëve vepruese dhe përbërësve

1. MIRATOHET PËR SHTIM NË PJESËN C, TË SHTOJCËS 1, LËNDA VEPRUESE ME RREZIK TË ULËT SI MË POSHTË:

Nr.	Emri i zakonshëm dhe numri i identifikimit	Emërtimi IUPAC	Pastërtia	Data e miratimit	Data e përfundimit	Dispozita specifike
1	Calcium carbonate CAS No 471-34-1 CIPAC No 843 Limestone CAS No 1317-65-3 CIPAC No 852	Calcium carbonate	950 g/kg	1 nëntor 2021	31 tetor 2036	Nuk ka

2. RINOVHET REGJISTRIMI (RIREGJISTRIM) PËR:

2.1 LËNDËT VEPRUESE, SI MË POSHTË:

Nr.	Emri i zakonshëm dhe numri i identifikimit	Emërtimi IUPAC	Pastërtia	Data e miratimit	Data e përfundimit	Dispozita specifike
1.	Bacillus thuringiensis subsp. <i>kurstaki</i> EG2348	n.a.	Jo papastërti relevante.	1 korrik 2023	30 qershor 2038	Në vlerësimin e përgjithshëm do të kushtohet vëmendje e veçantë, për: - mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh që

të tjerë, në përmbajtje të PMB-ve”, bëhet përditësimi me ndryshimet dhe shtesat, si më poshtë:

a) në pjesën C, të shtojcës 1, miratohet për shtim 1 (një) lëndë vepruese, bashkëlidhur këtij urdhri;

b) rinovohet regjistrimi për 9 (nëntë) lëndë vepruese, bashkëlidhur këtij urdhri;

c) zgjaten afatet e regjistrimit për 71 (shtatëdhjetë e një) lëndë vepruese, bashkëlidhur këtij urdhri;

ç) hiqen 2 (dy) lëndë vepruese, bashkëlidhur këtij urdhri.

2. Ky përditësim të pasqyrohet në dokumentet e regjistrimit të PMB-ve të regjistruara.

3. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohet Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I BUJQËSISË DHE
ZHVILLIMIT RURAL
Frida Krifca



						mikroorganizmat në vetvete konsiderohen si sensibilizues të mundshëm, duke siguruar që pajisjet e duhura mbrojtëse personale të përfshihen si kusht përdorimi; - sigurimin nga prodhuesi për mirëmbajtjen e rreptë të kushteve mjedisore dhe analizën e kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit, në mënyrë që të sigurohet përmbushja e kufijve të ndotjes mikrobiologjike. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masat e mëposhtme për zbutjen e rrezikut: - duhet të mbahet një periudhë minimale kohore prej 2 ditësh ndërmjet aplikimit të PMB-ve që përmbajnë <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. kurstaki EG2348 dhe vjeljes së kulturave bujqësore të përdorura për konsum të freskët, përveç rasteve kur të dhënat e disponueshme të matura ose të vlerësuara të mbetjeve tregojnë nivelet e <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. kurstaki EG2348 nën 105 CFU/gr, siç rekomandohet nga EFSA. Aplikanti duhet të paraqesë informacion shtesë, në lidhje me të dhënat në të paktën një kulturë të ngrënshme përfaqësuese (d.m.th., në frutat farore dhe perimet solanace gjatë periudhës së frutave), në lidhje me rënien e densitetit të sporeve të qëndrueshme të <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. kurstaki EG2348 në pjesët e ngrënshme të bimëve nga koha e aplikimit të një PMB-je që përmban këtë substancë aktive deri në kohën e vjeljes ose derisa nivelet e gjetura të jenë nën 105 CFU/gr, duke përfshirë të
--	--	--	--	--	--	--



						dhënat e qëndrueshmërisë së ruajtjes së mikroorganizmave midis marrjes së mostrave dhe analizës së numërimit të sporeve.
2.	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> shtami QST 713	n.a.	Jo papastërti relevante. Përmbajtja nominale e shtamit <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> QST 713 në produktin teknik dhe formulimin është minimumi: 1×10^{12} CFU/kg Maksimumi: 3×10^{13} CFU/kg.	1 korrik 2023	30 qershor 2038	Kur regjistrohen PMB-ja që përmbajnë shtamin <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> QST 713 për aplikime me spërkatje në fushë, në mënyrë që të sigurohet mbrojtja e organizmave jo të synuar, përfshirë bletët, duhet të: - autorizohen aplikimet në fushë vetëm në kulturat e palulëzuara ose në prani të barërave të këqija në fushë jashtë periudhës ditore të ushqimit të bletëve; - zbatohen masa për zbutjen e rrezikut që synojnë të reduktojnë lëvizjen në zonat jashtë fushës (p.sh. duke marrë parasysh aplikimin e zonave tampon dhe të zvogëlimit të spërkatjes me sprucatorë). Do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - sigurimin nga prodhuesi për mirëmbajtjen e rreptë të kushteve mjedisore dhe analizën e kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit, në mënyrë që të sigurohet përmbushja e kufijve të ndotjes mikrobiologjike; - specifikimet e materialit teknik të prodhuar komercialisht dhe të përdorur në PMB-të; - mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh që mikroorganizmat në vetvete konsiderohen si sensibilizues të mundshëm, duke siguruar që pajisjet e duhura mbrojtëse personale të përfshihen si kusht përdorimi.
3.	<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> SA-12	n.a.	Jo papastërti relevante.	1 korrik 2023	30 qershor 2038	Në vlerësimin e përgjithshëm do të kushtohet vëmendje e veçantë, për:



						- mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh që mikroorganizmat në vetvete konsiderohen si sensibilizues të mundshëm, duke siguruar që pajisjet e duhura mbrojtëse personale të përfshihen si kusht përdorimi; - sigurimin nga prodhuesi për mirëmbajtjen e rreptë të kushteve mjedisore dhe analizën e kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit, në mënyrë që të sigurohet përmbushja e kufijve të ndotjes mikrobiologjike. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masat e mëposhtme për zbutjen e rrezikut: - një periudhë minimale kohore prej 1 dite duhet të mbahet ndërmjet aplikimit të PMB-ve që përmbajnë <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. kurstaki SA-12 dhe vjeljes së kulturave bujqësore të përdorura për konsum të freskët, përveç rasteve kur të dhënat e disponueshme të mbetjeve të matura ose të vlerësuara tregojnë nivelet e <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. kurstaki SA-12 nën 105 CFU/gr, siç rekomandohet nga EFSA. Aplikanti duhet të paraqesë informacion shtesë, në lidhje me të dhënat në të paktën një kulturë të ngrënëshme përfaqësuese (d.m.th., në frutat farore dhe domate), në lidhje me rënien e densitetit të sporeve të qëndrueshme të <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. kurstaki SA-12 në pjesët e ngrënëshme të bimëve nga koha e aplikimit të një PMB-je që përmban këtë substancë aktive deri në kohën e vjeljes ose derisa nivelet e gjetura të jenë nën 105 CFU/g, duke
--	--	--	--	--	--	---



						përfshirë të dhënat e qëndrueshmërisë së ruajtjes së mikroorganizmave midis marrjes së mostrave dhe analizës së numërimit të sporeve.
4.	<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> ABTS-351	n.a.	Jo papastërti relevante.	1 korrik 2023	30 qershor 2038	Në vlerësimin e përgjithshëm do të kushtohet vëmendje e veçantë, për: - mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh që mikroorganizmat në vetvete konsiderohen si sensibilizues të mundshëm, duke siguruar që pajisjet e duhura mbrojtëse personale të përfshihen si kusht përdorimi; - sigurimin nga prodhuesi për mirëmbajtjen e rreptë të kushteve mjedisore dhe analizën e kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit, në mënyrë që të sigurohet përmbushja e kufijve të ndotjes mikrobiologjike. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masat e mëposhtme për zbutjen e rrezikut: - një periudhë minimale kohore prej 2 ditësh duhet të mbahet ndërmjet aplikimit të PMB-ve që përmbajnë <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> ABTS-351 dhe vjeljes së kulturave bujqësore të përdorura për konsum të freskët, përveç rasteve kur të dhënat e disponueshme të mbetjeve të matura ose të vlerësuara tregojnë nivelet e <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> ABTS-351 nën 105 CFU/gr, siç rekomandohet nga EFSA. Aplikanti duhet të paraqesë informacion shtesë, në lidhje me të dhënat në të paktën një kulturë të ngrënëshme përfaqësuese (d.m.th. në lakër dhe domate), në



						lidhje me rënien e densitetit të sporeve të qëndrueshme të <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. kurstaki ABTS-351 në pjesët e ngrënshme të bimëve që nga koha e aplikimit të një PMB-je që përmban këtë substancë aktive deri në kohën e vjeljes ose derisa nivelet e gjetura të jenë nën 105 CFU/gr, duke përfshirë të dhënat e qëndrueshmërisë së ruajtjes së mikroorganizmave midis marrjes së mostrave dhe analizës së numërimit të sporeve.
5.	<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>israelensis</i> shtami AM65-52 Koleksioni i kulturës nr. ATCC 1276	n.a.	Jo papastërti relevante.	1 korrik 2023	30 qershor 2038	Në vlerësimin e përgjithshëm do të kushtohet vëmendje e veçantë, për: - mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh që mikroorganizmat në vetvete konsiderohen si sensibilizues të mundshëm; - sigurimin nga prodhuesi për mirëmbajtjen e rreptë të kushteve mjedisore dhe analizën e kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit, në mënyrë që të sigurohet përmbushja e kufijve të ndotjes mikrobiologjike; - mbrojtjen e pjalmbuesve të egër dhe e organizmave ujorë (p.sh. jovetëbrorët ujorë nga Dipteret në veçanti) në rast të përdorimit në fushë të hapur. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa specifike për zbutjen e rrezikut, kur është e nevojshme, të tilla si: - pajisjet adekuate mbrojtëse personale për operatorët që përdorin PMB që përmbajnë <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. shtami <i>israelensis</i> AM65-52; - në rast të autorizimit të përdorimit në kulturat



						bujqësore, duhet të mbahet një periudhë minimale prej 3 ditësh ndërmjet aplikimit të PMB-ve që përmbajnë <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>israelensis</i> AM65-52 dhe vjeljes së kulturave bujqësore të përdorura për konsum të freskët, përveç nëse të dhënat e disponueshme të mbetjeve të matura ose të vlerësuar tregojnë nivelet e <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>israelensis</i> AM65-52 nën 105 CFU/gr në vjelje.
6.	<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>aizawai</i> GC-91	n.a.	Jo papastërti relevante.	1 korrik 2023	30 qershor 2038	Në vlerësimin e përgjithshëm do të kushtohet vëmendje e veçantë, për: - mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh që mikroorganizmat në vetvete konsiderohen si sensibilizues të mundshëm; - sigurimin nga prodhuesi për mirëmbajtjen e rreptë të kushteve mjedisore dhe analizën e kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit, në mënyrë që të sigurohet përmbushja e kufijve të ndotjes mikrobiologjike; - mbrojtjen e pjalmbuesve të egër (veçanërisht larvat e bletëve dhe bletët e egra). Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa specifike për zbutjen e rrezikut, kur është e nevojshme. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masat e mëposhtme për zbutjen e rrezikut: - një periudhë minimale kohore prej 2 ditësh duhet të mbahet ndërmjet aplikimit të PMB-ve që përmbajnë <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>aizawai</i> GC-91 dhe vjeljes së kulturave bujqësore të përdorura për konsum të freskët, përveç nëse të dhënat e disponueshme të



						mbetjeve të matura ose të vlerësuara tregojnë nivelet e <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>aizawai</i> GC-91 nën 105 CFU/g në vjelje. Aplikanti duhet të paraqesë informacion shtesë në lidhje me të dhënat në të paktën një kulturë të ngrënëshme përfaqësuese (d.m.th. frutat farore, rrushi dhe domatet), në lidhje me rënien e densitetit të sporeve të qëndrueshme të <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>aizawai</i> GC-91 në pjesët e ngrënëshme të bimëve që nga koha e aplikimit të një PMB-je që përmban këtë substancë aktive deri në kohën e vjeljes ose derisa nivelet e gjetura të jenë nën 105 CFU/gr, duke përfshirë të dhënat e qëndrueshmërisë së ruajtjes së mikroorganizmave midis marrjes së mostrave dhe analizës së numërimit të sporeve.
7.	<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>aizawai</i> shtami ABTS-1857	n.a.	Jo papastërti relevante.	1 korrik 2023	30 qershor 2038	Në vlerësimin e përgjithshëm do të kushtohet vëmendje e veçantë, për: - mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh që mikroorganizmat në vetvete konsiderohen si sensibilizues të mundshëm; - sigurimin nga prodhuesi për mirëmbajtjen e rreptë të kushteve mjedisore dhe analizën e kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit, në mënyrë që të sigurohet përmbushja e kufijve të ndotjes mikrobiologjike; - mbrojtjen e pjalmbuesve të egër (veçanërisht larvat e bletëve dhe bletët e egra). Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa specifike për zbutjen e rrezikut, kur është e nevojshme.



						Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masat e mëposhtme për zbutjen e rrezikut: - një periudhë minimale kohore prej 2 ditësh duhet të mbahet ndërmjet aplikimit të PMB-ve që përmbajnë <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>Aizawai</i> shtami ABTS-1857 dhe vjeljes së kulturave bujqësore të përdorura për konsum të freskët, përveç nëse të dhënat e disponueshme të mbetjeve të matura ose të vlerësuar tregojnë nivelet e <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>Aizawai</i> soji ABTS-1857 nën 105 CFU/gr në vjelje. Aplikanti duhet të paraqesë informacion shtesë, në lidhje me të dhënat në të paktën një kulturë të ngrënshme përfaqësuese (d.m.th. specia dhe domate), në lidhje me rënien e densitetit të sporeve të qëndrueshme të <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>Aizawai</i> shtami ABTS-1857 në pjesët e ngrënshme të bimëve që nga koha e aplikimit të një PMB-je që përmban këtë substancë aktive deri në kohën e vjeljes ose derisa nivelet e gjetura të jenë nën 105 CFU/gr, duke përfshirë të dhënat e qëndrueshmërisë së ruajtjes së mikroorganizmave midis marrjes së mostrave dhe analizës së numërimit të sporeve.
8.	<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> SA-11	n.a.	Jo papastërti relevante.	1 korrik 2023	30 qershor 2038	Në vlerësimin e përgjithshëm do të kushtohet vëmendje e veçantë, për: - mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh që mikroorganizmat në vetvete konsiderohen si sensibilizues të mundshëm;



						- sigurimin nga prodhuesi për mirëmbajtjen e rreptë të kushteve mjedisore dhe analizën e kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit, në mënyrë që të sigurohet përmbushja e kufijve të ndotjes mikrobiologjike. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masat e mëposhtme për zbutjen e rrezikut: - një periudhë minimale kohore prej 2 ditësh duhet të mbahet ndërmjet aplikimit të PMB-ve që përmbajnë <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. kurstaki SA-11 dhe vjeljes së kulturave bujqësore të përdorura për konsum të freskët, përveç nëse të dhënat e disponueshme të mbetjeve të matura ose të vlerësuara tregojnë nivelet e <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. kurstaki SA-11 nën 105 CFU/gr, siç rekomandohet nga EFSA. Aplikanti duhet të paraqesë informacion shtesë, në lidhje me të dhënat në të paktën një kulturë të ngrënshme përfaqësuese (d.m.th. në frutat farore dhe domatet), në lidhje me rënien e densitetit të sporeve të qëndrueshme të <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. kurstaki SA-11 në pjesët e ngrënshme të bimëve nga koha e aplikimit të një PMB-je që përmban këtë substancë aktive deri në kohën e vjeljes ose derisa nivelet e gjetura të jenë nën 105 CFU/gr, duke përfshirë të dhënat e qëndrueshmërisë së ruajtjes së mikroorganizmave midis marrjes së mostrave dhe analizës së numërimit të sporeve.
--	--	--	--	--	--	---



2.2 LËNDËN VEPRUESE ME RISK TË ULËT SI MË POSHTË:

Nr.	Emri i zakonshëm dhe numri i identifikimit	Emërtimi IUPAC	Pastërtia	Data e miratimit	Data e përfundimit	Dispozita specifike
1.	Quartz sand- Rera kuarcit (nuk ka emër të zakonshëm ISO) (1) 7631-86-9 (CAS) (2) 14808-60-7 (CAS) 855 (CIPAC) <i>[Deri më tani ata janë treguar si:</i> CAS No: 14808-60-7 CIPAC No: n.a]	1. Silicon dioxide 2. Quartz	915 g/kg. Silici kristalor i papastër me një diametër grimcash $\leq 10 \mu\text{m}$ është një shqetësim toksikologjik dhe nuk duhet të kalojë një nivel prej 0,1 % të grimcave në materialin teknik.	1 shtator 2023	31 gusht 2038	Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.

3. ZGJATEN AFATET E REGJISTRIMIT PËR LËNDËT VEPRUESE SI MË POSHTË:

- Deri më 31 janar 2024:

1. Penflufen

Gjithsej: 1 (një) lëndë vepruese.

- Deri më 30 qershor 2024:

1. Pyridalyl

Gjithsej: 1 (një) lëndë vepruese.

- Deri më 31 gusht 2024:

1. Bacillus pumilus QST 2808

Gjithsej: 1 (një) lëndë vepruese.

- Deri më 15 nëntor 2024:

1. S-metolachlor

2. Ethephon

3. Captan

4. Benthiavalicarb

Gjithsej: 4 (katër) lëndë vepruese.

- Deri më 15 dhjetor 2024:

1. Aluminium ammonium sulphate

2. Aluminium silicate

3. Fat distillation residues/mbetjet e distilimit të yndyrës

4. Fatty acids C7 to C20/acidet yndyrore C7 deri në C20

5. Plant oils/rape seed oil/vajra bimore/vaj farash bërsi rrushi

Gjithsej: 5 (pesë) lëndë vepruese.

- Deri më 15 shkurt 2025:

1. Phenmedipham

2. Milbemectin

3. Folpet

4. Formetanate

5. Dimethomorph

6. Metribuzin

Gjithsej: 6 (gjashtë) lëndë vepruese.

- Deri më 31 mars 2025:

1. Halosulfuron-methyl

Gjithsej: 1 (një) lëndë vepruese.

- Deri më 15 prill 2025:

1. Hydrolysed proteins/Proteinat e hidrolizuara

Gjithsej: 1 (një) lëndë vepruese.

**- Deri më 15 qershor 2025:**

1. Propamocarb
2. Pirimiphos-methyl
3. Fluoxastrobin

Gjithsej: 3 (tre) lëndë vepruese.

- Deri më 15 korrik 2025:

1. Gibberellic acid
2. Gibberellin

Gjithsej: 2 (dy) lëndë vepruese.

- Deri më 15 gusht 2025:

1. Prothioconazole

Gjithsej: 1 (një) lëndë vepruese.

- Deri më 31 tetor 2025:

1. Trichoderma asperellum strain T34
2. Cyflumetofen
3. Trichoderma atroviride strain I-1237
4. Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus
5. Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus

Gjithsej: 5 (pesë) lëndë vepruese.

- Deri më 30 nëntor 2025:

1. Metam

Gjithsej: 1 (një) lëndë vepruese.

- Deri më 31 dhjetor 2025:

1. Ametoctradin
2. Mandipropamid

Gjithsej: 2 (dy) lëndë vepruese.

- Deri më 31 janar 2026:

1. Extract from tea tree/ekstrakt nga pema e çajit
2. Plant oils/spear mint oil/vajra bimore/vaj menteje shtize
3. Plant oils/clove oil/vajra bimore/vaj karafili

Gjithsej: 3 (tre) lëndë vepruese.

- Deri më 28 shkurt 2026:

1. Maltodextrin

Gjithsej: 1 (një) lëndë vepruese.

- Deri më 15 mars 2026:

1. Indolylbutyric acid
2. Flurochloridone

Gjithsej: 2 (dy) lëndë vepruese.

- Deri më 15 prill 2026:

1. Boscalid

Gjithsej: 1 (një) lëndë vepruese.

- Deri më 15 maj 2026:

1. Penoxsulam
2. Proquinazid

Gjithsej: 2 (dy) lëndë vepruese.

- Deri më 15 qershor 2026:

1. Pyrethrinat

Gjithsej: 1 (një) lëndë vepruese.

- Deri më 15 gusht 2026:

1. Cymoxanil



2. Tebuconazole

Gjithsej: 2 (dy) lëndë vepruese.

- **Deri më 31 gusht 2026:**

1. Fluopicolide

2. Cycloxydim

3. Hymexazol

4. Clethodim

5. Dazomet

6. Metaldehyde

7. Fenazaquin

8. Diclofop

9. Paclobutrazol

Gjithsej: 9 (nëntë) lëndë vepruese.

- **Deri më 30 shtator 2026:**

1. Metalaxyl

Gjithsej: 1 (një) lëndë vepruese.

- **Deri më 31 tetor 2026:**

1. Beflubutamid

2. Aclonifen

3. Metazachlor

Gjithsej: 3 (tri) lëndë vepruese.

- **Deri më 30 nëntor 2026:**

1. Acetic acid

2. Ethylene

3. Calcium carbide

4. Iron sulphate/Sulfat hekuri

5. Urea

6. Aluminium phosphide

7. Magnesium phosphide

8. Dodemorph

9. 2,5-Dichlorobenzoic acid methylester

10. Metamitron

11. Sulcotrione

12. Flonicamid (IKI-220)

Gjithsej: 12 (dymbëdhjetë) lëndë vepruese.

Totali: 71 (shtatëdhjetë e një) lëndë vepruese.

4. HIQEN LËNDËT VEPRUESE SI MË POSHTË:

1. Ipconazole

Të kryhet çregjistrimi i produkteve të mbrojtjes së bimëve që përmbajnë Ipconazole brenda datës 31 gusht 2023.

Heqja nga tregu i produkteve të mbrojtjes së bimëve që përmbajnë Ipconazole të përfundojë brenda datës 29 shkurt 2024.

2. Dimoxystrobin

Lënda vepruese Dimoxystrobin nuk është e rinovuar.

Të kryhet çregjistrimi i produkteve të mbrojtjes së bimëve që përmbajnë Dimoxystrobin brenda datës 31 janar 2024.

Heqja nga tregu i produkteve të mbrojtjes së bimëve që përmbajnë Dimoxystrobin të përfundojë brenda datës 31 korrik 2024.

Gjithsej: 2 (dy) lëndë vepruese.



URDHËR
Nr. 456, datë 2.8.2023

PËR IMPORTIN E KAFSHËVE TË
LLOJIT DERRA, PRODUKTEVE,
NËNPRODUKTEVE TË TYRE,
MATERIALIT BIOLOGJIK,
EMBRIONEVE, MISHIT DHE
NËNPRODUKTEVE TË TYRE
NGA KROACIA

Mbështetur në nenin 102, pika 4, të Kushtetutës; të neneve 42 dhe 43 të ligjit nr. 10465, datë 29.9.2011, “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar,

URDHËROJ:

1. Lejimin e importit dhe tranzitimit për në territorin e Republikës së Shqipërisë të të gjitha kafshëve të gjalla të llojit derra të butë dhe të egër, produkteve të tyre, materialit biologjik dhe embrioneve e kafshëve të gjalla të llojit derra, mishin e freskët dhe nënprodukteve të tyre të kafshëve të llojit derra, vetëm nëse plotësohen kushtet e mëposhtme nga pika 1.1 deri në pikën 1.8, përkatësisht nga shteti i Kroacisë:

Ndarja administrative e nivelit të parë	Ndarja administrative e nivelit të dytë	Ndarja administrative e nivelit të tretë
Vukovarsko-Srijemska*		
Brodsko-Posavska	Sikirevci*	
Brodsko-Posavska	Gundinci*	

1.1. Për kafshët e gjalla të llojit derra të butë dhe të egër, **certifikata shëndetësore veterinarë duhet të vërtetojë që kafshët:**

a) nuk kanë shfaqur shenja klinike të murtajes afrikane të derrave ditën e dërgesës;

b) janë mbajtur që nga lindja ose për tre muajt e fundit në një kompartament (zonë) pa prezencë të murtajes afrikane të derrave; ose

c) janë mbajtur në një stacion karantine, të izoluar për 30 ditë përpara dërgesës dhe i janë nënshtruar një testi virologjik dhe një testi serologjik të kryer të paktën 21 ditë pas hyrjes në stacionin e karantinës, me rezultate negative.

1.2. Për materialin biologjik të kafshëve të llojit derra të butë ose të egër, **certifikata shëndetësore**

veterinare duhet të vërtetojë që kafshët donatore të materialit biologjik:

a) janë mbajtur që nga lindja ose për të paktën tre muajt para grumbullimit në një stacion, në të cilin janë mbikëqyrur në përputhje me nenet 15.1.28 deri në 15.1.30 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe vërteton se asnjë rast i murtajes afrikane të derrave nuk ka ndodhur në tre vjetët e fundit. Kjo periudhë reduktohet në 12 muajt vetëm nëse survejanca demonstroi dokumenton se nuk ka dëshmi të përfshirjes së rriqnave në epidemiologjinë e infeksionit;

b) nuk kanë shfaqur shenja klinike të murtajes afrikane të derrave në ditën e mbledhjes së materialit biologjik;

c) sperma është mbledhur, përpunuar dhe ruajtur në përputhje me kapitujt 4.6 dhe 4.7 të Kodit Terrestrial të OIE-së;

ç) sperma e përdorur për fekundimin e ovociteve është në përputhje me kushtet e përcaktuara në nenin 15.1.10 ose në nenin 15.1.11 të Kodit Terrestrial të OIE-së, sipas rastit.

1.3. Për embrionet e derivuara *in vivo* të derrave të butë, **certifikata shëndetësore veterinarë duhet të vërtetojë që kafshët donatore të embrioneve:**

a) janë mbajtur që nga lindja ose për të paktën tre muajt para grumbullimit të embrioneve në një stacion, në të cilin janë mbikëqyrur në përputhje me nenet 15.1.28 deri në 15.1.30 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe vërteton se asnjë rast i murtajes afrikane të derrave, nuk ka ndodhur në tre vjetët e fundit. Kjo periudhë reduktohet në 12 muajt vetëm nëse survejanca demonstroi dokumenton se nuk ka dëshmi të përfshirjes së rriqnave në epidemiologjinë e infeksionit;

b) nuk kanë shfaqur shenjë klinike të murtajes afrikane të derrave në ditën e mbledhjes së embrioneve;

c) i janë nënshtruar një testi serologjik të kryer të paktën 21 ditë pas grumbullimit, me rezultate negative;

ç) embrionet janë mbledhur, përpunuar dhe ruajtur në përputhje me dispozitat përkatëse të kapitullit 4.8 dhe 4.10 të Kodit Terrestrial të OIE-së.

1.4. Për mishin e kafshëve të llojit derra të butë ose të egër, **certifikata shëndetësore veterinarë duhet të vërtetojë që:**

a) e gjithë ngarkesa e mishit të freskët vjen nga kafshët e llojit derra që kanë origjinën nga tufat në të



cilat janë mbikëqyrur në përputhje me nenet 15.1.28 deri në 15.1.30 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe vërteton se asnjë rast i murtajes afrikane të derrave nuk ka ndodhur në tre vjetët e fundit. Kjo periudhë reduktohet në 12 muaj vetëm nëse survejanca demonstron dokumenton se nuk ka dëshmi të përfshirjes së rriqnave në epidemiologjinë e infeksionit;

b) janë testuar mostra nga një numër statistikisht përfaqësues i kafshëve për sëmundjen e murtajes afrikane të derrave, me rezultate negative;

c) e gjithë ngarkesa e mishit të freskët vjen nga kafshë të cilat janë therur në një thertore të miratuar dhe i janë nënshtruar kontrollit me rezultate të favorshme të inspektimit para dhe pas vdekjes në përputhje me kapitullin 6.3 të Kodit Terrestrial të OIE-së;

ç) janë marrë masat e nevojshme pas therjes për të shmangur kontaktin e mishit të freskët me çdo burim të virusit të murtajes afrikane të derrave.

1.5. Për mishin e freskët të kafshëve të egra të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) janë vrarë në një vend ose zonë të lirë nga murtaja afrikane e derrave në përputhje me pikën 1 ose pikën 2 të nenit 15.1.4 të Kodit Terrestrial të OIE-së;

b) i janë nënshtruar me rezultate të favorshme një inspektimi pas vdekjes në përputhje me kapitullin 6.3 të Kodit Terrestrial të OIE-së në një objekt ekzaminimi të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti.

1.6. Për produktet e mishit të kafshëve të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) mishi i freskët plotëson kushtet përkatëse në nenet 15.1.14, 15.1.15 dhe 15.1.16 të Kodit Terrestrial të OIE-së;

b) mishi është përpunuar në një objekt të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti dhe ka plotësuar kushtet përkatëse të neneve 15.1.14, 15.1.15 dhe 15.1.16 të Kodit Terrestrial të OIE-së; ose

c) janë përpunuar në një objekt të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti, në mënyrë që të sigurohet shkatërrimi i virusit të murtajes afrikane të derrave në përputhje me nenin 15.1.23 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë marrë masat e nevojshme pas përpunimit të mishit për të

shmangur kontaktin e produktit me çdo burim të virusit të murtajes afrikane të derrave.

1.7. Për qimet (e pjesës së shpinës) e kafshëve të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) e kanë origjinën nga derrat e egër ose të butë të kapur në një vend, zonë ose ndarje pa prezencë të murtajes afrikane të derrave dhe janë përpunuar në një objekt të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti; ose

b) janë përpunuar në një objekt të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti ku është siguruar shkatërrimi i virusit të murtajes afrikane të derrave në përputhje me një nga proceset e listuara në nenin 15.1.26 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë marrë masat e nevojshme pas përpunimit për të shmangur kontaktin me produktin me çdo burim të virusit të murtajes afrikane të derrave.

1.8. Për lëkurët e kafshëve të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) kanë ardhur nga derra të një vendi ose zone të lirë nga sëmundja e murtajes afrikane të derrave, në përputhje me pikën 1 ose me pikën 2 të nenit 15.1.4 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë përpunuar në një objekt të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti; ose

b) origjinojnë nga derra të egër ose të butë të kapur në një vend, zonë ose kompartament pa prezencë të sëmundjes së murtajes afrikane të derrave dhe janë përpunuar në një objekt të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti; ose

c) janë përpunuar në një objekt të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti, ku është siguruar shkatërrimi i virusit të murtajes afrikane të derrave në përputhje me një nga procedurat e përmendura në nenin 15.1.25 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë marrë masat paraprake të nevojshme pas përpunimit për të shmangur kontaktin e produktit me çdo burim të virusit të murtajes afrikane të derrave.

2. Urdhri nr. 415, datë 11.7.2023, “Për importin e kafshëve të llojit derra, produkteve, nënprodukteve të tyre, materialit biologjik, embrioneve, mishit dhe nënprodukteve të tyre nga Kroacia”, shfuqizohet.

3. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit të informojë rregullisht brenda 24 orëve Autoritetin Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, Drejtorinë e Përgjithshme të Zhvillimit në Fushën e Sigurisë



Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit për çdo ngarkesë të kafshëve të llojit derra, produkteve dhe nënprodukteve të tyre, materialit biologjik, embrioneve, mishit dhe nënprodukteve të tyre.

4. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohen Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I BUJQËSISË DHE
ZHVILLIMIT RURAL
Frida Krifca

URDHËR
Nr. 457, datë 2.8.2023

**PËR IMPORTIN E KAFSHËVE TË
LLOJIT DERRA, PRODUKTEVE,
NËNPRODUKTEVE TË TYRE,
MATERIALIT BIOLOGJIK,
EMBRIONEVE, MISHIT DHE
NËNPRODUKTEVE TË TYRE NGA
BOSNJË-HERCEGOVINA**

Mbështetur në nenin 102, pika 4, të Kushtetutës: të neneve 42 dhe 43 të ligjit nr. 10465, datë 29.9.2011, “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar,

URDHËROJ:

1. Lejimin e importit dhe tranzitimit për në territorin e Republikës së Shqipërisë të të gjitha kafshëve të gjalla të llojit derra të butë dhe të egër, produkteve të tyre, materialit biologjik dhe embrioneve e kafshëve të gjalla të llojit derra, mishin e freskët dhe nënprodukteve të tyre të kafshëve të llojit derra, vetëm nëse plotësohen kushtet e mëposhtme nga pika 1.1 deri në pikën 1.8, përkatësisht nga shteti i Bosnjë-Hercegovinës:

Ndarja administrative e nivelit të parë	Ndarja administrative e nivelit të dytë	Ndarja administrative e nivelit të tretë
Republika Srpska	Bijeljina	Bijeljina*
Republika Srpska	Bijeljina	Lopare*

Federacija Bosna i Hercegovina	Posavina	Orašje*
Republika Srpska	Bijeljina	Ugljevik*
Republika Srpska	Doboj	Samac*
Republika Srpska	Doboj	Donji Žabar*
Brčko	Brčko	Brčko*

1.1. Për kafshët e gjalla të llojit derra të butë dhe të egër, **certifikata shëndetësore veterinarë duhet të vërtetojë që kafshët:**

a) nuk kanë shfaqur shenja klinike të murtajës afrikane të derrave ditën e dërgesës;

b) janë mbajtur që nga lindja ose për tre muajt e fundit në një kompartament (zonë) pa prezencë të murtajës afrikane të derrave; ose

c) janë mbajtur në një stacion karantine, të izoluar për 30 ditë përpara dërgesës dhe i janë nënshtruar një testi virologjik dhe një testi serologjik të kryer të paktën 21 ditë pas hyrjes në stacionin e karantinës, me rezultate negative.

1.2. Për materialin biologjik të kafshëve të llojit derra të butë ose të egër, **certifikata shëndetësore veterinarë duhet të vërtetojë që kafshët donatore të materialit biologjik:**

a) janë mbajtur që nga lindja ose për të paktën tre muaj para grumbullimit në një stacion, në të cilin janë mbikëqyrur në përputhje me nenet 15.1.28 deri në 15.1.30 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe vërteton se asnjë rast i murtajës afrikane të derrave, nuk ka ndodhur në tre vjetët e fundit. Kjo periudhë reduktohet në 12 muaj vetëm nëse survejanca demonstron dokumenton se nuk ka dëshmi të përfshirjes së rriqnave në epidemiologjinë e infeksionit;

b) nuk kanë shfaqur shenja klinike të murtajës afrikane të derrave në ditën e mbledhjes së materialit biologjik;

c) sperma është mbledhur, përpunuar dhe ruajtur në përputhje me kapitujt 4.6 dhe 4.7 të Kodit Terrestrial të OIE-së;

ç) sperma e përdorur për fekondimin e ovociteve është në përputhje me kushtet e përcaktuara në nenin 15.1.10 ose nenin 15.1.11, të Kodit Terrestrial të OIE-së, sipas rastit.

1.3. Për embrionet e derivuara *in vivo* të derrave të butë, **certifikata shëndetësore veterinarë duhet të vërtetojë që kafshët donatore të embrioneve:**

a) janë mbajtur që nga lindja ose për të paktën tre muaj para grumbullimit të embrioneve në një stacion, në të cilin janë mbikëqyrur në përputhje me



nenet 15.1.28 deri në 15.1.30 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe vërteton se asnjë rast i murtajës afrikane të derrave, nuk ka ndodhur në tre vjetët e fundit. Kjo periudhë reduktohet në 12 muaj vetëm nëse survejanca demonstroi dokumenton se nuk ka dëshmi të përfshirjes së rriqnave në epidemiologjinë e infeksionit;

b) nuk kanë shfaqur shenjë klinike të murtajës afrikane të derrave në ditën e mbledhjes së embrioneve;

c) i janë nënshtruar një testi serologjik të kryer të paktën 21 ditë pas grumbullimit, me rezultate negative;

ç) embrionet janë mbledhur, përpunuar dhe ruajtur në përputhje me dispozitat përkatëse të kapitullit 4.8 dhe 4.10, të Kodit Terrestrial të OIE-së.

1.4. Për mishin e kafshëve të llojit derra të butë ose të egër, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) e gjithë ngarkesa e mishit të freskët vjen nga kafshët e llojit derra që kanë origjinën nga tufat në të cilat janë mbikëqyrur në përputhje me nenet 15.1.28 deri në 15.1.30, të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe vërteton se asnjë rast i murtajës afrikane të derrave nuk ka ndodhur në tre vjetët e fundit. Kjo periudhë reduktohet në 12 muaj vetëm nëse survejanca demonstroi dokumenton se nuk ka dëshmi të përfshirjes së rriqnave në epidemiologjinë e infeksionit;

b) janë testuar mostra nga një numër statistikisht përfaqësues i kafshëve për sëmundjen e murtajës afrikane të derrave, me rezultate negative;

c) e gjithë ngarkesa e mishit të freskët vjen nga kafshë të cilat janë therur në një thertore të miratuar dhe i janë nënshtruar kontrollit me rezultate të favorshme të inspektimit para dhe pas vdekjes në përputhje me kapitullin 6.3, të Kodit Terrestrial të OIE-së;

ç) janë marrë masat e nevojshme pas therjes për të shmangur kontaktin e mishit të freskët me çdo burim të virusit të murtajës afrikane të derrave.

1.5. Për mishin e freskët të kafshëve të egra të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) janë vrarë në një vend ose zonë të lirë nga murtaja afrikane e derrave në përputhje me pikën 1 ose pikën 2 të nenit 15.1.4, të Kodit Terrestrial të OIE-së;

b) i janë nënshtruar me rezultate të favorshme një inspektimi pas vdekjes në përputhje me kapitullin 6.3, të Kodit Terrestrial të OIE-së në një objekt ekzaminimi të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti.

1.6. Për produktet e mishit të kafshëve të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) mishi i freskët plotëson kushtet përkatëse në nenet 15.1.14, 15.1.15. dhe 15.1.16, të Kodit Terrestrial të OIE-së;

b) mishi është përpunuar në një objekt të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti dhe ka plotësuar kushtet përkatëse të neneve 15.1.14, 15.1.15 dhe 15.1.16, të Kodit Terrestrial të OIE-së; ose

c) janë përpunuar në një objekt të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti, në mënyrë që të sigurohet shkatërrimi i virusit të murtajës afrikane të derrave në përputhje me nenin 15.1.23, të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë marrë masat e nevojshme pas përpunimit të mishit për të shmangur kontaktin e produktit me çdo burim të virusit të murtajës afrikane të derrave.

1.7. Për qimet (e pjesës së shpinës) e kafshëve të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) e kanë origjinën nga derrat e egër ose të butë të kapur në një vend, zonë ose ndarje pa prezencë të murtajës afrikane të derrave dhe janë përpunuar në një objekt të miratuar nga autoriteti Veterinar për qëllime eksporti; ose

b) janë përpunuar në një objekt të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti ku është siguruar shkatërrimi i virusit të murtajës afrikane të derrave në përputhje me një nga proceset e listuara në nenin 15.1.26 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë marrë masat e nevojshme pas përpunimit për të shmangur kontaktin me produktin me çdo burim të virusit të murtajës afrikane të derrave.

1.8. Për lëkurët e kafshëve të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) kanë ardhur nga derra të një vendi ose zone të lirë nga sëmundja e murtajës afrikane të derrave, në përputhje me pikën 1 ose me pikën 2 të nenit 15.1.4, të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë përpunuar në një objekt të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti; ose



b) origjinojnë nga derra të egër ose të butë të kapur në një vend, zonë ose kompartament pa prezencë të sëmundjes së murtajës afrikane të derrave dhe janë përpunuar në një objekt të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti; ose

c) janë përpunuar në një objekt të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti, ku është siguruar shkatërrimi i virusit të murtajës afrikane të derrave në përputhje me një nga procedurat e përmendura në nenin 15.1.25, të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë marrë masat paraprake të nevojshme pas përpunimit për të shmangur kontaktin e produktit me çdo burim të virusit të murtajës afrikane të derrave.

2. Urdhri nr. 414, datë 11.7.2023, “Për importin e kafshëve të llojit derra, produkteve, nënprodukteve të tyre, materialit biologjik, embrioneve, mishit dhe nënprodukteve të tyre nga Bosnje Hercegovina”, shfuqizohet.

3. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit të informojë rregullisht brenda 24 orëve Autoritetin Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, Drejtorinë e Përgjithshme të Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit për çdo ngarkesë të kafshëve të llojit derra, produkteve dhe nënprodukteve të tyre, materialit biologjik, embrioneve, mishit dhe nënprodukteve të tyre.

4. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohen Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I BUJQËSISË DHE
ZHVILLIMIT RURAL
Frida Krifca

URDHËR

Nr. 458, datë 2.8.2023

PËR IMPORTIN E KAFSHËVE TË LLOJIT DERRA, PRODUKTEVE, NËNPRODUKTEVE TË TYRE, MATERIALIT BIOLOGJIK, EMBRIONEVE, MISHIT DHE NËNPRODUKTEVE TË TYRE NGA SERBIA

Mbështetur në nenin 102, pika 4, të Kushtetutës; të neneve 42 dhe 43 të ligjit nr. 10465, datë 29.9.2011, “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar,

URDHËROJ:

1. Lejimin e importit dhe tranzitimit për në territorin e Republikës së Shqipërisë të të gjitha kafshëve të gjalla të llojit derra të butë dhe të egër, produkteve të tyre, materialit biologjik dhe embrioneve e kafshëve të gjalla të llojit derra, mishin e freskët dhe nënprodukteve të tyre të kafshëve të llojit derra, vetëm nëse plotësohen kushtet e mëposhtme nga pika 1.1 deri në pikën 1.8, përkatësisht nga shteti i Serbisë:

Ndarja administrative e nivelit të parë	Ndarja administrative e nivelit të dytë	Ndarja administrative e nivelit të tretë
Borski		
Braničevski		
Jablanički		
Južnobanatski		
Nišavski		
Pčinjski		
Pirotski		
Podunavski		
Pomoravski		
Zaječarski		
Grad Beograd		
Srednje-Banatski		
Moravički		
Šumadijski		

1.1. Për kafshët e gjalla të llojit derra të butë dhe të egër, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetojë që kafshët:**

a) nuk kanë shfaqur shenja klinike të murtajës afrikane të derrave ditën e dërgesës;

b) janë mbajtur që nga lindja ose për tre muajt e fundit në një kompartament (zonë) pa prezencë të murtajës afrikane të derrave; ose



c) janë mbajtur në një stacion karantine, të izoluar për 30 ditë përpara dërgesës dhe i janë nënshtruar një testi virologjik dhe një testi serologjik të kryer të paktën 21 ditë pas hyrjes në stacionin e karantinës, me rezultate negative.

1.2. Për materialin biologjik të kafshëve të llojit derra të butë ose të egër, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetojë që kafshët donatore të materialit biologjik:**

a) janë mbajtur që nga lindja ose për të paktën tre muaj para grumbullimit në një stacion, në të cilin janë mbikëqyrur në përputhje me nenet 15.1.28 deri në 15.1.30 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe vërteton se asnjë rast i murtajes afrikane të derrave, nuk ka ndodhur në tre vjetët e fundit. Kjo periudhë reduktohet në 12 muaj vetëm nëse survejanca demonstron dokumenton se nuk ka dëshmi të përfshirjes së rriqnave në epidemiologjinë e infeksionit;

b) nuk kanë shfaqur shenja klinike të murtajes afrikane të derrave në ditën e mbledhjes së materialit biologjik;

c) sperma është mbledhur, përpunuar dhe ruajtur në përputhje me kapitujt 4.6 dhe 4.7 të Kodit Terrestrial të OIE-së;

ç) sperma e përdorur për fekondimin e ovociteve është në përputhje me kushtet e përcaktuara në nenin 15.1.10 ose nenin 15.1.11, të Kodit Terrestrial të OIE-së, sipas rastit.

1.3. Për embrionet e derivuara *in vivo* të derrave të butë, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetojë që kafshët donatore të embrioneve:**

a) janë mbajtur që nga lindja ose për të paktën tre muaj para grumbullimit të embrioneve në një stacion, në të cilën janë mbikëqyrur në përputhje me nenet 15.1.28 deri në 15.1.30, të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe vërteton se asnjë rast i murtajes afrikane të derrave, nuk ka ndodhur në tre vjetët e fundit. Kjo periudhë reduktohet në 12 muaj vetëm nëse survejanca demonstron dokumenton se nuk ka dëshmi të përfshirjes së rriqnave në epidemiologjinë e infeksionit;

b) nuk kanë shfaqur shenjë klinike të murtajes afrikane të derrave në ditën e mbledhjes së embrioneve;

c) i janë nënshtruar një testi serologjik të kryer të paktën 21 ditë pas grumbullimit, me rezultate negative;

ç) embrionet janë mbledhur, përpunuar dhe ruajtur në përputhje me dispozitat përkatëse të kapitullit 4.8 dhe 4.10 të Kodit Terrestrial të OIE-së.

1.4. Për mishin e kafshëve të llojit derra të butë ose të egër, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetojë që:**

a) e gjithë ngarkesa e mishit të freskët vjen nga kafshët e llojit derra që kanë origjinën nga tufat në të cilat janë mbikëqyrur në përputhje me nenet 15.1.28 deri në 15.1.30, të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe vërteton se asnjë rast i murtajes afrikane të derrave nuk ka ndodhur në tre vjetët e fundit.

Kjo periudhë reduktohet në 12 muaj vetëm nëse survejanca demonstron dokumenton se nuk ka dëshmi të përfshirjes së rriqnave në epidemiologjinë e infeksionit;

b) janë testuar mostra nga një numër statistikisht përfaqësues i kafshëve për sëmundjen e murtajes afrikane të derrave, me rezultate negative;

c) e gjithë ngarkesa e mishit të freskët vjen nga kafshët të cilat janë therur në një thertore të miratuar dhe i janë nënshtruar kontrollit me rezultate të favorshme të inspektimit para dhe pas vdekjes në përputhje me kapitullin 6.3, të Kodit Terrestrial të OIE-së;

ç) janë marrë masat e nevojshme pas therjes për të shmangur kontaktin e mishit të freskët me çdo burim të virusit të murtajes afrikane të derrave.

1.5. Për mishin e freskët të kafshëve të egra të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetojë që:**

a) janë vrarë në një vend ose zonë të lirë nga murtaja afrikane e derrave në përputhje me pikën 1 ose pikën 2, të nenit 15.1.4, të Kodit Terrestrial të OIE-së;

b) i janë nënshtruar me rezultate të favorshme një inspektimi pas vdekjes në përputhje me kapitullin 6.3, të Kodit Terrestrial të OIE-së në një objekt ekzaminimi të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti.

1.6. Për produktet e mishit të kafshëve të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetojë që:**

a) mishi i freskët plotëson kushtet përkatëse në nenet 15.1.14, 15.1.15. dhe 15.1.16 të Kodit Terrestrial të OIE-së;

b) mishi është përpunuar në një objekt të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti dhe ka plotësuar kushtet përkatëse të neneve



15.1.14, 15.1.15 dhe 15.1.16, të Kodit Terrestrial të OIE-së; ose

c) janë përpunuar në një objekt të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti, në mënyrë që të sigurohet shkatërrimi i virusit të murtajës afrikane të derrave në përputhje me nenin 15.1.23 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë marrë masat e nevojshme pas përpunimit të mishit për të shmangur kontaktin e produktit me çdo burim të virusit të murtajës afrikane të derrave.

1.7. Për qimet (e pjesës së shpinës) e kafshëve të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetojë që:**

a) e kanë origjinën nga derrat e egër ose të butë të kapur në një vend, zonë ose ndarje pa prezencë të murtajës afrikane të derrave dhe janë përpunuar në një objekt të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti; ose

b) janë përpunuar në një objekt të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti ku është siguar shkatërrimi i virusit të murtajës afrikane të derrave në përputhje me një nga proceset e listuara në nenin 15.1.26, të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë marrë masat e nevojshme pas përpunimit për të shmangur kontaktin me produktin me çdo burim të virusit të murtajës afrikane të derrave.

1.8. Për lëkurët e kafshëve të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetojë që:**

a) kanë ardhur nga derra të një vendi ose zone të lirë nga sëmundja e murtajës afrikane të derrave, në përputhje me pikën 1 ose me pikën 2, të nenit 15.1.4, të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë përpunuar në një objekt të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti; ose

b) origjinojnë nga derra të egër ose të butë të kapur në një vend, zonë ose kompartment pa prezencë të sëmundjes së murtajës afrikane të derrave dhe janë përpunuar në një objekt të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti; ose

c) janë përpunuar në një objekt të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti, ku është siguar shkatërrimi i virusit të murtajës afrikane të derrave në përputhje me një nga procedurat e përmendura në nenin 15.1.25, të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë marrë masat paraprake të nevojshme pas përpunimit për të shmangur kontaktin e produktit me çdo burim të virusit të murtajës afrikane të derrave.

2. Urdhri nr. 374, datë 22.6.2023, “Për importin e kafshëve të llojit derra, produkteve, nënprodukteve të tyre, materialit biologjik, embrioneve, mishit dhe nënprodukteve të tyre nga Serbia”, shfuqizohet.

3. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit të informojë rregullisht brenda 24 orëve Autoritetin Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, Drejtorinë e Përgjithshme të Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit për çdo ngarkesë të kafshëve të llojit derra, produkteve dhe nënprodukteve të tyre, materialit biologjik, embrioneve, mishit dhe nënprodukteve të tyre.

4. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohen Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I BUJQËSISË DHE
ZHVILLIMIT RURAL
Frida Krifca

URDHËR
Nr. 459, datë 2.8.2023

**PËR IMPORTIN E KAFSHËVE TË
LLOJIT DERRA, PRODUKTEVE,
NËNPRODUKTEVE TË TYRE,
MATERIALIT BIOLOGJIK,
EMBRIONEVE, MISHIT DHE
NËNPRODUKTEVE TË TYRE NGA
REPUBLIKA E ÇEKISË**

Mbështetur në nenin 102, pikëna 4 të Kushtetutës; në nenin 42 dhe 43, të ligjit nr. 10465, datë 29.9.2011, “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar,

URDHËROJ:

1. Lejimin e importit dhe tranzitimit për në territorin e Republikës së Shqipërisë të të gjitha kafshëve të gjalla të llojit derra të butë dhe të egër, produkteve të tyre, materialit biologjik dhe



embrioneve e kafshëve të gjalla të llojit derra, mishin e freskët dhe nënprodukteve të tyre të kafshëve të llojit derra, vetëm nëse plotësohen kushtet e mëposhtme nga pika 1.1 deri në pikën 1.8, përkatësisht nga shteti i Republikës së Çekisë:

Ndarja Administrative e Nivelit të Parë	Ndarja Administrative e Nivelit të Dytë	Ndarja Administrative e Nivelit të Tretë
Liberecký	Liberec	

1.1 Për kafshët e gjalla të llojit derra të butë dhe të egër, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që kafshët:**

a) nuk kanë shfaqur shenja klinike të murtajes afrikane të derrave ditën e dërgesës;

b) janë mbajtur që nga lindja ose për tri muajt e fundit në një kompartament (zonë) pa prezencë të murtajes afrikane të derrave; ose

c) janë mbajtur në një stacion karantine, të izoluar për 30 ditë përpara dërgesës dhe i janë nënshtruar një testi virologjik dhe një testi serologjik të kryer të paktën 21 ditë pas hyrjes në stacionin e karantinës, me rezultate negative.

1.2 Për materialin biologjik të kafshëve të llojit derra të butë ose të egër, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që kafshët donatore të materialit biologjik:**

a) janë mbajtur që nga lindja ose për të paktën tre muaj para grumbullimit në një stacion, në të cilin janë mbikëqyrur në përpunje me nenet 15.1.28 deri në 15.1.30, të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe vërtetohet se asnjë rast i murtajes afrikane të derrave nuk ka ndodhur në tre vitet e fundit. Kjo periudhë reduktohet në 12 muaj vetëm nëse survejanca demonstroi, dokumenton se nuk ka dëshmi të përfshirjes së rriqnave në epidemiologjinë e infeksionit;

b) nuk kanë shfaqur shenja klinike të murtajes afrikane të derrave në ditën e mbledhjes së materialit biologjik;

c) sperma është mbledhur, përpunuar dhe ruajtur në përpunje me kapitull 4.6 dhe 4.7 të Kodit Terrestrial të OIE-së;

ç) sperma e përdorur për fekondimin e ovociteve është në përpunje me kushtet e përcaktuara në nenin 15.1.10 ose nenin 15.1.11, të Kodit Terrestrial të OIE-së, sipas rastit.

1.3 Për embrionet e derivuara *in vivo* të derrave të butë, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që kafshët donatore të embrioneve:**

a) janë mbajtur që nga lindja ose për të paktën tre muaj para grumbullimit të embrioneve në një stacion, në të cilën janë mbikëqyrur në përpunje me nenet 15.1.28 deri në 15.1.30, të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe vërtetohet se asnjë rast i murtajes afrikane të derrave nuk ka ndodhur në tre vitet e fundit. Kjo periudhë reduktohet në 12 muaj vetëm nëse survejanca demonstroi, dokumenton se nuk ka dëshmi të përfshirjes së rriqnave në epidemiologjinë e infeksionit;

b) nuk kanë shfaqur shenja klinike të murtajes afrikane të derrave në ditën e mbledhjes së embrioneve;

c) i janë nënshtruar një testi serologjik të kryer të paktën 21 ditë pas grumbullimit, me rezultate negative;

ç) embrionet janë mbledhur, përpunuar dhe ruajtur në përpunje me dispozitat përkatëse të kapitullit 4.8 dhe 4.10, të Kodit Terrestrial të OIE-së.

1.4 Për mishin e kafshëve të llojit derra të butë ose të egër, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) e gjithë ngarkesa e mishit të freskët vjen nga kafshët e llojit derra që kanë origjinën nga tufat në të cilat janë mbikëqyrur në përpunje me nenet 15.1.28 deri në 15.1.30, të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe vërtetohet se asnjë rast i murtajes afrikane të derrave nuk ka ndodhur në tre vitet e fundit. Kjo periudhë reduktohet në 12 muaj vetëm nëse survejanca demonstroi, dokumenton se nuk ka dëshmi të përfshirjes së rriqnave në epidemiologjinë e infeksionit;

b) janë testuar mostra nga një numër statistikisht përfaqësues i kafshëve për sëmundjen e murtajes afrikane të derrave, me rezultate negative;

c) e gjithë ngarkesa e mishit të freskët vjen nga kafshët të cilat janë therur në një thertore të miratuar dhe i janë nënshtruar kontrollit me rezultate të favorshme të inspektimit para dhe pas vdekjes, në përpunje me kapitullin 6.3, të Kodit Terrestrial të OIE-së;

ç) janë marrë masat e nevojshme pas therjes për të shmangur kontaktin e mishit të freskët me çdo burim të virusit të murtajes afrikane të derrave.

1.5 Për mishin e freskët të kafshëve të egra të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) janë vrarë në një vend ose zonë të lirë nga murtaja afrikane e derrave, në përpunje me pikën 1



ose pikën 2, të nenit 15.1.4, të Kodit Terrestrial të OIE-së;

b) i janë nënshtruar me rezultate të favorshme një inspektimi pas vdekjes, në përputhje me kapitullin 6.3, të Kodit Terrestrial të OIE-së, në një objekt ekzaminimi të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti.

1.6 Për produktet e mishit të kafshëve të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) mishi i freskët plotëson kushtet përkatëse në nenin 15.1.14, 15.1.15 dhe 15.1.16, të Kodit Terrestrial të OIE-së;

b) mishi është përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti dhe ka plotësuar kushtet përkatëse të nenëve 15.1.14, 15.1.15 dhe 15.1.16, të Kodit Terrestrial të OIE-së; ose

c) janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti, në mënyrë që të sigurohet shkatërrimi i virusit të murtajës afrikane të derrave, në përputhje me nenin 15.1.23, të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë marrë masat e nevojshme pas përpunimit të mishit për të shmangur kontaktin e produktit me çdo burim të virusit të murtajës afrikane të derrave.

1.7 Për qimet (e pjesës së shpinës) e kafshëve të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) e kanë origjinën nga derrat e egër ose të butë të kapur në një vend, zonë ose ndarje pa prezencë të murtajës afrikane të derrave dhe janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti; ose

b) janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti ku është siguar shkatërrimi i virusit të murtajës afrikane të derrave, në përputhje me një nga proceset e listuara në nenin 15.1.26 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë marrë masat e nevojshme pas përpunimit për të shmangur kontaktin me produktin me çdo burim të virusit të murtajës afrikane të derrave.

1.8 Për lëkurët e kafshëve të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) kanë ardhur nga derra të një vendi ose zone të lirë nga sëmundja e murtajës afrikane të derrave, në përputhje me pikën 1 ose pikën 2, të nenit 15.1.4 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë përpunuar në

një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti; ose

b) origjinojnë nga derra të egër ose të butë të kapur në një vend, zonë ose kompartament pa prezencë të sëmundjes së murtajës afrikane të derrave dhe janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti; ose

c) janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti, ku është siguar shkatërrimi i virusit të murtajës afrikane të derrave në përputhje me një nga procedurat e përmendura në nenin 15.1.25 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë marrë masat paraprake të nevojshme pas përpunimit për të shmangur kontaktin e produktit me çdo burim të virusit të murtajës afrikane të derrave.

2. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit të informojë rregullisht, brenda 24 orëve, Autoritetin Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, Drejtorinë e Përgjithshme të Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit për çdo ngarkesë të kafshëve të llojit derra, produkteve dhe nënprodukteve të tyre, materialit biologjik, embrioneve, mishit dhe nënprodukteve të tyre.

3. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohen Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I BUJQËSISË DHE
ZHVILLIMIT RURAL
Frida Krifca



URDHËR
Nr. 460, datë 2.8.2023

**PËR IMPORTIN E KAFSHËVE TË
LLOJIT DERRA, PRODUKTEVE,
NËNPRODUKTEVE TË TYRE,
MATERIALIT BIOLOGJIK,
EMBRIONEVE, MISHIT DHE
NËNPRODUKTEVE TË TYRE
NGA LITUANIA**

Mbështetur në nenin 102, pikën 4 të Kushtetutës; në nenin 42 dhe 43, të ligjit nr. 10465, datë 29.9.2011, “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar,

URDHËROJ:

1. Lejimin e importit dhe tranzitimit për në territorin e Republikës së Shqipërisë të të gjitha kafshëve të gjalla të llojit derra të butë dhe të egër, produkteve të tyre, materialit biologjik dhe embrioneve e kafshëve të gjalla të llojit derra, mishin e freskët dhe nënprodukteve të tyre të kafshëve të llojit derra, vetëm nëse plotësohen kushtet e mëposhtme nga pika 1.1 deri në pikën 1.8, përkatësisht nga shteti i Lituaniës:

Ndarja Administrative e Nivelit të Parë	Ndarja Administrative e Nivelit të Dytë	Ndarja Administrative e Nivelit të Tretë
Alytaus	Alytaus	
Kauno	Kėdaini	
Kauno	Kauno	
Kauno	Kaišiadory	
Kauno	Prien	
Kauno	Jonavos	
Klaipėdos		
Marijampolės		
Šiauliai	Akmenės	
Šiauliai	Šiauli	
Tauragės	Tauragės	
Tauragės	Jurbarko	
Telšiai	Telši	
Telšiai	Plungės	
Utenos	Anykščiai	
Utenos	Molėtai	
Utenos	Zarasai	
Utenos	Utenos	
Utenos	Ignalinos	
Utenos	Zarasai	
Vilniaus		

1.1 Për kafshët e gjalla të llojit derra të butë dhe të egër, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që kafshët:**

a) nuk kanë shfaqur shenja klinike të murtajës afrikane të derrave ditën e dërgesës;

b) janë mbajtur që nga lindja ose për tre muajt e fundit në një kompartment (zonë) pa prezencë të murtajës afrikane të derrave; ose

c) janë mbajtur në një stacion karantine, të izoluar për 30 ditë përpara dërgesës dhe i janë nënshtruar një testi virologjik dhe një testi serologjik, të kryer të paktën 21 ditë pas hyrjes në stacionin e karantinës, me rezultate negative.

1.2 Për materialin biologjik të kafshëve të llojit derra të butë ose të egër, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që kafshët donatore të materialit biologjik:**

a) janë mbajtur që nga lindja ose për të paktën tre muajt para grumbullimit në një stacion, në të cilin janë mbikëqyrur në përputhje me nenet 15.1.28 deri në 15.1.30 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe vërtetohet se asnjë rast i murtajës afrikane të derrave nuk ka ndodhur në tre vitet e fundit. Kjo periudhë reduktohet në 12 muaj vetëm nëse survejanca demonstron, dokumenton se nuk ka dëshmi të përfshirjes së rriqnave në epidemiologjinë e infeksionit;

b) nuk kanë shfaqur shenja klinike të murtajës afrikane të derrave në ditën e mbledhjes së materialit biologjik;

c) sperma është mbledhur, përpunuar dhe ruajtur në përputhje me kapitujt 4.6 dhe 4.7, të Kodit Terrestrial të OIE-së;

ç) sperma e përdorur për fekondimin e ovociteve është në përputhje me kushtet e përcaktuara në nenin 15.1.10 ose nenin 15.1.11, të Kodit Terrestrial të OIE-së, sipas rastit.

1.3 Për embrionet e derivuara *in vivo* të derrave të butë, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që kafshët donatore të embrioneve:**

a) janë mbajtur që nga lindja ose për të paktën tre muajt para grumbullimit të embrioneve në një stacion, në të cilin janë mbikëqyrur në përputhje me nenet 15.1.28 deri në 15.1.30, të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe vërtetohet se asnjë rast i murtajës afrikane të derrave nuk ka ndodhur në tre vitet e fundit.

Kjo periudhë reduktohet në 12 muaj vetëm nëse survejanca demonstron, dokumenton se nuk ka dëshmi të përfshirjes së rriqnave në epidemiologjinë e infeksionit;

b) nuk kanë shfaqur shenja klinike të murtajës afrikane të derrave në ditën e mbledhjes së embrioneve;



c) i janë nënshtruar një testi serologjik, të kryer të paktën 21 ditë pas grumbullimit, me rezultate negative;

ç) embrionet janë mbledhur, përpunuar dhe ruajtur në përputhje me dispozitat përkatëse të kapitullit 4.8 dhe 4.10, të Kodit Terrestrial të OIE-së.

1.4 Për mishin e kafshëve të llojit derra të butë ose të egër, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) e gjithë ngarkesa e mishit të freskët vjen nga kafshët e llojit derra që kanë origjinën nga tufat, të cilat janë mbikëqyrur në përputhje me nenin 15.1.28 deri në 15.1.30 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe vërteton se asnjë rast i murtajës afrikane të derrave nuk ka ndodhur në tre vitet e fundit. Kjo periudhë reduktohet në 12 muaj vetëm nëse survejanca demonstron, dokumenton se nuk ka dëshmi të përfshirjes së rriqnave në epidemiologjinë e infeksionit;

b) janë testuar mostra nga një numër statistikisht përfaqësues i kafshëve për sëmundjen e murtajës afrikane të derrave, me rezultate negative;

c) e gjithë ngarkesa e mishit të freskët vjen nga kafshë të cilat janë therur në një thertore të miratuar dhe i janë nënshtruar kontrollit me rezultate të favorshme të inspektimit para dhe pas vdekjes, në përputhje me kapitullin 6.3, të Kodit Terrestrial të OIE-së;

ç) janë marrë masat e nevojshme pas therjes për të shmangur kontaktin e mishit të freskët me çdo burim të virusit të murtajës afrikane të derrave.

1.5 Për mishin e freskët të kafshëve të egra të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) janë vrarë në një vend ose zonë të lirë nga murtaja afrikane e derrave, në përputhje me pikën 1 ose pikën 2, të nenit 15.1.4 të Kodit Terrestrial të OIE-së;

b) i janë nënshtruar me rezultate të favorshme një inspektimi pas vdekjes, në përputhje me kapitullin 6.3 të Kodit Terrestrial të OIE-së, në një objekt ekzaminimi të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti.

1.6 Për produktet e mishit të kafshëve të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) mishi i freskët plotëson kushtet përkatëse, në nenin 15.1.14, 15.1.15 dhe 15.1.16, të Kodit Terrestrial të OIE-së;

b) mishi është përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti dhe ka plotësuar kushtet përkatëse, të nenëve 15.1.14, 15.1.15 dhe 15.1.16, të Kodit Terrestrial të OIE-së; ose

c) janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti, në mënyrë që të sigurohet shkatërrimi i virusit të murtajës afrikane të derrave, në përputhje me nenin 15.1.23 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë marrë masat e nevojshme pas përpunimit të mishit, për të shmangur kontaktin e produktit me çdo burim të virusit të murtajës afrikane të derrave.

1.7 Për qimet (e pjesës së shpinës) e kafshëve të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) e kanë origjinën nga derrat e egër ose të butë të kapur në një vend, zonë ose ndarje pa prezencë të murtajës afrikane të derrave dhe janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti; ose

b) janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti ku është siguruar shkatërrimi i virusit të murtajës afrikane të derrave, në përputhje me një nga proceset e listuara në nenin 15.1.26 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë marrë masat e nevojshme pas përpunimit për të shmangur kontaktin me produktin, me çdo burim të virusit të murtajës afrikane të derrave.

1.8 Për lëkurët e kafshëve të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) kanë ardhur nga derra të një vendi ose zone të lirë nga sëmundja e murtajës afrikane të derrave, në përputhje me pikën 1 ose pikën 2, të nenit 15.1.4 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti; ose

b) origjinojnë nga derra të egër ose të butë të kapur në një vend, zonë ose kompartment pa prezencë të sëmundjes së murtajës afrikane të derrave dhe janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti; ose

c) janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti, ku është siguruar shkatërrimi i virusit të murtajës afrikane të derrave në përputhje me një nga procedurat e përmendura në nenin 15.1.25 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë marrë masat paraprake të nevojshme pas përpunimit, për të shmangur



kontaktin e produktit me çdo burim të virusit të murtajës afrikane të derrave.

2. Urdhri nr. 412, datë 11.7.2023, “Për importin e kafshëve të llojit derra, produkteve, nënprodukteve të tyre, materialit biologjik, embrioneve, mishit dhe nënprodukteve të tyre nga Lituania”, shfuqizohet.

3. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit të informojë rregullisht, brenda 24 orëve, Autoritetin Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, Drejtorinë e Përgjithshme të Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit për çdo ngarkesë të kafshëve të llojit derra, produkteve dhe nënprodukteve të tyre, materialit biologjik, embrioneve, mishit dhe nënprodukteve të tyre.

4. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohen Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I BUJQËSISË DHE
ZHVILLIMIT RURAL
Frida Krifca

URDHËR
Nr. 461, datë 2.8.2023

**PËR IMPORTIN E KAFSHËVE TË
LLOJIT DERRA, PRODUKTEVE,
NËNPRODUKTEVE TË TYRE,
MATERIALIT BIOLOGJIK,
EMBRIONEVE, MISHIT DHE
NËNPRODUKTEVE TË TYRE
NGA HUNGARIA**

Mbështetur në nenin 102, pikën 4 të Kushtetutës; në nenin 42 dhe 43, të ligjit nr. 10465, datë 29.9.2011, “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar,

URDHËROJ:

1. Lejimin e importit dhe tranzitimit për në territorin e Republikës së Shqipërisë të të gjitha

kafshëve të gjalla të llojit derra të butë dhe të egër, produkteve të tyre, materialit biologjik dhe embrioneve e kafshëve të gjalla të llojit derra, mishin e freskët dhe nënprodukteve të tyre të kafshëve të llojit derra vetëm nëse plotësohen kushtet e mëposhtme nga pika 1.1 deri në pikën 1.8, përkatësisht nga shteti i Hungarisë:

Ndarja Administrative e Nivelit të Parë	Ndarja Administrative e Nivelit të Dytë	Ndarja Administrative e Nivelit të Tretë
Borsod-Abaúj-Zemplén	Gönc	
Budapest	Budapest	
Hajdú-Bihar	Debrecen	
Hajdú-Bihar	Hajdúböszörmény	
Heves	Pétersvára	
Heves	Eger	
Jász-Nagykan-Szolnok	Tiszafejed	
Nógrád	Balassagyarmat	
Nógrád	Salgótarján	
Pest	Pilisvörösvár	
Pest	Budaörs	
Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnamény	

1.1 Për kafshët e gjalla të llojit derra të butë dhe të egër, **certifikata shëndetësore veterinarë duhet të vërtetojë që kafshët:**

a) nuk kanë shfaqur shenja klinike të murtajës afrikane të derrave ditën e dërgesës;

b) janë mbajtur që nga lindja ose për tre muajt e fundit në një kompartment (zonë) pa prezencë të murtajës afrikane të derrave; ose

c) janë mbajtur në një stacion karantine, të izoluar për 30 ditë përpara dërgesës dhe i janë nënshtruar një testi virologjik dhe një testi serologjik të kryer të paktën 21 ditë pas hyrjes në stacionin e karantinës, me rezultate negative.

1.2 Për materialin biologjik të kafshëve të llojit derra të butë ose të egër, **certifikata shëndetësore veterinarë duhet të vërtetojë që kafshët donatore të materialit biologjik:**

a) janë mbajtur që nga lindja ose për të paktën tre muajt para grumbullimit në një stacion, në të cilin janë mbikëqyrur në përputhje me nenet 15.1.28 deri në 15.1.30, të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe vërtetohet se asnjë rast i murtajës afrikane të derrave, nuk ka ndodhur në tre vitet e fundit. Kjo periudhë reduktohet në 12 muajt vetëm nëse survejanca demonstron, dokumenton se nuk ka dëshmi të përfshirjes së rriqave në epidemiologjinë e infeksionit;



b) nuk kanë shfaqur shenja klinike të murtajës afrikane të derrave në ditën e mbledhjes së materialit biologjik;

c) sperma është mbledhur, përpunuar dhe ruajtur në përputhje me kapitujt 4.6 dhe 4.7 të Kodit Terrestrial të OIE-së;

ç) sperma e përdorur për fekondimin e ovociteve është në përputhje me kushtet e përcaktuara në nenin 15.1.10 ose nenin 15.1.11, të Kodit Terrestrial të OIE-së, sipas rastit.

1.3 Për embrionet e derivuara *in vivo* të derrave të butë, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetojë që kafshët donatore të embrioneve:**

a) janë mbajtur që nga lindja ose për të paktën tre muaj para grumbullimit të embrioneve në një stacion, në të cilën janë mbikëqyrur në përputhje me nenet 15.1.28 deri në 15.1.30, të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe vërteton se asnjë rast i murtajës afrikane të derrave nuk ka ndodhur në tre vitet e fundit. Kjo periudhë reduktohet në 12 muaj vetëm nëse survejanca demonstron, dokumenton se nuk ka dëshmi të përfshirjes së rriqnave në epidemiologjinë e infeksionit;

b) nuk kanë shfaqur shenja klinike të murtajës afrikane të derrave në ditën e mbledhjes së embrioneve;

c) i janë nënshtruar një testi serologjik të kryer të paktën 21 ditë pas grumbullimit, me rezultate negative;

ç) embrionet janë mbledhur, përpunuar dhe ruajtur në përputhje me dispozitat përkatëse të kapitullit 4.8 dhe 4.10 të Kodit Terrestrial të OIE-së.

1.4 Për mishin e kafshëve të llojit derra të butë ose të egër, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetojë që:**

a) e gjithë ngarkesa e mishit të freskët vjen nga kafshët e llojit derra që kanë origjinën nga tufat në të cilat janë mbikëqyrur, në përputhje me nenet 15.1.28 deri në 15.1.30, të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe vërteton se asnjë rast i murtajës afrikane të derrave nuk ka ndodhur në tre vitet e fundit;

b) kjo periudhë reduktohet në 12 muaj vetëm nëse survejanca demonstron, dokumenton se nuk ka dëshmi të përfshirjes së rriqnave në epidemiologjinë e infeksionit;

c) janë testuar mostra nga një numër statistikisht përfaqësues i kafshëve për sëmundjen e murtajës afrikane të derrave, me rezultate negative;

ç) e gjithë ngarkesa e mishit të freskët vjen nga kafshë të cilat janë therur në një thertore të miratuar

dhe i janë nënshtruar kontrollit me rezultate të favorshme të inspektimit para dhe pas vdekjes, në përputhje me kapitullin 6.3 të Kodit Terrestrial të OIE-së;

d) janë marrë masat e nevojshme pas therjes për të shmangur kontaktin e mishit të freskët me çdo burim të virusit të murtajës afrikane të derrave.

1.5 Për mishin e freskët të kafshëve të egra të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetojë që:**

a) janë vrarë në një vend ose zonë të lirë nga murtaja afrikane e derrave, në përputhje me pikën 1 ose pikën 2, të nenit 15.1.4, të Kodit Terrestrial të OIE-së;

b) i janë nënshtruar me rezultate të favorshme një inspektimi pas vdekjes, në përputhje me kapitullin 6.3, të Kodit Terrestrial të OIE-së, në një objekt ekzaminimi të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti.

1.6 Për produktet e mishit të kafshëve të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetojë që:**

a) mishi i freskët plotëson kushtet përkatëse në nenet 15.1.14, 15.1.15. dhe 15.1.16, të Kodit Terrestrial të OIE-së;

b) mishi është përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti dhe ka plotësuar kushtet përkatëse të neneve 15.1.14, 15.1.15 dhe 15.1.16, të Kodit Terrestrial të OIE-së; ose

c) janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti, në mënyrë që të sigurohet shkatërrimi i virusit të murtajës afrikane të derrave, në përputhje me nenin 15.1.23, të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë marrë masat e nevojshme pas përpunimit të mishit për të shmangur kontaktin e produktit me çdo burim të virusit të murtajës afrikane të derrave.

1.7 Për qimet (e pjesës së shpinës) e kafshëve të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetojë që:**

a) e kanë origjinën nga derrat e egër ose të butë të kapur në një vend, zonë ose ndarje pa prezencë të murtajës afrikane të derrave dhe janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti; ose

b) janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti ku është siguar shkatërrimi i virusit të murtajës afrikane të derrave, në përputhje me një nga proceset e listuara në nenin 15.1.26, të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe



janë marrë masat e nevojshme pas përpunimit, për të shmangur kontaktin me produktin me çdo burim të virusit të murtajës afrikane të derrave.

1.8 Për lëkurët e kafshëve të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) kanë ardhur nga derra të një vendi ose zone të lirë nga sëmundja e murtajës afrikane të derrave, në përputhje me pikën 1 ose pikën 2, të nenit 15.1.4 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti; ose

b) origjinojnë nga derra të egër ose të butë të kapur në një vend, zonë ose kompartament pa prezencë të sëmundjes së murtajës afrikane të derrave dhe janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti; ose

c) janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti, ku është siguruar shkatërrimi i virusit të murtajës afrikane të derrave, në përputhje me një nga procedurat e përmendura në nenin 15.1.25 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë marrë masat paraprake të nevojshme pas përpunimit, për të shmangur kontaktin e produktit me çdo burim të virusit të murtajës afrikane të derrave.

2. Urdhri nr. 422, datë 14.7.2023, “Për importin e kafshëve të llojit derra, produkteve, nënprodukteve të tyre, materialit biologjik, embrioneve, mishit dhe nënprodukteve të tyre nga Hungaria”, shfuqizohet.

3. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit të informojë rregullisht, brenda 24 orëve, Autoritetin Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, Drejtorinë e Përgjithshme të Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit për çdo ngarkesë të kafshëve të llojit derra, produkteve dhe nënprodukteve të tyre, materialit biologjik, embrioneve, mishit dhe nënprodukteve të tyre.

4. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohen Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I BUJQËSISË DHE
ZHVILLIMIT RURAL
Frida Krifca

URDHËR

Nr. 462, datë 2.8.2023

PËR IMPORTIN E KAFSHËVE TË LLOJIT DERRA, PRODUKTEVE, NËNPRODUKTEVE TË TYRE, MATERIALIT BIOLOGJIK, EMBRIONEVE, MISHIT DHE NËNPRODUKTEVE TË TYRE NGA SLOVAKIA

Mbështetur në nenin 102, pikën 4 të Kushtetutës, në nenin 42 dhe 43, të ligjit nr. 10465, datë 29.9.2011, “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar,

URDHËROJ:

1. Lejimin e importit dhe tranzitimit për në territorin e Republikës së Shqipërisë të të gjitha kafshëve të gjalla të llojit derra të butë dhe të egër, produkteve të tyre, materialit biologjik dhe embrioneve e kafshëve të gjalla të llojit derra, mishin e freskët dhe nënprodukteve të tyre të kafshëve të llojit derra, vetëm nëse plotësohen kushtet e mëposhtme nga pika 1.1 deri në pikën 1.8, përkatësisht nga shteti i Sllovakisë:

Ndarja Administrative e Nivelit të Parë	Ndarja Administrative e Nivelit të Dytë	Ndarja Administrative e Nivelit të Tretë
Banskobystrický	Banská Bystrica	
Banskobystrický	Brezno	
Banskobystrický	Detva	
Banskobystrický	Krupina	
Banskobystrický	Lucenec	
Banskobystrický	Poltár	
Banskobystrický	Revúca	
Banskobystrický	Rimavská Sobota	
Banskobystrický	Veľký Krtíš	
Banskobystrický	Žiar nad Hronom	
Banskobystrický	Zvolen	
Banskobystrický	Žarnovica	
Košický	Košice-okolie	
Košický	Michalovce	
Košický	Rožnava	
Košický	Sobrance	
Košický	Spišská Nová Ves	
Košický	Trebišov	
Prešovský	Bardejov	
Prešovský	Humenné	
Prešovský	Kežmarok	
Prešovský	Levoca Prešov	
Prešovský	Medzilaborce	
Prešovský	Poprad	
Prešovský	Sabinov	
Prešovský	Snina	



Prešovský	Stropkov	
Prešovský	Svidník	
Prešovský	Vranov nad Topľou	
Žilinský	Liptovský Mikuláš	

1.1 Për kafshët e gjalla të llojit derra të butë dhe të egër, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që kafshët:**

a) nuk kanë shfaqur shenja klinike të murtajes afrikane të derrave ditën e dërgesës;

b) janë mbajtur që nga lindja ose për tre muajt e fundit në një kompartment (zonë) pa prezencë të murtajes afrikane të derrave; ose

c) janë mbajtur në një stacion karantine, të izoluar për 30 ditë përpara dërgesës dhe i janë nënshtruar një testi virologjik dhe një testi serologjik, të kryer të paktën 21 ditë pas hyrjes në stacionin e karantinës, me rezultate negative.

1.2 Për materialin biologjik të kafshëve të llojit derra të butë ose të egër, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që kafshët donatore të materialit biologjik:**

a) janë mbajtur që nga lindja ose për të paktën tre muaj para grumbullimit në një stacion, në të cilin janë mbikëqyrur në përputhje me nenet 15.1.28 deri në 15.1.30, të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe vërtetohet se asnjë rast i murtajes afrikane të derrave nuk ka ndodhur në tre vitet e fundit. Kjo periudhë reduktohet në 12 muaj vetëm nëse survejanca demonstron, dokumenton se nuk ka dëshmi të përfshirjes së rriqnave në epidemiologjinë e infeksionit;

b) nuk kanë shfaqur shenja klinike të murtajes afrikane të derrave në ditën e mbledhjes së materialit biologjik;

c) sperma është mbledhur, përpunuar dhe ruajtur në përputhje me kapitujt 4.6 dhe 4.7 të Kodit Terrestrial të OIE-së;

ç) sperma e përdorur për fekondimin e ovociteve është në përputhje me kushtet e përcaktuara në nenin 15.1.10 ose nenin 15.1.11, të Kodit Terrestrial të OIE-së, sipas rastit.

1.3 Për embrionet e derivuara *in vivo* të derrave të butë, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që kafshët donatore të embrioneve:**

a) janë mbajtur që nga lindja ose për të paktën tre muaj para grumbullimit të embrioneve në një stacion, në të cilin janë mbikëqyrur në përputhje me nenet 15.1.28 deri në 15.1.30, të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe vërtetohet se asnjë rast i murtajes afrikane të derrave nuk ka ndodhur në tre vitet e fundit. Kjo

periudhë reduktohet në 12 muaj vetëm nëse survejanca demonstron, dokumenton se nuk ka dëshmi të përfshirjes së rriqnave në epidemiologjinë e infeksionit;

b) nuk kanë shfaqur shenja klinike të murtajes afrikane të derrave në ditën e mbledhjes së embrioneve;

c) i janë nënshtruar një testi serologjik, të kryer të paktën 21 ditë pas grumbullimit, me rezultate negative;

ç) embrionet janë mbledhur, përpunuar dhe ruajtur në përputhje me dispozitat përkatëse të kapitullit 4.8 dhe 4.10, të Kodit Terrestrial të OIE-së.

1.4 Për mishin e kafshëve të llojit derra të butë ose të egër, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) e gjithë ngarkesa e mishit të freskët vjen nga kafshët e llojit derra që kanë origjinën nga tufat, të cilat janë mbikëqyrur në përputhje me nenet 15.1.28 deri në 15.1.30, të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe vërtetohet se asnjë rast i murtajes afrikane të derrave nuk ka ndodhur në tre vitet e fundit. Kjo periudhë reduktohet në 12 muaj vetëm nëse survejanca demonstron, dokumenton se nuk ka dëshmi të përfshirjes së rriqnave në epidemiologjinë e infeksionit;

b) janë testuar mostra nga një numër statistikisht përfaqësues i kafshëve për sëmundjen e murtajes afrikane të derrave, me rezultate negative;

c) e gjithë ngarkesa e mishit të freskët vjen nga kafshë të cilat janë therur në një thertore të miratuar dhe i janë nënshtruar kontrollit me rezultate të favorshme të inspektimit para dhe pas vdekjes, në përputhje me kapitullin 6.3 të Kodit Terrestrial të OIE-së;

ç) janë marrë masat e nevojshme pas therjes për të shmangur kontaktin e mishit të freskët me çdo burim të virusit të murtajes afrikane të derrave.

1.5 Për mishin e freskët të kafshëve të egra të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) janë vrarë në një vend ose zonë të lirë nga murtaja afrikane e derrave, në përputhje me pikën 1 ose pikën 2, të nenit 15.1.4 të Kodit Terrestrial të OIE-së;

b) i janë nënshtruar me rezultate të favorshme një inspektimi pas vdekjes, në përputhje me kapitullin 6.3 të Kodit Terrestrial të OIE-së, në një objekt



ekzaminimi të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti.

1.6 Për produktet e mishit të kafshëve të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) mishi i freskët plotëson kushtet përkatëse në nenet 15.1.14, 15.1.15. dhe 15.1.16, të Kodit Terrestrial të OIE-së;

b) mishi është përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti dhe ka plotësuar kushtet përkatëse të neneve 15.1.14, 15.1.15 dhe 15.1.16, të Kodit Terrestrial të OIE-së; ose

c) janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti, në mënyrë që të sigurohet shkatërrimi i virusit të murtajës afrikane të derrave, në përputhje me nenin 15.1.23 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë marrë masat e nevojshme pas përpunimit të mishit, për të shmangur kontaktin e produktit me çdo burim të virusit të murtajës afrikane të derrave.

1.7 Për qimet (e pjesës së shpinës) e kafshëve të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) e kanë origjinën nga derrat e egër ose të butë të kapur në një vend, zonë ose ndarje pa prezencë të murtajës afrikane të derrave dhe janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti; ose

b) janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti, ku është siguar shkatërrimi i virusit të murtajës afrikane të derrave në përputhje me një nga proceset e listuara në nenin 15.1.26 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë marrë masat e nevojshme pas përpunimit për të shmangur kontaktin me produktin me çdo burim të virusit të murtajës afrikane të derrave.

1.8 Për lëkurët e kafshëve të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) kanë ardhur nga derra të një vendi ose zone të lirë nga sëmundja e murtajës afrikane të derrave, në përputhje me pikën 1 ose pikën 2, të nenit 15.1.4 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti; ose

b) origjinojnë nga derra të egër ose të butë të kapur në një vend, zonë ose kompartament pa prezencë të sëmundjes së murtajës afrikane të

derrave dhe janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti; ose

c) janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti, ku është siguar shkatërrimi i virusit të murtajës afrikane të derrave, në përputhje me një nga procedurat e përmendura në nenin 15.1.25 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë marrë masat paraprake të nevojshme pas përpunimit, për të shmangur kontaktin e produktit me çdo burim të virusit të murtajës afrikane të derrave.

2. Urdhri nr. 551, datë 22.11.2022, “Për importin e kafshëve të llojit derra, produkteve, nënprodukteve të tyre, materialit biologjik, embrioneve, mishit dhe nënprodukteve të tyre nga Sllovakia”, shfuqizohet.

3. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit të informojë rregullisht, brenda 24 orëve, Autoritetin Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, Drejtorinë e Përgjithshme të Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit për çdo ngarkesë të kafshëve të llojit derra, produkteve dhe nënprodukteve të tyre, materialit biologjik, embrioneve, mishit dhe nënprodukteve të tyre.

4. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohen Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I BUJQËSISË DHE
ZHVILLIMIT RURAL
Frida Krifca



URDHËR
Nr. 463, datë 2.8.2023

**PËR IMPORTIN E KAFSHËVE TË
LLOJIT DERRA, PRODUKTEVE,
NËNPRODUKTEVE TË TYRE,
MATERIALIT BIOLOGJIK,
EMBRIONEVE, MISHIT DHE
NËNPRODUKTEVE TË TYRE
NGA GJERMANIA**

Mbështetur në nenin 102, pikën 4 të Kushtetutës; në nenin 42 dhe 43, të ligjit nr. 10465, datë 29.9.2011, “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar,

URDHËROJ:

1. Lejimin e importit dhe tranzitimit për në territorin e Republikës së Shqipërisë të të gjitha kafshëve të gjalla të llojit derra të butë dhe të egër, produkteve të tyre, materialit biologjik dhe embrioneve e kafshëve të gjalla të llojit derra, mishin e freskët dhe nënprodukteve të tyre të kafshëve të llojit derra vetëm nëse plotësohen kushtet e mëposhtme nga pika 1.1 deri në pikën 1.8, përkatësisht nga shteti i Gjermanisë:

Ndarja Administrative e Nivelit të Parë	Ndarja Administrative e Nivelit të Dytë	Ndarja Administrative e Nivelit të Tretë
Baden-Württemberg	Emmendingen	Nördlicher Kaiserstuhl
Brandenburg	Barnim	Britz-Chorin-Oderberg,
Brandenburg	Dahme-Spreewald	Lieberose/Oberspreewald
Brandenburg	Frankfurt (Oder),	Frankfurt (Oder)
Brandenburg	Märkisch-Oderland	Lebus
Brandenburg	Märkisch-Oderland	Bad Freienwalde (Oder),
Brandenburg	Märkisch-Oderland	Golzow
Brandenburg	Oberspreewald-Lausitz	Großräschen
Brandenburg	Oberspreewald-Lausitz	Ruhland
Brandenburg	Oberspreewald-Lausitz	Senftenberg
Brandenburg	Oder-Spree	Odervorland
Brandenburg	Oder-Spree	Scharmützelsee
Brandenburg	Oder-Spree	Schlaubetal
Brandenburg	Oder-Spree	Eisenhüttenstadt
Brandenburg	Oder-Spree	Brieskow-Finkenheerd

Brandenburg	Oder-Spree	Beeskow
Brandenburg	Oder-Spree	Rietz-Neuendorf
Brandenburg	Spree-Neiße	Schenkendöbern
Brandenburg	Spree-Neiße	Spremberg
Brandenburg	Spree-Neiße	Guben
Brandenburg	Spree-Neiße	Forst (Lausitz)
Brandenburg	Spree-Neiße	Döbern-Land
Brandenburg	Spree-Neiße	Neuhausen/Spree
Brandenburg	Spree-Neiße	Drebkau
Brandenburg	Uckermark	Schwedt/Oder
Brandenburg	Uckermark	Gartz (Oder)
Brandenburg	Uckermark	Oder-Welse
Brandenburg	Uckermark	Angermünde
Brandenburg	Spree-Neiße	Peitz
Brandenburg	Uckermark	Prenzlau
Brandenburg	Dahme-Spreewald	Lübben (Spreewald)
Mecklenburg-Vorpommern	Ludwigslust-Parchim	Parchimer Umland
Mecklenburg-Vorpommern	Ludwigslust-Parchim	Eldenburg Lütz
Mecklenburg-Vorpommern	Ludwigslust-Parchim	Grabow
Mecklenburg-Vorpommern	Rostock	Krakow am See
Niedersachse	Emsland	Twist
Niedersachsen	Emsland	Emsbüren
Niedersachsen	Cloppenburg	Garrel
Sachsen	Bautzen	Malschwitz
Sachsen	Bautzen	Schwepnitz
Sachsen	Bautzen	Weißenberg
Sachsen	Bautzen	Königswartha
Sachsen	Bautzen	Königsbrück
Sachsen	Bautzen	Pulsnitz
Sachsen	Bautzen	Großdubrau
Sachsen	Bautzen	Spreetal
Sachsen	Bautzen	Lohsa
Sachsen	Bautzen	Wachau
Sachsen	Bautzen	Am Klosterwasser
Sachsen	Bautzen	Lauta
Sachsen	Görlitz	Weißwasser/O.L.
Sachsen	Görlitz	Diehsa
Sachsen	Görlitz	Bad Muskau
Sachsen	Görlitz	Rietschen
Sachsen	Görlitz	Markersdorf
Sachsen	Görlitz	Boxberg/O.L.
Sachsen	Görlitz	Schleife
Sachsen	Görlitz	Niesky
Sachsen	Görlitz	Bernstadt/Schönau-Berzdorf
Sachsen	Görlitz	Diehsa
Sachsen	Görlitz	Reichenbach/O.L.
Sachsen	Görlitz	Ostritz
Sachsen	Görlitz	Weißer Schöps/Neiße
Sachsen	Meißen	Thiendorf
Sachsen	Meißen	Ebersbach
Sachsen	Meißen	Moritzburg
Sachsen	Meißen	Schönfeld
Sachsen	Meißen	Radeburg
Sachsen	Meißen	Weinböhla
Sachsen	Meißen	Niederau
Sachsen	Nordsachsen	Wernsdorf



Sachsen	Sächsische Schweiz - Osterzgebirge	Lohmen/Stadt Wehlen
Sachsen	Bautzen	Radibor
Sachsen	Bautzen	Königswartha
Sachsen	Bautzen	Neschwitz
Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Südtondern

1.1 Për kafshët e gjalla të llojit derra të butë dhe të egër, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që kafshët:**

a) nuk kanë shfaqur shenja klinike të murtajes afrikane të derrave ditën e dërgesës;

b) janë mbajtur që nga lindja ose për tre muajt e fundit në një kompartment (zonë) pa prezencë të murtajes afrikane të derrave; ose

c) janë mbajtur në një stacion karantine, të izoluar për 30 ditë përpara dërgesës dhe i janë nënshtruar një testi virologjik dhe një testi serologjik të kryer të paktën 21 ditë pas hyrjes në stacionin e karantinës, me rezultate negative.

1.2 Për materialin biologjik të kafshëve të llojit derra të butë ose të egër, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që kafshët donatore të materialit biologjik:**

a) janë mbajtur që nga lindja ose për të paktën tre muajt para grumbullimit në një stacion, në të cilin janë mbikëqyrur në përputhje me nenet 15.1.28 deri në 15.1.30 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe vërtetohet se asnjë rast i murtajes afrikane të derrave nuk ka ndodhur në tre vitet e fundit. Kjo periudhë reduktohet në 12 muaj vetëm nëse survejanca demonstron, dokumenton se nuk ka dëshmi të përfshirjes së rriqnave në epidemiologjinë e infeksionit;

b) nuk kanë shfaqur shenja klinike të murtajes afrikane të derrave në ditën e mbledhjes së materialit biologjik;

c) sperma është mbledhur, përpunuar dhe ruajtur në përputhje me kapitujt 4.6 dhe 4.7 të Kodit Terrestrial të OIE-së;

ç) sperma e përdorur për fekondimin e ovociteve është në përputhje me kushtet e përcaktuara në nenin 15.1.10 ose nenin 15.1.11, të Kodit Terrestrial të OIE-së, sipas rastit.

1.3 Për embrionet e derivuara *in vivo* të derrave të butë, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që kafshët donatore të embrioneve:**

a) janë mbajtur që nga lindja ose për të paktën tre muajt para grumbullimit të embrioneve në një stacion, në të cilin janë mbikëqyrur në përputhje me

nenet 15.1.28 deri në 15.1.30, të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe vërtetohet se asnjë rast i murtajes afrikane të derrave nuk ka ndodhur në tre vitet e fundit. Kjo periudhë reduktohet në 12 muaj vetëm nëse survejanca demonstron, dokumenton se nuk ka dëshmi të përfshirjes së rriqnave në epidemiologjinë e infeksionit;

b) nuk kanë shfaqur shenja klinike të murtajes afrikane të derrave në ditën e mbledhjes së embrioneve;

c) i janë nënshtruar një testi serologjik të kryer të paktën 21 ditë pas grumbullimit, me rezultate negative;

ç) embrionet janë mbledhur, përpunuar dhe ruajtur në përputhje me dispozitat përkatëse të kapitullit 4.8 dhe 4.10, të Kodit Terrestrial të OIE-së.

1.4 Për mishin e kafshëve të llojit derra të butë ose të egër, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) e gjithë ngarkesa e mishit të freskët vjen nga kafshët e llojit derra që kanë origjinën nga tufat, të cilat janë mbikëqyrur në përputhje me nenet 15.1.28 deri në 15.1.30 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe vërtetohet se asnjë rast i murtajes afrikane të derrave nuk ka ndodhur në tre vitet e fundit. Kjo periudhë reduktohet në 12 muaj vetëm nëse survejanca demonstron, dokumenton se nuk ka dëshmi të përfshirjes së rriqnave në epidemiologjinë e infeksionit;

b) janë testuar mostra nga një numër statistikisht përfaqësues i kafshëve për sëmundjen e murtajes afrikane të derrave, me rezultate negative;

c) e gjithë ngarkesa e mishit të freskët vjen nga kafshët të cilat janë therur në një thertore të miratuar dhe i janë nënshtruar kontrollit me rezultate të favorshme të inspektimit para dhe pas vdekjes, në përputhje me kapitullin 6.3, të Kodit Terrestrial të OIE-së;

ç) janë marrë masat e nevojshme pas therjes për të shmangur kontaktin e mishit të freskët me çdo burim të virusit të murtajes afrikane të derrave.

1.5 Për mishin e freskët të kafshëve të egra të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) janë vrarë në një vend ose zonë të lirë nga murtaja afrikane e derrave në përputhje me pikën 1 ose pikën 2 të nenit 15.1.4 të Kodit Terrestrial të OIE-së;



b) i janë nënshtruar me rezultate të favorshme një inspektimi pas vdekjes, në përputhje me kapitullin 6.3, të Kodit Terrestrial të OIE-së, në një objekt ekzaminimi të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti.

1.6 Për produktet e mishit të kafshëve të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) mishi i freskët plotëson kushtet përkatëse në nenin 15.1.14, 15.1.15 dhe 15.1.16, të Kodit Terrestrial të OIE-së;

b) mishi është përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti dhe ka plotësuar kushtet përkatëse të neneve 15.1.14, 15.1.15 dhe 15.1.16, të Kodit Terrestrial të OIE-së; ose

c) janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti, në mënyrë që të sigurohet shkatërrimi i virusit të murtajës afrikane të derrave, në përputhje me nenin 15.1.23, të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë marrë masat e nevojshme pas përpunimit të mishit për të shmangur kontaktin e produktit me çdo burim të virusit të murtajës afrikane të derrave.

1.7 Për qimet (e pjesës së shpinës) e kafshëve të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) e kanë origjinën nga derrat e egër ose të butë të kapur në një vend, zonë ose ndarje pa prezencë të murtajës afrikane të derrave dhe janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti; ose

b) janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti ku është siguruar shkatërrimi i virusit të murtajës afrikane të derrave në përputhje me një nga proceset e listuara në nenin 15.1.26, të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë marrë masat e nevojshme pas përpunimit për të shmangur kontaktin me produktin me çdo burim të virusit të murtajës afrikane të derrave.

1.8 Për lëkurët e kafshëve të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) kanë ardhur nga derra të një vendi ose zone të lirë nga sëmundja e murtajës afrikane të derrave, në përputhje me pikën 1 ose pikën 2, të nenit 15.1.4 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti; ose

b) origjinojnë nga derra të egër ose të butë të kapur në një vend, zonë ose kompartment pa prezencë të sëmundjes së murtajës afrikane të derrave dhe janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti; ose

c) janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti, ku është siguruar shkatërrimi i virusit të murtajës afrikane të derrave, në përputhje me një nga procedurat e përmendura në nenin 15.1.25 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë marrë masat paraprake të nevojshme pas përpunimit, për të shmangur kontaktin e produktit me çdo burim të virusit të murtajës afrikane të derrave.

2. Urdhri nr. 560, datë 22.11.2022, “Për importin e kafshëve të llojit derra, produkteve, nënprodukteve të tyre, materialit biologjik, embrioneve, mishit dhe nënprodukteve të tyre nga Gjermania”, shfuqizohet.

3. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit të informojë rregullisht, brenda 24 orëve, Autoritetin Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, Drejtorinë e Përgjithshme të Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit për çdo ngarkesë të kafshëve të llojit derra, produkteve dhe nënprodukteve të tyre, materialit biologjik, embrioneve, mishit dhe nënprodukteve të tyre.

4. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohen Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I BUJQËSISË DHE
ZHVILLIMIT RURAL
Frida Krifca



URDHËR
Nr. 464, datë 2.8.2023

**PËR IMPORTIN E KAFSHËVE TË
LLOJIT DERRA, PRODUKTEVE,
NËNPRODUKTEVE TË TYRE,
MATERIALIT BIOLOGJIK,
EMBRIONEVE, MISHIT DHE
NËNPRODUKTEVE TË TYRE
NGA BULLGARIA**

Mbështetur në nenin 102, pika 4, të Kushtetutës; në nenet 42 dhe 43 të ligjit nr. 10465, datë 29.9.2011, “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar,

URDHËROJ:

1. Lejimin e importit dhe tranzitimit për në territorin e Republikës së Shqipërisë të të gjitha kafshëve të gjalla të llojit derra të butë dhe të egër, produkteve të tyre, materialit biologjik dhe embrioneve e kafshëve të gjalla të llojit derra, mishin e freskët dhe nënprodukteve të tyre të kafshëve të llojit derra, vetëm nëse plotësohen kushtet e mëposhtme nga pika 1.1 deri në pikën 1.8, përkatësisht nga shteti i Bullgarisë:

Ndarja administrative e nivelit të parë	Ndarja administrative e nivelit të dytë	Ndarja administrative e nivelit të tretë
Blagoevgrad		
Burgas		
Dobrich		
Gabrovo		
Haskovo		
Kardzhali		
Kyustendil		
Pazardzhik		
Pernik		
Plovdiv		
Montana	Valchedram	
Razgrad		
Ruse		
Shumen		
Sliven		
Smolyan		
Sofia		
Stara Zagora		
Tragovishte		
Varna		
Veliko Tarnovo		
Yambol		

1.1. Për kafshët e gjalla të llojit derra të butë dhe të egër, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetojë që kafshët:**

a) nuk kanë shfaqur shenja klinike të murtagjës afrikane të derrave ditën e dërgesës;

b) janë mbajtur që nga lindja ose për tre muajt e fundit në një kompartment (zonë) pa prezencë të murtagjës afrikane të derrave; ose

c) janë mbajtur në një stacion karantine, të izoluar për 30 ditë përpara dërgesës dhe i janë nënshtruar një testi virologjik dhe një testi serologjik të kryer të paktën 21 ditë pas hyrjes në stacionin e karantinës, me rezultate negative.

1.2. Për materialin biologjik të kafshëve të llojit derra të butë ose të egër, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetojë që kafshët donatore të materialit biologjik:**

a) janë mbajtur që nga lindja ose për të paktën tre muaj para grumbullimit në një stacion, në të cilin janë mbikëqyrur në përputhje me nenet 15.1.28 deri në 15.1.30 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe vërteton se asnjë rast i murtagjës afrikane të derrave, nuk ka ndodhur në tre vjetët e fundit. Kjo periudhë reduktohet në 12 muaj vetëm nëse survejanca demonstroi dokumenton se nuk ka dëshmi të përfshirjes së rriqnave në epidemiologjinë e infeksionit;

b) nuk kanë shfaqur shenja klinike të murtagjës afrikane të derrave në ditën e mbledhjes së materialit biologjik;

c) sperma është mbledhur, përpunuar dhe ruajtur në përputhje me kapitujt 4.6 dhe 4.7 të Kodit Terrestrial të OIE-së;

ç) sperma e përdorur për fekondimin e ovociteve është në përputhje me kushtet e përcaktuara në nenin 15.1.10 ose nenin 15.1.11 të Kodit Terrestrial të OIE-së, sipas rastit.

1.3. Për embrionet e derivuara *in vivo* të derrave të butë, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetojë që kafshët donatore të embrioneve:**

a) janë mbajtur që nga lindja ose për të paktën tre muaj para grumbullimit të embrioneve në një stacion, në të cilin janë mbikëqyrur në përputhje me nenet 15.1.28 deri në 15.1.30 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe vërteton se asnjë rast i murtagjës afrikane të derrave, nuk ka ndodhur në tre vjetët e fundit. Kjo periudhë reduktohet në 12 muaj vetëm nëse survejanca demonstroi dokumenton se nuk ka



dëshmi të përfshirjes së rriqnave në epidemiologjinë e infeksionit;

b) nuk kanë shfaqur shenjë klinike të murtajes afrikane të derrave në ditën e mbledhjes së embrioneve;

c) i janë nënshtruar një testi serologjik të kryer të paktën 21 ditë pas grumbullimit, me rezultate negative;

ç) embrionet janë mbledhur, përpunuar dhe ruajtur në përputhje me dispozitat përkatëse të kapitullit 4.8 dhe 4.10 të Kodit Terrestrial të OIE-së.

1.4. Për mishin e kafshëve të llojit derra të butë ose të egër, **certifikata shëndetësore veterinarë duhet të vërtetojë që:**

a) e gjithë ngarkesa e mishit të freskët vjen nga kafshët e llojit derra që kanë origjinën nga tufat në të cilat janë mbikëqyrur në përputhje me nenin 15.1.28 deri në 15.1.30 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe vërteton se asnjë rast i murtajes afrikane të derrave nuk ka ndodhur në tre vjetët e fundit. Kjo periudhë reduktohet në 12 muaj vetëm nëse survejanca demonstron dokumenton se nuk ka dëshmi të përfshirjes së rriqnave në epidemiologjinë e infeksionit;

b) janë testuar mostra nga një numër statistikisht përfaqësues i kafshëve për sëmundjen e murtajes afrikane të derrave, me rezultate negative;

c) e gjithë ngarkesa e mishit të freskët vjen nga kafshë të cilat janë therur në një thertore të miratuar dhe i janë nënshtruar kontrollit me rezultate të favorshme të inspektimit para dhe pas vdekjes në përputhje me kapitullin 6.3 të Kodit Terrestrial të OIE-së;

ç) janë marrë masat e nevojshme pas therjes për të shmangur kontaktin e mishit të freskët me çdo burim të virusit të murtajes afrikane të derrave.

1.5. Për mishin e freskët të kafshëve të egra të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinarë duhet të vërtetojë që:**

a) janë vrarë në një vend ose zonë të lirë nga murtaja afrikane e derrave në përputhje me pikën 1 ose pikën 2 të nenit 15.1.4 të Kodit Terrestrial të OIE-së;

b) i janë nënshtruar me rezultate të favorshme një inspektimi pas vdekjes në përputhje me kapitullin 6.3 të Kodit Terrestrial të OIE-së në një objekt ekzaminimi të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti.

1.6. Për produktet e mishit të kafshëve të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinarë duhet të vërtetojë që:**

a) mishi i freskët plotëson kushtet përkatëse në nenin 15.1.14, 15.1.15 dhe 15.1.16 të Kodit Terrestrial të OIE-së;

b) mishi është përpunuar në një objekt të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti dhe ka plotësuar kushtet përkatëse të neneve 15.1.14, 15.1.15 dhe 15.1.16 të Kodit Terrestrial të OIE-së; ose

c) janë përpunuar në një objekt të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti, në mënyrë që të sigurohet shkatërrimi i virusit të murtajes afrikane të derrave në përputhje me nenin 15.1.23 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë marrë masat e nevojshme pas përpunimit të mishit për të shmangur kontaktin e produktit me çdo burim të virusit të murtajes afrikane të derrave.

1.7. Për qimet (e pjesës së shpinës) e kafshëve të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinarë duhet të vërtetojë që:**

a) e kanë origjinën nga derrat e egër ose të butë të kapur në një vend, zonë ose ndarje pa prezencë të murtajes afrikane të derrave dhe janë përpunuar në një objekt të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti; ose

b) janë përpunuar në një objekt të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti ku është siguruar shkatërrimi i virusit të murtajes afrikane të derrave në përputhje me një nga proceset e listuara në nenin 15.1.26 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë marrë masat e nevojshme pas përpunimit për të shmangur kontaktin me produktin me çdo burim të virusit të murtajes afrikane të derrave.

1.8. Për lëkurët e kafshëve të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinarë duhet të vërtetojë që:**

a) kanë ardhur nga derra të një vendi ose zone të lirë nga sëmundja e murtajes afrikane të derrave, në përputhje me pikën 1 ose me pikën 2, të nenit 15.1.4 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti; ose

b) origjinojnë nga derra të egër ose të butë të kapur në një vend, zonë ose kompartment pa prezencë të sëmundjes së murtajes afrikane të derrave dhe janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti; ose



c) janë përpunuar në një objekt të miratuar nga autoriteti veterinar për qëllime eksporti, ku është siguruar shkatërrimi i virusit të murtajës afrikane të derrave në përputhje me një nga procedurat e përmendura në nenin 15.1.25 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë marrë masat paraprake të nevojshme pas përpunimit për të shmangur kontaktin e produktit me çdo burim të virusit të murtajës afrikane të derrave.

2. Urdhri nr. 554, datë 22.11.2022, “Për importin e kafshëve të llojit derra, produkteve, nënprodukteve të tyre, materialit biologjik, embrioneve, mishit dhe nënprodukteve të tyre nga Bullgaria”, shfuqizohet.

3. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit të informojë rregullisht brenda 24 orëve Autoritetin Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, Drejtorinë e Përgjithshme të Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit për çdo ngarkesë të kafshëve të llojit derra, produkteve dhe nënprodukteve të tyre, materialit biologjik, embrioneve, mishit dhe nënprodukteve të tyre.

4. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohen Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I BUJQËSISË DHE
ZHVILLIMIT RURAL
Frida Krifca

URDHËR
Nr. 465, datë 2.8.2023

**PËR IMPORTIN E KAFSHËVE TË
LLOJIT DERRA, PRODUKTEVE,
NËNPRODUKTEVE TË TYRE,
MATERIALIT BIOLOGJIK,
EMBRIONEVE, MISHIT DHE
NËNPRODUKTEVE TË TYRE
NGA UKRAINA**

Mbështetur në nenin 102, pikën 4 të Kushtetutës; në nenin 42 dhe 43, të ligjit nr. 10465, datë 29.9.2011, “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar,

URDHËROJ:

1. Lejimin e importit dhe tranzitimit për në territorin e Republikës së Shqipërisë të të gjitha kafshëve të gjalla të llojit derra të butë dhe të egër, produkteve të tyre, materialit biologjik dhe embrioneve e kafshëve të gjalla të llojit derra, mishin e freskët dhe nënprodukteve të tyre të kafshëve të llojit derra, vetëm nëse plotësohen kushtet e mëposhtme nga pika 1.1 deri në pikën 1.8, përkatësisht nga shteti i Ukrainës:

Ndarja Administrative e Nivelit të Parë	Ndarja Administrative e Nivelit të Dytë	Ndarja Administrative e Nivelit të Tretë
Chernihiv	Ripkyns'kyi;	
Chernihiv	Nizhyns'kyi	
Chernihiv	Kozelets'kyi	
Chernivtsi	Hlybots'kyi	
Kharkiv	Krasnokuts'kyi	
Kiev	Obukhivs'kyi	
Kiev	Vyshhorods'kyi	
Kiev	Boryspil's'ka	
Kiev	Ivankivs'kyi	
Kirovohrad	Kirovohrads'kyi	
Kirovohrad	Novoukrains'ky	
Zhytomyr	Zhytomyrs'ka	

1.1 Për kafshët e gjalla të llojit derra të butë dhe të egër, **certifikata shëndetësore veterinarë duhet të vërtetojë që kafshët:**

a) nuk kanë shfaqur shenja klinike të murtajës afrikane të derrave ditën e dërgesës;

b) janë mbajtur që nga lindja ose për tre muajt e fundit në një kompartment (zonë) pa prezencë të murtajës afrikane të derrave; ose

c) janë mbajtur në një stacion karantine, të izoluar për 30 ditë përpara dërgesës dhe i janë nënshtruar një testi virologjik dhe një testi serologjik të kryer të paktën 21 ditë pas hyrjes në stacionin e karantinës, me rezultate negative.

1.2 Për materialin biologjik të kafshëve të llojit derra të butë ose të egër, **certifikata shëndetësore veterinarë duhet të vërtetojë që kafshët donatore të materialit biologjik:**

a) janë mbajtur që nga lindja ose për të paktën tre muajt para grumbullimit në një stacion, në të cilin janë mbikëqyrur në përputhje me nenet 15.1.28 deri në 15.1.30 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe vërtetohet se asnjë rast i murtajës afrikane të derrave nuk ka ndodhur në tre vitet e fundit. Kjo periudhë reduktohet në 12 muajt vetëm nëse survejanca demonstron, dokumenton se nuk ka dëshmi të



përfshirjes së rriqnave në epidemiologjinë e infeksionit;

b) nuk kanë shfaqur shenja klinike të murtajës afrikane të derrave në ditën e mbledhjes së materialit biologjik;

c) sperma është mbledhur, përpunuar dhe ruajtur në përputhje me kapitujt 4.6 dhe 4.7 të Kodit Terrestrial të OIE-së;

ç) sperma e përdorur për fekondimin e ovociteve është në përputhje me kushtet e përcaktuara në nenin 15.1.10 ose nenin 15.1.11 të Kodit Terrestrial të OIE-së, sipas rastit.

1.3 Për embrionet e derivuara *in vivo* të derrave të butë, **certifikata shëndetësore veterinarë duhet të vërtetojë që kafshët donatore të embrioneve:**

a) janë mbajtur që nga lindja ose për të paktën tre muaj para grumbullimit të embrioneve në një stacion, në të cilën janë mbikëqyrur në përputhje me nenet 15.1.28 deri në 15.1.30 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe vërteton se asnjë rast i murtajës afrikane të derrave nuk ka ndodhur në tre vitet e fundit. Kjo periudhë reduktohet në 12 muaj vetëm nëse survejanca demonstron, dokumenton se nuk ka dëshmi të përfshirjes së rriqnave në epidemiologjinë e infeksionit;

b) nuk kanë shfaqur shenja klinike të murtajës afrikane të derrave në ditën e mbledhjes së embrioneve;

c) i janë nënshtruar një testi serologjik të kryer të paktën 21 ditë pas grumbullimit, me rezultate negative;

ç) embrionet janë mbledhur, përpunuar dhe ruajtur në përputhje me dispozitat përkatëse të kapitullit 4.8 dhe 4.10 të Kodit Terrestrial të OIE-së.

1.4 Për mishin e kafshëve të llojit derra të butë ose të egër, **certifikata shëndetësore veterinarë duhet të vërtetojë që:**

a) e gjithë ngarkesa e mishit të freskët vjen nga kafshët e llojit derra, që kanë origjinën nga tufat, të cilat janë mbikëqyrur në përputhje me nenet 15.1.28 deri në 15.1.30 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe vërteton se asnjë rast i murtajës afrikane të derrave nuk ka ndodhur në tre vitet e fundit.

Kjo periudhë reduktohet në 12 muaj vetëm nëse survejanca demonstron, dokumenton se nuk ka dëshmi të përfshirjes së rriqnave në epidemiologjinë e infeksionit;

b) janë testuar mostra nga një numër statistikisht përfaqësues i kafshëve për sëmundjen e murtajës afrikane të derrave, me rezultate negative;

c) e gjithë ngarkesa e mishit të freskët vjen nga kafshët të cilat janë therur në një thertore të miratuar dhe i janë nënshtruar kontrollit me rezultate të favorshme të inspektimit para dhe pas vdekjes, në përputhje me kapitullin 6.3 të Kodit Terrestrial të OIE-së;

ç) janë marrë masat e nevojshme pas therjes për të shmangur kontaktin e mishit të freskët me çdo burim të virusit të murtajës afrikane të derrave.

1.5 Për mishin e freskët të kafshëve të egra të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinarë duhet të vërtetojë që:**

a) janë vrarë në një vend ose zonë të lirë nga murtaja afrikane e derrave, në përputhje me pikën 1 ose pikën 2, të nenit 15.1.4 të Kodit Terrestrial të OIE-së;

b) i janë nënshtruar me rezultate të favorshme një inspektimi pas vdekjes, në përputhje me kapitullin 6.3 të Kodit Terrestrial të OIE-së, në një objekt ekzaminimi të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti.

1.6 Për produktet e mishit të kafshëve të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinarë duhet të vërtetojë që:**

a) mishi i freskët plotëson kushtet përkatëse në nenet 15.1.14, 15.1.15 dhe 15.1.16 të Kodit Terrestrial të OIE-së;

b) mishi është përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti dhe ka plotësuar kushtet përkatëse të nenëve 15.1.14, 15.1.15 dhe 15.1.16 të Kodit Terrestrial të OIE-së; ose

c) janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti, në mënyrë që të sigurohet shkatërrimi i virusit të murtajës afrikane të derrave në përputhje me nenin 15.1.23 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë marrë masat e nevojshme pas përpunimit të mishit për të shmangur kontaktin e produktit me çdo burim të virusit të murtajës afrikane të derrave.

1.7 Për qimet (e pjesës së shpinës) e kafshëve të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinarë duhet të vërtetojë që:**

a) e kanë origjinën nga derrat e egër ose të butë të kapur në një vend, zonë ose ndarje pa prezencë të murtajës afrikane të derrave dhe janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti; ose

b) janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti ku është



siguruar shkatërrimi i virusit të murtajës afrikane të derrave në përputhje me një nga proceset e listuara në nenin 15.1.26 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë marrë masat e nevojshme pas përpunimit, për të shmangur kontaktin me produktin me çdo burim të virusit të murtajës afrikane të derrave.

1.8 Për lëkurët e kafshëve të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) kanë ardhur nga derra të një vendi ose zone të lirë nga sëmundja e murtajës afrikane të derrave, në përputhje me pikën 1 ose pikën 2, të nenit 15.1.4, të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti; ose

b) origjinojnë nga derra të egër ose të butë të kapur në një vend, zonë ose kompartment pa prezencë të sëmundjes së murtajës afrikane të derrave dhe janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti; ose

c) janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti, ku është siguruar shkatërrimi i virusit të murtajës afrikane të derrave, në përputhje me një nga procedurat e përmendura në nenin 15.1.25 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë marrë masat paraprake të nevojshme pas përpunimit, për të shmangur kontaktin e produktit me çdo burim të virusit të murtajës afrikane të derrave.

2. Urdhri nr. 562, datë 22.11.2022, “Për importin e kafshëve të llojit derra, produkteve, nënprodukteve të tyre, materialit biologjik, embrioneve, mishit dhe nënprodukteve të tyre nga Ukraina”, shfuqizohet.

3. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit të informojë rregullisht, brenda 24 orëve, Autoritetin Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, Drejtorinë e Përgjithshme të Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit për çdo ngarkesë të kafshëve të llojit derra, produkteve dhe nënprodukteve të tyre, materialit biologjik, embrioneve, mishit dhe nënprodukteve të tyre.

4. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohen Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I BUJQËSISË DHE
ZHVILLIMIT RURAL
Frida Krifca

URDHËR
Nr. 466, datë 2.8.2023

**PËR IMPORTIN E KAFSHËVE TË
LLOJIT DERRA, PRODUKTEVE,
NËNPRODUKTEVE TË TYRE,
MATERIALIT BIOLOGJIK,
EMBRIONEVE, MISHIT DHE
NËNPRODUKTEVE TË TYRE
NGA LETONIA**

Mbështetur në nenin 102, pikën 4 të Kushtetutës, në nenin 42 dhe 43, të ligjit nr. 10465, datë 29.9.2011, “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar,

URDHËROJ:

1. Lejimin e importit dhe tranzitimit për në territorin e Republikës së Shqipërisë të të gjitha kafshëve të gjalla të llojit derra të butë dhe të egër, produkteve të tyre, materialit biologjik dhe embrioneve e kafshëve të gjalla të llojit derra, mishin e freskët dhe nënprodukteve të tyre të kafshëve të llojit derra, vetëm nëse plotësohen kushtet e mëposhtme nga pika 1.1 deri në pikën 1.8, përkatësisht nga shteti i Letonisë:

Ndarja Administrative e Nivelit të Parë	Ndarja Administrative e Nivelit të Dytë	Ndarja Administrative e Nivelit të Tretë
Kurzemes	Dienvidkurzemes	Sakas
Kurzemes	Dienvidkurzemes	Kalëtu
Kurzemes	Kuldigas	Édoles
Kurzemes	Kuldigas	Skrundas
Kurzemes	Kuldigas	Padures
Kurzemes	Kuldigas	Ranķu
Kurzemes	Kuldigas	Alsungas
Kurzemes	Saldus	Pampāļu
Kurzemes	Talsu	Libagu
Kurzemes	Talsu	Dundagas
Kurzemes	Tukuma	Slampes
Kurzemes	Tukuma	Degoles
Kurzemes	Tukuma	Vārkavas
Kurzemes	Tukuma	Smārdes
Kurzemes	Tukuma	Jaunpils
Kurzemes	Tukuma	Irlavas
Kurzemes	Ventspils	Vārves



Kurzemes	Ventspils	Zlēku
Kurzemes	Ventspils	Ugāles
Kurzemes	Ventspils	Piltēnes
Kurzemes	Ventspils	Užavas
Latgales	Augšdaugavas	Vecsalienas
Latgales	Augšdaugavas	Demenes
Latgales	Augšdaugavas	Maļinovas
Latgales	Augšdaugavas	Salienas
Latgales	Balvu	Lazdulejas
Latgales	Balvu	Kubulu
Latgales	Balvu	Lazdukalna
Latgales	Balvu	Šķilbēnu
Latgales	Balvu	Balvu
Latgales	Balvu	Tilžas
Latgales	Balvu	Rugāju
Latgales	Balvu	Briežuciema
Latgales	Briežuciema	Kantīnieku
Latgales	Krāslavas	Šķaunes
Latgales	Krāslavas	Svariņu
Latgales	Krāslavas	Andzeļu
Latgales	Līvānu	Rožupes
Latgales	Ludzas	Ņukšu
Latgales	Preiļu	Rušonas
Latgales	Preiļu	Riebiņu
Latgales	Preiļu	Silajāņu
Latgales	Preiļu	Aizkalnes
Latgales	Preiļu	Saunas
Latgales	Rēzeknes	Gaigalavas
Latgales	Rēzeknes	Silmalas
Latgales	Rēzeknes	Ilzeskalna
Latgales	Rēzeknes	Gaigalavas
Latgales	Rēzeknes	Vērēmu
Latgales	Rēzeknes	Audriņu
Latgales	Rēzeknes	Bērzgales
Latgales	Rēzeknes	Dekšāres
Latgales	Rēzeknes	Nagļu
Montana	Valchedram	
Rīgas	Siguldas	Krimuldas
Vārmes	Kuldīgas	Vārmes
Vidzemes	Alūksnes	Liepnas
Vidzemes	Alūksnes	Alsviķu
Vidzemes	Alūksnes	Mārupes
Vidzemes	Cēsu	Raiskuma
Vidzemes	Cēsu	Stalbes
Vidzemes	Gulbenes	Daukstu
Vidzemes	Gulbenes	Stāmerienas
Vidzemes	Gulbenes	Galgauskas
Vidzemes	Gulbenes	Litenes
Vidzemes	Gulbenes	Līgo
Vidzemes	Gulbenes	Stradu
Vidzemes	Limbažu	Umurgas
Vidzemes	Madonas	Praulienas
Vidzemes	Madonas	Ošupes
Vidzemes	Madonas	Aronas
Vidzemes	Madonas	Dzelzavas
Vidzemes	Madonas	Liezēres
Vidzemes	Madonas	Cesvānes
Vidzemes	Madonas	Ilaudonas
Vidzemes	Madonas	Sarkaru
Vidzemes	Smiltenes	Grundzāles
Vidzemes	Valmieras	Kocēnu
Vidzemes	Valmieras	Plāņu
Vidzemes	Valmieras	Zilākalna

Zemgales	Dobeles	Annenieku
Zemgales	Jelgavas	Valgundes
Zemgales	Aizkraukles	Neretas
Zemgales	Jēkabpils	Atašienes
Zemgales	Jēkabpils	Elkšņu

1.1 Pār kafshēt e gjalla të llojit derra të butë dhe të egër, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetojë që kafshët:**

a) nuk kanë shfaqur shenja klinike të murtajës afrikane të derrave ditën e dërgesës;

b) janë mbajtur që nga lindja ose për tre muajt e fundit në një kompartment (zonë) pa prezencë të murtajës afrikane të derrave; ose

c) janë mbajtur në një stacion karantine, të izoluar për 30 ditë përpara dërgesës dhe i janë nënshtruar një testi virologjik dhe një testi serologjik, të kryer të paktën 21 ditë pas hyrjes në stacionin e karantinës, me rezultate negative.

1.2 Për materialin biologjik të kafshëve të llojit derra të butë ose të egër, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetojë që kafshët donatore të materialit biologjik:**

a) janë mbajtur që nga lindja ose për të paktën tre muaj para grumbullimit në një stacion, në të cilin janë mbikëqyrur në përputhje me nenet 15.1.28 deri në 15.1.30 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe vërtetohet se asnjë rast i murtajës afrikane të derrave nuk ka ndodhur në tre vitet e fundit. Kjo periudhë reduktohet në 12 muaj vetëm nëse survejanca demonstron, dokumenton se nuk ka dëshmi të përfshirjes së rriqnavë në epidemiologjinë e infeksionit;

b) nuk kanë shfaqur shenja klinike të murtajës afrikane të derrave në ditën e mbledhjes së materialit biologjik;

c) sperma është mbledhur, përpunuar dhe ruajtur në përputhje me kapitujt 4.6 dhe 4.7 të Kodit Terrestrial të OIE-së;

ç) sperma e përdorur për fekondimin e ovociteve është në përputhje me kushtet e përcaktuara në nenin 15.1.10 ose nenin 15.1.11 të Kodit Terrestrial të OIE-së, sipas rastit.

1.3 Për embrionet e derivuara *in vivo* të derrave të butë, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetojë që kafshët donatore të embrioneve:**

a) janë mbajtur që nga lindja ose për të paktën tre muaj para grumbullimit të embrioneve në një stacion, në të cilin janë mbikëqyrur në përputhje me nenet 15.1.28 deri në 15.1.30 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe vërtetohet se asnjë rast i murtajës afrikane



të derrave nuk ka ndodhur në tre vitet e fundit. Kjo periudhë reduktohet në 12 muaj vetëm nëse survejanca demonstroi, dokumenton se nuk ka dëshmi të përfshirjes së rriqnave në epidemiologjinë e infeksionit;

b) nuk kanë shfaqur shenja klinike të murtajës afrikane të derrave në ditën e mbledhjes së embrioneve;

c) i janë nënshtruar një testi serologjik të kryer të paktën 21 ditë pas grumbullimit, me rezultate negative;

ç) embrionet janë mbledhur, përpunuar dhe ruajtur në përputhje me dispozitat përkatëse të kapitullit 4.8 dhe 4.10 të Kodit Terrestrial të OIE-së.

1.4 Për mishin e kafshëve të llojit derra të butë ose të egër, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) e gjithë ngarkesa e mishit të freskët vjen nga kafshët e llojit derra që kanë origjinën nga tufat, në të cilat janë mbikëqyrur në përputhje me nenin 15.1.28 deri në 15.1.30 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe vërteton se asnjë rast i murtajës afrikane të derrave nuk ka ndodhur në tre vitet e fundit. Kjo periudhë reduktohet në 12 muaj vetëm nëse survejanca demonstroi, dokumenton se nuk ka dëshmi të përfshirjes së rriqnave në epidemiologjinë e infeksionit;

b) janë testuar mostra nga një numër statistikisht përfaqësues i kafshëve për sëmundjen e murtajës afrikane të derrave, me rezultate negative;

c) e gjithë ngarkesa e mishit të freskët vjen nga kafshë të cilat janë therur në një thertore të miratuar dhe i janë nënshtruar kontrollit me rezultate të favorshme të inspektimit para dhe pas vdekjes, në përputhje me kapitullin 6.3 të Kodit Terrestrial të OIE-së;

ç) janë marrë masat e nevojshme pas therjes për të shmangur kontaktin e mishit të freskët me çdo burim të virusit të murtajës afrikane të derrave.

1.5 Për mishin e freskët të kafshëve të egra të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) janë vrarë në një vend ose zonë të lirë nga murtaja afrikane e derrave, në përputhje me pikën 1 ose pikën 2, të nenit 15.1.4 të Kodit Terrestrial të OIE-së;

b) i janë nënshtruar me rezultate të favorshme një inspektimi pas vdekjes, në përputhje me kapitullin 6.3 të Kodit Terrestrial të OIE-së, në një objekt

ekzaminimi të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti.

1.6 Për produktet e mishit të kafshëve të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) mishi i freskët plotëson kushtet përkatëse në nenin 15.1.14, 15.1.15 dhe 15.1.16 të Kodit Terrestrial të OIE-së;

b) mishi është përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti dhe ka plotësuar kushtet përkatëse të neneve 15.1.14, 15.1.15 dhe 15.1.16 të Kodit Terrestrial të OIE-së; ose

c) janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti, në mënyrë që të sigurohet shkatërrimi i virusit të murtajës afrikane të derrave, në përputhje me nenin 15.1.23 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë marrë masat e nevojshme pas përpunimit të mishit për të shmangur kontaktin e produktit me çdo burim të virusit të murtajës afrikane të derrave.

1.7 Për qimet (e pjesës së shpinës) e kafshëve të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) e kanë origjinën nga derrat e egër ose të butë të kapur në një vend, zonë ose ndarje pa prezencë të murtajës afrikane të derrave dhe janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti; ose

b) janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti, ku është siguar shkatërrimi i virusit të murtajës afrikane të derrave, në përputhje me një nga proceset e listuara në nenin 15.1.26 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë marrë masat e nevojshme pas përpunimit për të shmangur kontaktin me produktin me çdo burim të virusit të murtajës afrikane të derrave.

1.8 Për lëkurët e kafshëve të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) kanë ardhur nga derra të një vendi ose zone të lirë nga sëmundja e murtajës afrikane të derrave, në përputhje me pikën 1 ose pikën 2, të nenit 15.1.4 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti; ose

b) origjinojnë nga derra të egër ose të butë të kapur në një vend, zonë ose kompartment pa prezencë të sëmundjes së murtajës afrikane të



derrave dhe janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti; ose

c) janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti, ku është siguruar shkatërrimi i virusit të murtajës afrikane të derrave, në përputhje me një nga procedurat e përmendura në nenin 15.1.25 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë marrë masat paraprake, të nevojshme pas përpunimit, për të shmangur kontaktin e produktit me çdo burim të virusit të murtajës afrikane të derrave.

2. Urdhri nr. 553, datë 22.11.2022, “Për importin e kafshëve të llojit derra, produkteve, nënprodukteve të tyre, materialit biologjik, embrioneve, mishit dhe nënprodukteve të tyre nga Letonia”, shfuqizohet.

3. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit të informojë rregullisht, brenda 24 orëve, Autoritetin Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, Drejtorinë e Përgjithshme të Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit për çdo ngarkesë të kafshëve të llojit derra, produkteve dhe nënprodukteve të tyre, materialit biologjik, embrioneve, mishit dhe nënprodukteve të tyre.

4. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohen Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I BUJQËSISË DHE
ZHVILLIMIT RURAL
Frida Krifca

URDHËR

Nr. 467, datë 2.8.2023

PËR IMPORTIN E KAFSHËVE TË LLOJIT DERRA, PRODUKTEVE, NËNPRODUKTEVE TË TYRE, MATERIALIT BIOLOGJIK, EMBRIONEVE, MISHIT DHE NËNPRODUKTEVE TË TYRE NGA ITALIA

Mbështetur në nenin 102, pikën 4 të Kushtetutës, në nenin 42 dhe 43, të ligjit nr. 10465, datë 29.9.2011, “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar,

URDHËROJ:

1. Lejimin e importit dhe tranzitimit për në territorin e Republikës së Shqipërisë të të gjitha kafshëve të gjalla të llojit derra të butë dhe të egër, produkteve të tyre, materialit biologjik dhe embrioneve e kafshëve të gjalla të llojit derra, mishin e freskët dhe nënprodukteve të tyre të kafshëve të llojit derra, vetëm nëse plotësohen kushtet e mëposhtme nga pika 1.1 deri në pikën 1.8, përkatësisht nga shteti i Italisë:

Ndarja Administrative e Nivelit të Parë	Ndarja Administrative e Nivelit të Dytë	Ndarja Administrative e Nivelit të Tretë
Lazio	Roma	
Lazio	Rieti	
Liguria	Genova	
Liguria	Savona	
Piemonte	Alessandria	
Sardegna	Nuoro	
Sardegna	Sassari	
Campania	Salerno	Casaleto Spartano
Campania	Salerno	Casalbuono
Campania	Salerno	Sanza
Calabria	Reggio Calabria	Di

1.1 Për kafshët e gjalla të llojit derra të butë dhe të egër, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetojë që kafshët:**

a) nuk kanë shfaqur shenja klinike të murtajës afrikane të derrave ditën e dërgesës;



b) janë mbajtur që nga lindja ose për tre muajt e fundit në një kompartament (zonë) pa prezencë të murtajës afrikane të derrave; ose

c) janë mbajtur në një stacion karantine, të izoluar për 30 ditë përpara dërgesës dhe i janë nënshtruar një testi virologjik dhe një testi serologjik, të kryer të paktën 21 ditë pas hyrjes në stacionin e karantinës, me rezultate negative.

1.2 Për materialin biologjik të kafshëve të llojit derra të butë ose të egër, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që kafshët donatore të materialit biologjik:**

a) janë mbajtur që nga lindja ose për të paktën tre muaj para grumbullimit në një stacion, në të cilin janë mbikëqyrur në përputhje me nenet 15.1.28 deri në 15.1.30 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe vërteton se asnjë rast i murtajës afrikane të derrave nuk ka ndodhur në tre vitet e fundit. Kjo periudhë reduktohet në 12 muaj vetëm nëse survejanca demonstron, dokumenton se nuk ka dëshmi të përfshirjes së rriqnave në epidemiologjinë e infeksionit;

b) nuk kanë shfaqur shenja klinike të murtajës afrikane të derrave në ditën e mbledhjes së materialit biologjik;

c) sperma është mbledhur, përpunuar dhe ruajtur, në përputhje me kapitujt 4.6 dhe 4.7 të Kodit Terrestrial të OIE-së;

ç) sperma e përdorur për fekundimin e ovociteve është në përputhje me kushtet e përcaktuara në nenin 15.1.10 ose nenin 15.1.11, të Kodit Terrestrial të OIE-së, sipas rastit.

1.3 Për embrionet e derivuara *in vivo* të derrave të butë, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që kafshët donatore të embrioneve:**

a) janë mbajtur që nga lindja ose për të paktën tre muaj para grumbullimit të embrioneve në një stacion, në të cilin janë mbikëqyrur në përputhje me nenet 15.1.28 deri në 15.1.30, të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe vërteton se asnjë rast i murtajës afrikane të derrave nuk ka ndodhur në tre vitet e fundit. Kjo periudhë reduktohet në 12 muaj vetëm nëse survejanca demonstron, dokumenton se nuk ka dëshmi të përfshirjes së rriqnave në epidemiologjinë e infeksionit;

b) nuk kanë shfaqur shenja klinike të murtajës afrikane të derrave në ditën e mbledhjes së embrioneve;

c) i janë nënshtruar një testi serologjik të kryer të paktën 21 ditë pas grumbullimit, me rezultate negative;

ç) embrionet janë mbledhur, përpunuar dhe ruajtur në përputhje me dispozitat përkatëse të kapitullit 4.8 dhe 4.10 të Kodit Terrestrial të OIE-së.

1.4 Për mishin e kafshëve të llojit derra të butë ose të egër, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) e gjithë ngarkesa e mishit të freskët vjen nga kafshët e llojit derra që kanë origjinën nga tufat, në të cilat janë mbikëqyrur në përputhje me nenet 15.1.28 deri në 15.1.30, të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe vërteton se asnjë rast i murtajës afrikane të derrave nuk ka ndodhur në tre vitet e fundit. Kjo periudhë reduktohet në 12 muaj vetëm nëse survejanca demonstron, dokumenton se nuk ka dëshmi të përfshirjes së rriqnave në epidemiologjinë e infeksionit;

b) janë testuar mostra nga një numër statistikisht përfaqësues i kafshëve për sëmundjen e murtajës afrikane të derrave, me rezultate negative;

c) e gjithë ngarkesa e mishit të freskët vjen nga kafshë të cilat janë therur në një thertore të miratuar dhe i janë nënshtruar kontrollit me rezultate të favorshme të inspektimit para dhe pas vdekjes, në përputhje me kapitullin 6.3 të Kodit Terrestrial të OIE-së;

ç) janë marrë masat e nevojshme pas therjes për të shmangur kontaktin e mishit të freskët me çdo burim të virusit të murtajës afrikane të derrave.

1.5 Për mishin e freskët të kafshëve të egra të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) janë vlarë në një vend ose zonë të lirë nga murtaja afrikane e derrave, në përputhje me pikën 1 ose pikën 2, të nenit 15.1.4 të Kodit Terrestrial të OIE-së;

b) i janë nënshtruar me rezultate të favorshme një inspektimi pas vdekjes, në përputhje me kapitullin 6.3 të Kodit Terrestrial të OIE-së, në një objekt ekzaminimi të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti.

1.6 Për produktet e mishit të kafshëve të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) mishi i freskët plotëson kushtet përkatëse në nenet 15.1.14, 15.1.15. dhe 15.1.16, të Kodit Terrestrial të OIE-së;



b) mishi është përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti dhe ka plotësuar kushtet përkatëse të neneve 15.1.14, 15.1.15 dhe 15.1.16, të Kodit Terrestrial të OIE-së; ose

c) janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti, në mënyrë që të sigurohet shkatërrimi i virusit të murtajës afrikane të derrave, në përputhje me nenin 15.1.23 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë marrë masat e nevojshme pas përpunimit të mishit për të shmangur kontaktin e produktit me çdo burim të virusit të murtajës afrikane të derrave.

1.7 Për qimet (e pjesës së shpinës) e kafshëve të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) e kanë origjinën nga derrat e egër ose të butë të kapur në një vend, zonë ose ndarje pa prezencë të murtajës afrikane të derrave dhe janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti; ose

b) janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti ku është siguruar shkatërrimi i virusit të murtajës afrikane të derrave, në përputhje me një nga proceset e listuara në nenin 15.1.26 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë marrë masat e nevojshme pas përpunimit për të shmangur kontaktin me produktin me çdo burim të virusit të murtajës afrikane të derrave.

1.8 Për lëkurët e kafshëve të llojit derra, **certifikata shëndetësore veterinare duhet të vërtetohet që:**

a) kanë ardhur nga derra të një vendi ose zone të lirë nga sëmundja e murtajës afrikane të derrave, në përputhje me pikën 1 ose pikën 2, të nenit 15.1.4 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti; ose

b) origjinojnë nga derra të egër ose të butë të kapur në një vend, zonë ose kompartament pa prezencë të sëmundjes së murtajës afrikane të derrave dhe janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti; ose

c) janë përpunuar në një objekt të miratuar nga Autoriteti Veterinar për qëllime eksporti, ku është siguruar shkatërrimi i virusit të murtajës afrikane të derrave, në përputhje me një nga procedurat e përmendura në nenin 15.1.25 të Kodit Terrestrial të OIE-së dhe janë marrë masat paraprake të nevojshme pas përpunimit për të shmangur

kontaktin e produktit me çdo burim virusit të murtajës afrikane të derrave.

2. Urdhri nr. 559, datë 22.11.2022, “Për importin e kafshëve të llojit derra, produkteve, nënprodukteve të tyre, materialit biologjik, embrioneve, mishit dhe nënprodukteve të tyre nga Italia”, shfuqizohet.

3. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit të informojë rregullisht, brenda 24 orëve, Autoritetin Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, Drejtorinë e Përgjithshme të Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit për çdo ngarkesë të kafshëve të llojit derra, produkteve dhe nënprodukteve të tyre, materialit biologjik, embrioneve, mishit dhe nënprodukteve të tyre.

4. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohet Drejtoria e Përgjithshme të Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I BUJQËSISË DHE
ZHVILLIMIT RURAL
Frida Krifca

KËRKESË
Nr. 311/12, datë 7.8.2023

PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Agjencia Shtetërore për Shpronësimin shpall kërkesën “Për shpronësimin për interes publik, për pasuritë e paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, ‘Rehabilitimi urban i Njesisë Administrative Gjinar në ZK 1742’, Bashkia Elbasan”.

Subjekti kërkues i këtij projekti është Bashkia Elbasan.

Me anë të këtij publikimi, kërkojmë të vëmë në dijeni personat e prekur nga ky shpronësim, për pasuritë e paluajtshme, pronë private, të cilët do të kompensohen sipas vlerësimit paraprak të llogaritur për pasuritë e llojit “truall” dhe “pyll”, bazuar në VKM-në nr. 89, datë 3.2.2016, “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë,



si dhe për pasuritë e llojit “ndërtesë”, bazuar në vendimin nr. 138, datë 23.2.2000, të Këshillit të Ministrave, “Për kriteret teknike të vlerësimit dhe të përlllogaritjes së masës së shpërblimit të pasurive pronë private që shpronësohen, të pasurive që zhvlerësohen dhe të të drejtave të personave të tretë, për interes publik, për pasuritë e llojit “ndërtesë”, sipas tabelës bashkëlidhur.

Personat që preken nga ky projekt të cilët kanë emrin në tabelën e publikuar dhe personat të cilët preken por nuk figurojnë në këto lista, jo më vonë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga publikimi në Fletoren Zyrtare, kanë të drejtë të paraqesin

pretendimet e tyre, të shoqëruara me dokumentacionin përkatës, si edhe të shprehen nëse janë dakord me të dhënat e publikuara për përfundimin e procedurave të shpronësimit në Bashkinë Elbasan, si dhe në Agjencinë Shtetërore për Shpronësimet.

Vlera totale paraprake e shpronësimit është 4,229,904.04 (katër milionë e dyqind e njëzet e nëntë mijë e nëntëqind e katër pikë zero katër) lekë.

DREJTOR I PËRGJITHSHËM
Egra Ibrahimi

LISTA PARAPRAKE E PRONARËVE QE SHPRONËSOHEN, PËR INTERES PUBLIK, NGA
PROJEKTI “REHABILITIM URBAN I NJËSISË ADMINISTRATIVE GJINAR, ZK 1742”, ELBASAN

NR.	PRONARI			TË DHËNA HIPOTEKARE										VLERËSIMET PËR SHPRONËSIM														SHËNIME (D+E) (shënimet hipotekare, hazret dhe pasuritë etj.)
	EMRI	ATËSIA	MBIEMRI	Fshati ose qyteti	Zona katastrale	No. i pasurisë	Lloji i pasurisë	Sipërfaqja totale	P.V.L (m ²)	Tërësi (m ²)	Ndërtesë (m ²)	Volumi	Paqe	PYLL			TRUALL			NDËRTESE					Vlera e kulturës bujqësore dhe e drutave, sipas proces-verbalit të Drejtorisë së Bujqësisë		VLERA TOTALE (tëq)	
														Sipërfaqja (m ²)	Çmimi (tëq/m ²)	Vlera (tëq)	Sipërfaqja (m ²)	Çmimi (tëq/m ²)	Vlera (tëq)	Sipërfaqja(m ²)	Çmimi (tëq/m ²)	Vlera sipas situacionit (tëq)	Vlera e kulturës bujqësore (tëq)	Vlera e drutave (tëq)				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y	Z			
1	SAVETA GJURE	ANASTAS	BEZHANI BINJAKU	GJINAR ELBASAN	1742	150/83	PVLL	968.12	968.12	0	0	0	0	49.6	85	4216	0	0	0	0	0	0	0	0	4216	Nuk ka		
2	SAVETA GJURE	ANASTAS	BEZHANI BINJAKU	GJINAR ELBASAN	1742	150/84/1	PVLL	902.32	902.32	0	0	0	0	166	85	14110	0	0	0	0	0	0	0	0	14110	Nuk ka		
3	OLTA ELONA INDRIET	SPIRO QORRI	QORRI	GJINAR ELBASAN	1742	151/136	TRUALL	1489	0	1489	0	0	0	0	0	265	248	65720	0	0	0	0	0	0	65720	Nuk ka		
4	PETRO SAVETA GJURE NAJN	ANASTAS BEZHANI BINJAKU TOPI		GJINAR ELBASAN	1742	150/34/1	PVLL	8214.2	8214.2	0	0	0	0	825.1	85	70133.5	0	0	0	0	0	0	0	0	70133.5	Nuk ka		
5	ILAZAR	KOSTANDIN	PECI	GJINAR ELBASAN	1742	150/72-ND	NDËRTESE	73.5	0	0	73.5	0	0	0	0	0	0	0	73.5	0	0	0	0	0	1607605.54	Më këtu pasuritë kulturore veçanërisht pamendat dhe të kryesit e monumenteve në rrethet, sipas të cilave		
6	JOSIF	SHITET	SHOQI	GJINAR ELBASAN	1742	150/36-ND	NDËRTESE	35.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.71	0	0	0	0	0	799308	Nuk ka		
7	LEFTER	JORGJI	XHOLLI	GJINAR ELBASAN	1742	150/109	TRUALL	605	0	605	0	0	0	0	0	0	248	126480	0	0	0	0	0	0	126480	Nuk ka		
8	LEFTER	JORGJI	XHOLLI	GJINAR ELBASAN	1742	150/73/1	TRUALL	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	248	64332	0	0	0	0	0	0	64332	Nuk ka		
9	LEFTER	JORGJI	XHOLLI	GJINAR ELBASAN	1742	151/103	TRUALL	286	0	286	0	0	0	0	0	0	88	248	21824	0	0	0	0	0	0	21824	Më këtu pasuritë në rrethet kulturore në 1906/59 aks, datë 14.4.2016, të Gjykatës së Rrethit Gjirokastrë, fshatit Gjirokastrë.	
10	KOSTANDIN	JORGJI	XHOLLI	GJINAR ELBASAN	1742	150/76	NDËRTESE	112	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0	0	0	0	0	550089	Nuk ka		
11	KOSTANDIN	JORGJI	XHOLLI	GJINAR ELBASAN	1742	150/73/2	TRUALL	2480	0	2480	0	0	0	0	0	0	773.7	248	191877.6	0	0	0	0	0	0	191877.6	Nuk ka	
12	KOSTANDIN	JORGJI	XHOLLI	GJINAR ELBASAN	1742	150/57	TRUALL	967	0	967	0	0	0	0	0	0	950.6	248	235748.8	0	0	0	0	0	0	235748.8	Më vendimet nr. 1605, datë 24.12.2016, të Gjykatës së Rrethit Gjirokastrë (Elbasan) fshatit kërkësipada, fshatit kërkësipada.	
13	KOSTANDIN	JORGJI	XHOLLI	GJINAR ELBASAN	1742	150/119	TRUALL	10473	0	10473	0	0	0	0	0	0	920	248	228160	0	0	0	0	0	0	228160	Më këtu pasuritë në rrethet kulturore në 14.4.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjirokastrë, fshatit Gjirokastrë.	
14	KOSTANDIN	JORGJI	XHOLLI	GJINAR ELBASAN	1742	151/102	TRUALL	713	0	713	0	0	0	0	0	0	238	248	54064	0	0	0	0	0	0	54064	Më këtu pasuritë në rrethet kulturore në 14.4.2016, të Gjykatës së Rrethit Gjirokastrë, fshatit Gjirokastrë.	
15	KOSTANDIN	JORGJI	XHOLLI	GJINAR ELBASAN	1742	150/72	TRUALL	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	248	79856	0	0	0	0	0	0	79856	Më këtu pasuritë në rrethet kulturore në 14.4.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjirokastrë.	
16	KOSTANDIN	JORGJI	XHOLLI	GJINAR ELBASAN	1742	150/116	TRUALL	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	248	102176	0	0	0	0	0	0	102176	Më këtu pasuritë në rrethet kulturore në 14.4.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjirokastrë.	
17	BUKURI	JORGJI	DUNICARI	GJINAR ELBASAN	1742	151/117/11	TRUALL	966	0	966	0	0	0	0	0	0	27	248	11036	0	0	0	0	0	0	11036	Nuk ka	
18	PETRO	ANASTAS	TOPI	GJINAR ELBASAN	1742	150/96/2	TRUALL	5412.6	0	5412.6	0	0	0	0	0	0	80.2	248	11457.6	0	0	0	0	0	0	11457.6	Nuk ka	
19	PETRO	ANASTAS	TOPI	GJINAR ELBASAN	1742	150/85/1	PVLL	533.92	0	533.92	0	0	0	14	85	1190	0	0	0	0	0	0	0	0	1190	Nuk ka		
20	SHITET			GJINAR ELBASAN	1742	150/110	TRUALL	83	0	83	0	0	0	0	0	0	62	248	0	0	0	0	0	0	0	Nuk ka		
21	SHITET			GJINAR ELBASAN	1742	150/112	TRUALL	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	248	0	0	0	0	0	0	0	Nuk ka		
22	SHITET			GJINAR ELBASAN	1742	150/115	TRUALL	700	0	700	0	0	0	0	0	0	518.3	248	0	0	0	0	0	0	0	Nuk ka		
23	SHITET			GJINAR ELBASAN	1742	150/114	TRUALL	400	0	400	0	0	0	0	0	0	16	248	0	0	0	0	0	0	0	Nuk ka		
24	SHITET			GJINAR ELBASAN	1742	151/1/1	PVLL	18065.4	18065.4	0	0	0	0	74.4	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nuk ka		
25	SHITET			GJINAR ELBASAN	1742	150/11/22	PVLL	27660.6	27660.6	0	0	0	0	765.75	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nuk ka		
26	SHITET			GJINAR ELBASAN	1742	151/21	TRUALL	2888	0	2888	0	0	0	0	0	0	124.7	248	0	0	0	0	0	0	0	Nuk ka		
27	SHITET			GJINAR ELBASAN	1742	150/7	SHËNESH	953	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	Nuk ka		
28	SHUMA			GJINAR ELBASAN	1742	151/126	TRUALL	237	0	237	0	0	0	0	0	0	117	248	0	0	0	0	0	0	0	Nuk ka		
																									622986.04			

*Shënim: Ky dokument është gjeneruar dhe vulosur me anë
të një procedure automatike nga një sistem elektronik
(Qendra e Botimeve Zyrtare)*

	Formati 61x86/8
--	-----------------

Shtypshkronja e Qendrës së Botimeve Zyrtare
Tiranë, 2023

Adresa: Rr. "Nikolla Jorga", Tiranë
Tel./fax: +355 4 24 27 004 Tel.: +355 4 24 27 006

Çmimi 400 lekë